




N. ROCHEO.

De Morbis  
Mulierum.

1542







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5506/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5506/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5506/A

+ De Christophis Maluchia<sup>88</sup>  
de malattia della don-  
na - milana, 1881.

5506

A

J. V. Roe


*Ar. Arietti;*

---

*Parmia: 17 Feb<sup>ro</sup> 89.*

---





65229

# De morbis

M V L I E R V M C V -

R A N D I S , A V T H O R E


Nicolao Rocheo do-  
ctore medico.

C V M P R I V I L E G I O .

1 5 4 2

Venundantur apud Viuantium  
Gaultherot sub intersignio. S. Mar-  
tini in via Iacobeae.




 L est permis à Denys la  
not d'imprimer & met-  
tre en vente ce present  
liure, & deffenses faictes  
à tous aultres libraires & impri-  
meurs, iusques à deux ans de ne  
l'imprimer ou faire imprimer, ven-  
dre ou faire vendre, d'aultres que  
ceulx que ledict suppliant aura im-  
primez, sur peine de cōfiscation des  
liures qu'ilz auroient. imprimez &  
d'amende arbitraire, comme plus à  
plain est cōtenu en sa requeste res-  
pondue du xxiii. iour de Iuing mil  
cing cens quarante deux.

Ainsi signé. I. I. de Mesmes.



ILLVTRISSIMAE SE-  
renissimæque principi D. katharinæ  
ab Ambasia comiti cortisanæ apud  
insubres, baronissæ linneriensis, mi-  
glani, charantonii, trenollii. &c.  
Dominæ calmôtis, marigniaci che-  
uagniaci, tisiaci, sancti bricii ad li-  
gerim, ampli putei. &c. Nicolaus  
Rocheus. S. D.



Quia luteciam mēse octo-  
bri peteres, à te accersit-  
tus, vt in via è domo tua  
morbum, si quis occur-  
reret, proftiga-  
rem, veni clarif-  
sima princeps, prosperam item vale-  
tudinem tuam seruaturus. Nec de-  
fuerunt in itinere, quibus aduersa  
valetudine correptis suppetias tuli,  
nihilò tamē minus ego aliquot ho-

A ii



ras selegi pro scribendo libro, quem  
tibi lutetiae excussum dicarem, quo  
mulierum morbis facile mederi po-  
terit, qui hunc in promptu habuerit,  
qui & si latinus sit: non propterea  
indignum duxi dicandum mulieri  
gallicae, quam penes hospitantur, ne  
dicam charites, sed & ipsae Iouis no-  
uem filiae: quod testantur, venusta  
verborum cōcinnitas, facundia, mo-  
destia, mores probatissimi, pruden-  
tia, castitas, christianismus, omni-  
um historiarum tenax memoria, pie-  
tatis in pauperes opera, preces  
assiduae, & cætera id genus. Nec mi-  
rum, quum nemo eorum à quibus  
originē traxisti otio deditus fuerit,  
at potius, quotquot fuere, virtutes  
gratiâsq; citissimo gressu prosequu-  
ti sūt. Quis precor, Aenea troiano in  
rebus gerendis cōsultior. Quis Af-



canio ipso (nam ab eo natales tuos  
accepisti ) inter Duces strennuior.  
Quis Cæsare Iulio vigilantior. Tan  
dem (ne historiam texere videar) ab  
ipso Iulio dictatore vsque ad auum  
& patrem, patruosque tuos inge-  
nuosissimos principes (relinquendo,  
regum gallorum & imperatorum,  
adde & proauorum & tritauorum  
historias ) finem impono . Nec est  
qui me mendacem aut parasitum  
dicere possit , quum id satis notum  
sit ex tum gallorum tum latinorum  
historiis . Quid passim dicitur de  
Georgio illo Ambasiano à pontifice  
romano ad gallos cum omni ipsius  
potestate misso . Is certè ad romani  
pontificii dignitatem peruenisset,  
nisi gladio ensibusque abstinere ius-  
sisset, animæ propriæ probus consul  
tor pietatisque fraternæ amator, Il-

A iii



lo tempore ex patruis tuæ germa-  
næ sex variis in cœnobiis virgini-  
bus præerant, silentio transeo pa-  
truos tuos pontifices, quorum acta  
breuitati studens, hic describere no-  
lo. Nouit gallia, nouit & italia karo-  
lum illum illustrissimum generosis-  
simumque fratrem tuum Ludouici duo-  
decimi gallorum regis omnem ita-  
liam annis duodecim ita ditioni sub-  
iecisse, quod rex italiæ tunc potius  
censendus erat quam dux: cuius me-  
moriam nunquam delebitur. Vale  
princeps optima, faxit Deus opti-  
mus maximus annos viuas Adami-  
cos, & demum spiritus sedes petat  
beatas. E Lutezia. 26. die ianuarii.  
1542.



NICOLAUS ROCHEVS

lectori beneuolo.

S.



N lector candide libellus de mulierum morbis quem partim ex græcorum Arabúmque monumentis decerpſi, partim ex ea quam experientia didici arte medica, deſcripſi, in vnoquoque capite ordinem obſeruauí, quem probationem iudicaui, incipiendo ſcilicet à definitione, cauſas, notas, prædictiones, nutritatum & tandem curandi rectam rationem proſequutus ſum. Hunc dicaui nomini dominae meæ Fatharinæ ambafinæ, ne acephalos in lucem prodiret, quanquam liber de ſemine genitali, & meatuum, membrorumque ſeminariorum morbis iſtum præcedere debeat.

A iiii

Tertium tenet ordinem libellus de  
natorum & educatione, & eorū mor  
bis. Quartus liber capillorū affectus  
ipforūque infectiones āplectitur. In  
quinto narrantur cerebri neruorūq;  
pathemata, hos quatuor propediem  
prelo mandandos curabo, modò bo  
no gratóque animo hunc suscipias.  
Vale fœliciter.



# TRACTATUS MORBO-

RUM IN MULIERE CV-

randorū Index copiosis-  
simus.

De mulierum meatibus semi-  
nariis. fo. 3. pag. 1.

Testes foeminarum ab vtraque par-  
te. fo. 5. pag. 1.

De mulierum locis. fo. 6. pag. 2.

De mēfibus mēstrualibus. fo. 11. pa. 2.

De purgatione menstruorum.

Folio. 12. pag. 1.

De mensium facultate ex Plinio.

Folio. 13. pagi. 1.

Cause ex mensium moris. fo.

17. pag. 1.

Notæ ex iisdem satis apparentes.

fo. 20. pag. 1.

Prædictiones. fo. 22. pag. 1.

Nutricatus exhibendi. fol. 23. pag. 1.

Curatio quàm necessaria mensium  
suppressorum. fo. 24. pag. 2

INDEX.

Sectio venæ pro muliebri purgatione. fo. 25. pag. 1

Potus ad extenuandos humores.

fo. 16. pag. 2.

Quæ menses cient simplicia ex Plinio. fo. 28. pag. 1

Potiones compositæ. fo. 29. pag. 2

Potiones pro mensibus comprimentis ex pituita. fo. 30. pag. 2

Potiones ad menses ex flaua bile comprimentos. fo. 31. pag. 2

Potiones ad idem ex atra bile. fo. 32. pag. 2

Purgationes humorum per aluum. fo. 33. pag. 1

Subductio pituitæ. fo. 33. pag. 2

Bilis flaua quomodo educitur. fo. 34. pag. 2

Bilis atræ subductio. fo. 35. pag. 1



## INDEX.

- Balnea & infusus ex subductione  
pituitæ. fo. 35. pag. 2  
Infusus ad subductionem flauæ  
bilis. fo. 36. pag. 1  
Vnguenta necessaria ad pituitam.  
fo. 36. pag. 1  
Vngueta ad bilem flauā fo. 37. pa. 1  
Vnguenta ad atram bilem. fo.  
37. pag. 1  
Pulueres, eclegmata, & pastilli ad  
pituitam accommoda. fo.  
37. pag. 2  
Pastilli ex mirrha. folio. 38. pag. 3  
Eclegmata pro flaua bili. fo.  
38. pag. 2  
Placentæ pro atra bili. fo. 39. pag. 1  
Fotus, euaporationes, & suffitus  
fo. & pag. eadem.  
Euaporationes à pituita. fo.  
39. pag. 2  
Cucurbitulæ. fo. 40. pag. 2.



# INDEX.

& 53. pag. 1.  
 Iniectiones quàm vtilis. fo.  
 40. pag. 2  
 Pelli & prostheta. folio. 40.  
 pag. 2  
 Pelli pro flaua bile. folio. 42.  
 pag. 2  
 Purgatio muliebris, hæmorrhagiâ-  
 que locellorum & muliebri proflu-  
 uium. fo. 43. pag. 1  
 Causæ & fluxus muliebrium locel-  
 lorum fo. 43. pag. 2  
 Notæ ex fluxu. folio. 45. pag. 2  
 Præfagia. fol. 45. pagina. 2.  
 Victus qualiter sumendus. fol.  
 46. pag. 2. & folio. 67.  
 pag. 1  
 Curandi ratio. folio. 47 pag.  
 2. & fo. 67. pag. 2  
 Missio sanguinis è vena. fo. 48.  
 pag. 1

## INDEX.

- Potus utilis pro muliebri proflu-  
uio. fo. 48. pag. 2  
Simplicia ex Plinio. folio. 50.  
pag. 1  
Potiones compositaë & serapia.  
fo. 51. pag. 1  
Purgantia per aluum. folio. 52.  
pag. 1  
Purgantia item pro bile flaua.  
fo. 52. pag. 2  
Globuli vorandi *ὑπὸ πόντῳ*.  
fo. 52. pag. 1  
Eucathismata siue infessus. f. 53. pa. 2  
Constrictiones. fo. 53. pag. 1.  
Suffitus. fo. 54. pag. 2  
Eclegmata & placenta rotulæ que.  
fo. 55. pag. 1  
Placenta & eclegmata ex pituita.  
fo. 56. pag. 1  
Epithemata & cataplasmata. fo.  
56. pag. 2



## INDEX.

Vnguenta accommodatissima.

57. pag. 2

Emplastra. fo. 57. pag. 2

Pess. fo. 58. pag. 2

Mettranchita. fo. 60. pag. 1

Portanda quæ sunt mulieribus.

fo. 60. pag. 2

Hysterica. fo. 61. pag. 1

Clyster & glandes, aliter supposito-  
ria. fa. 60. pag. 1

Sectio venæ. fo. 62. pag. 2

Potus è castorio. fo. 62. pag. 2

Quæ subducant humores noxios.

fo. 69. pag. 1

Eclegmata, pulueres, & aliæ confe-  
ctiones. fo. 69. pag. 2

Constrictiones & frictiones. fo.

69. pag. 2

Odoranda naribus. fo. 70.

pag. 1

Suffitus, linimenta, & per metran-



## INDEX.

chitum iniectiones.fo.70.  
pag.2  
Rubificationes & cataplasmata.  
fo.71.pag.2  
Sternutatio.fo.71.pag.2  
Vomitio.fo.& pag.eadem.vt sup.  
Encatisma.fo.72.pag.1  
Aspergines.fo.71.pag.1  
Pelli.fo.72.pag.1  
Procidentia vteri.fo.72.pag.1  
Causæ procidentium vteri.fo.  
73.pag.1  
Notæ vteri procidentis.fo.  
74.pag.1  
Victus ad procidentia vteri.fo.  
76.pag.1  
Clysteres.fo.eo.pag.2  
Sectio venæ propter vterum proci-  
dentē.fo.77.pag.1  
Systremma lana conuoluta.fo.  
& pag.eadem.

ē iiii

## INDEX.

Cucurbitulæ ad quid necessariae.

fol. 77. pag. 2.

Olfacienda. fol. 78. pag. 1.

Pulveres, infusus, & fodus. fol.

& pag. ead.

Cerata & emplastra. folio. 79

pag. 1

Vnguenta. fol. 79 pag. 2

Suffitus. fol. 80. pag. 1

Pessus. fol. 80. pag. 2

Potus fo. & pag. ead.

Mola quid. fol. 81. pag. 1

Causæ generationis molarum.

fol. 81. pag. 2.

Notæ earumdem. folio. 82.

pag. 1

Præfagia molarum. folio. 83.

pag. 2

Victus pro molis. folio. 84

pag. 1

Curatio quæ sit congrua pro mola



## INDEX,

alienanda.fo.84.pag.2

Vena quæ secanda propter molam.  
fo.84.parg.2

Purgatio per aluum.fol.85.pag.12

Potus pro mola.fo. & pag.ead.

Infessus & balnea.folio. eodem.  
pag.2

Vnguenta, cerata, & emplastra.  
fo.&.pag.ead.

Confectiones.fol.86.pag.2

Pessi.fo.87.pag.1.

Suffitus pro vtero.fo.87.pag.2

Causæ inflammationis vteri.  
fo.88.pag.1

Notæ inflammationis eiusdem.  
fo. &.pagi.eadē.

Nutricatus pro inflammato vtero.  
fo.eo.pag.2

Clysteres pro eodem.fo.89.pag.1

Venæ sectio propter vterum inflā-  
matum.fo.&pag.ca.

## INDEX

Purgatio per aluum. fo. & pag. ea.  
Irrigationes & epithemata. fo. &  
pag. eadem.  
Obstetricis quod sit munus. fo.  
90. pag. 1  
Iniicienda quæ sunt per metranchi-  
tum. fo. 90 pag. 2  
Pessuli. fo. & pag. ea.  
Potus pro vtero inflammato. fo. &  
fo. 91. pag. 1  
Placentæ, morsuli, & eclegmata.  
fo. & pag. ea.  
Inunctiones pro vtero. fo. eod.  
pag. 2.  
Emplastra ad idē. fo. & pag. ea.  
Causæ inflammationis locellorum.  
fo. 92. pag. 1  
Notæ inflammationis eorundem.  
fo. 92. pag. 2  
Prædictiones eiusdem. fo. 94  
pag. 2



## INDEX.

- Victus ad idem. fo. 95. pag. 1.  
Quæ vena secanda ex tali inflammatione locellorum. fo. eo. pag. 2.  
Serapia & potus pro eodem. fo. 96. pag. 1.  
Purgatio ad iddem. fo. eo. pag. 2.  
Fotus ad iddem. fo. eo. pag. 2.  
Cataplasmata pro eodem. fo. & pag. 1. eadem.  
Emplastra & inunctiones. fo. 97. pag. 1.  
Infessus pro supradicta inflammatione. fo. 92. pag. 2.  
Dilutiones per metranthitum. fo. 99. pag. 1.  
Pessi pro locellis inflammatis. folio. 100. pag. 1.  
Vnguenta ad inflammationem locellorum. fo. eodem pag. 2.  
Epithemata ad iddem. folio & pag. eadem.

## INDEX.

Vomitio ad idem. fol. 101. pag. 1.

Abscessus pro eodem. folio &  
paginae eadem.

Notæ inflammationum locellorum.  
fo. eo. pag. 2

Prædictiones eorum quæ de locello  
rum inflammatione dicta sunt.

fo. 102. pag. 1

Viçtus similis pro locellorum in  
flammatione vti & vteri. fo.

& pag. eadem.

Cataplasmata pro eodem. folio. 102.  
pag. 2

Infectus, similiter. fo. 102. pagi. 2.

Pessi apti pro eodem. fo. &  
pag. eadem.

Quæ facienda rupto vteri aposte-  
mate. fo. 103. pag. 1

Potus pro rupto abscessu. fo.  
103. pag. 2.

Clysteres iuxta idem. folio. 104



## INDEX.

pag. 1

Iniicienda quæ sunt in vterum per  
metranchitum. fo. 104. pag. 1

Manu qualiter medendum. fol.

104. pag. 2

Causæ exulcerationis locellorum.

fo. 105. pag. 1.

Notæ exulcerationis eorūdem.

fo. 105. pag. 1

Quæ per metranchytum iniicienda  
sunt fo. 105. pag. 2

Sarcotica quando immittenda. fo.

107. pag. 1

Vnguenta pro exulceratione locel-  
lorum. fo. 107. pag. 2

Pessi pro eodem. fo. 108. pag. 1

Emplastra ad illud necessaria. fo.

108. pag. 2

Sectio venæ ob exulcerationem lo-  
cellorum. fo. 109. pag. 1

Nutricatus pro vlcere locellorum.

INDEX.

pag. 1. fo. 109

Prædictiones ex his vlceribus. fo.  
109. pag. 1

Causæ, cur abscessus vteri fuerit pi-  
tuitosus. fo. 109. pag. 2

Notæ ex abscessu vteri pituitoso. fo.  
109. pag. 1

Curatio quæ sit abscessus vteri. fo.  
110. pag. 1

Iniicienda cum metrâchyto. fo. 110.  
pag. 1.

Emplastra pro tali abscessu. pag. 2.  
fo. 110

Scirrhus & scleroma vteri. fo. 111.  
pag. 1

Causæ scirrhi. fo. 111. pag. 2.

Notæ scirrhi, & scleromatis vteri.  
fo. 112. pag. 1

Vena secāda pro scleromate vteri.  
fo. 112. pag. 2

Subductio humoris pro tali sclero-



## INDEX.

mate fo. 113

Cataplasmata, malagmata & em-  
plastra. fo. & pag. eadem.

Unguenta satis utilia pro scirrho  
uteri. fo. 114. pag. 1

Cucurbitula pro scirrho uteri. fo.  
114. pag. 2

Infectus pro eodem. fo. 114. pag. 2

Immittenda cum metranchito. fo.  
114. pag. 2

Pessi pro uteri scirrho & scleroma-  
te. fo. 116. pag. 1

Cancer uteri. fo. 116. pag. 1.

Causæ canceris uteri. fo. 116. pag. 1

Notæ canceris uteri. fo. 116. pag. 1

Prædictiones de cæcris. fo. 116. pag. 2

Victus quis exhibendus propter can-  
crum. fo. 119. pag. 1

Missio sanguinis e vena, si cancer  
uteri. fo. & pag. eadem.

Eucathisma pro cancro uteri. fo. 119.

## INDEX.

pag. 12

Potus pro eodē vt supra. fo. 119. pa. 28

Cataplasmata & cerata, fo. & pag. ea.

Vnguenta maximē requisita pro  
cancro vteri. fo. 120. pag. 1.

Adhibenda intrinsecus per metran  
chytum. fo. 120. pag. 2

Rhagades, condylomata, & hemor  
roides vuluæ. fol. 122. pag. 1.

Causæ rhagades. fo. 122. pag. 1.

Notæ rhagades. fo. 122. pag. 2.

Pessi & epithemata in rhagadis. fol.  
123. pag. 1.

Clausura muliebrium locorum. fol.  
124. pag. 1

Causæ ex clausura muliebrium lo  
corum. fo. 124. pag. 1.

Incessus & cataplasmata. fo. & pag.  
eadem.

Pessi apti pro loco muliebri. fo. 124.  
pag. 2



## INDEX.

Suffimentis vtendum pro eodem.

Fol. & pagi. eadem.

Fotus & lotiones ad aperiēdas clau-  
fas mulierū vuluas. fo. & pag. eadē.

Hiatus hostii vteri. fo. 125. pag. 1.

Contortiones & peruerfiones vul-  
uarum. fol. 126. pag. 1.

Causæ sterilitatis. pag. & folio eodē.

Notæ sterilitatis fo. 131. pagina. 2.

Prædictiones ex sterilitate. folio.  
135. pagi. 1.

Victus qualis sit pro sterilitate.

Folio. 137. pag. 1.

Potus quis pro sterilitate. folio  
139. pag. 1.

## RECEPTIONES AD sterilitatem.

Rx. pro pituita, si parens sterilitatis.

ō

INDEX.

fol. 139. pag. 2.

Rx. si bilis flaua. folio. 140. pag. 2.

Rx. pro atra bili, si conceptionem  
impediat. fol. 141. pag. 1.

POTIONES PUR-  
gantes.

Receptiones potio. purgates pro pi-  
tuita. fol. 142. pag. 1.

Rx. si bilis flaua. fol. & pag. eadem.

Rx. ab atra bile. Folio. 142,  
pagina. 2.

Catapotiæ recept. si pituita. folio  
& pag. eadem.

Catapotia pro bili flaua. folio. 143.  
pagina. 1.

Rx. pro bili atra, fo. 143. pag. 1.

Catharticus bucellatus, & ecleg-  
mata aluum subducentia. folio. 143.



## INDEX.

pagina. 2.

Rx. Cathartici bucellati, pro bili  
flaua. fol. 144. pagi. 1.

Rx. si vitellina bilis. folio & pagina  
eadem.

Rx. si atra bilis. fol. & pag. eadem.

Sectio venæ ex sterilitate. folio &  
pagina eadem.

Balnea, infessus, & fetus propter ste-  
rilitatem. fol. 144. pag. 2.

Rx: propter muliebrium locellorū  
humiditatem, si bilis flaua. folio.

145. pag. 2.

Rx. ad idem, si atra bilis. folio. 146.  
pagina. 1.

Rx. si ex sola siccitate. folio. 146.  
pagina. 1.

Eclegmatum receptio, si pituita. fol.  
146. pagina. 2.

Rx. eclegmatum, si bilis flaua. folio  
147. pag. 2.

ō ii

## INDEX.

Recept.eorundem, si ex sanguine.  
folio.148.pag.1.

Rx. altera ex eisdem, si atra bilis.fo.  
148.pag.1

Eclegmatum recep. si ex sola ficci-  
tate.fo.148.pag.2

Pessi receptio, si pituita . fo . 148.  
pag.2

Rx. pessi, si ex bile flaua . fo.149.  
pag.1

Rx. pessi, si ex sanguine.fo.eodem.  
pag.2

Rx. eiusdem, si ex atra bile.fo.& pag.  
eadem.

Pessi recep. si ex sola ariditate.fo. &  
pag.eadem.

Iniicienda per metrāchitum ex bili  
flaua.fo.150.pag.1

Suffitus ex pituita.fo.& pag. eadem.

Suffitus recept. si ex bile . fo . 151.  
pag.1



## INDEX.

- Emplastra & cataplasmata extra  
balneum deferenda. fo. 151. pag. 2  
Conceptio, foetus generatio, impræ-  
gnatio. fo. 152. pag. 1  
Causæ conceptionis. folio. 161.  
pag. 1  
Notæ conceptionis. fo. 161. pag. 1  
Notæ conceptionis ex lotio. folio.  
165. pag. 1  
Notæ imprægnationis ex pulsu. fo.  
166. pag. 2  
Notæ sexus. fo. & pag. eadem.  
Prædictiones ex notis conceptio-  
nis & imprægnationis. folio. 166.  
pag. 1  
Abortum facientia. folio. 172.  
pag. 2  
Simplicia abortum facientia ex Pli-  
nio. fo. 174. pag. 1  
Nutricatus quo grauidæ sunt alen-  
dæ. fo. 174. pag. 2

INDEX.

& 53. pag. 1.

Iniectiones quàm vtilis. fol.

40. pag. 2

Pessi & prostheta. folio. 40.

pag. 2

Pelli pro flaua bile. folio. 42.

pag. 2

Purgatio muliebris, hæmorrhagiâ-  
que locellorum & muliebri proflu-  
uium. fol. 43. pag. 1

Causæ & fluxus muliebrium locel-  
lorum fol. 43. pag. 2

Notæ ex fluxu. folio. 45. pagi. 2

Præfagia. fol. 45. pagina. 2.

Victus qualiter sumendus. fol.

46. pag. 2. & folio. 67.

pag. 1

Curandi ratio. folio. 47 pag.

2. & fo. 67. pag. 2

Missio sanguinis è vena. fol. 43.

pag. 1



## INDEX.

- Potus utilis pro muliebri proflu-  
uio. fo. 48. pag. 2  
Simplicia ex Plinio. folio. 50.  
pag. 1  
Potiones compositæ & serapia.  
fo. 51. pag. 1  
Purgantia per aluum. folio. 52.  
pag. 1  
Purgantia item pro bile flaua.  
fo. 52. pag. 2  
Globuli vorandi *ἡπιότια*.  
fo. 52. pag. 1  
Eucathismata siue infessus. f. 53. pa. 2  
Constrictiones. fo. 53. pag. 1.  
Suffitus. fo. 54. pag. 2  
Eclegmata & placenta rotulæ que.  
fo. 55. pag. 1  
Placenta & eclegmata ex pituita.  
fo. 56. pag. 1  
Epithemata & cataplasmata. fo.  
56. pag. 2

## INDEX.

Vnguenta accommodatissima.

57. pag. 2

Emplastra. fo. 57. pag. 2

Pessli. fo. 58. pag. 2

Metranchita. fo. 60. pag. 1

Portanda quæ sunt mulieribus.

fo. 60. pag. 2

Hysterica. fo. 61. pag. 1

Clyster & glandes, aliter supposito-

ria. fa. 60. pag. 1

Sectio venæ. fo. 62. pag. 2

Potus è castorio. fo. 68. pag. 2

Quæ subducant humores noxios.

fo. 69. pag. 1

Eclegmata, pulueres, & aliæ confe-

ctiones. fo. 69. pag. 2

Constrictiones & frictiones. fo.

69. pag. 2

Odoranda naribus. fo. 70.

pag. 1

Suffitus, linimenta, & per metran-



## INDEX.

chitum iniectiones.fo.70.  
pag.2  
Rubificationes & cataplasmata.  
fo.71.pag.2  
Sternutatio.fo.71.pag.2  
Vomitio.fo.& pag.eadem.vt sup.  
Encatisma.fo.72.pag.1  
Aspergines.fo.71.pag.1  
Pelli.fo.72.pag.2  
Procidentia vteri.fo.71.pag.1  
Causæ procidentium vteri.fo.  
73.pag.1  
Notæ vteri procidentis.fo.  
74.pag.1  
Victus ad procidentia vteri.fo.  
76.pag.1  
Clysteres.fo.eo.pag.2  
Sectio venæ propter vterum proci-  
dentē.fo.77.pag.1  
Systremma lana conuoluta.fo.  
& pag.eadem.

ē iiii

## INDEX.

Cucurbitulæ ad quid necessariae.

fol. 77. pag. 2.

Olfacienda. fol. 78. pag. 1.

Pulveres, in seſſus, & fatus. fol.

& pag. ead.

Cerata & emplaſtra. folio. 79

pag. 1.

Vnguenta. fol. 79 pag. 2.

Suffitus. fol. 80. pag. 1.

Pellus. fol. 80. pag. 2.

Potus fo. & pag. ead.

Mola quid. fol. 81. pag. 1.

Cauſæ generationis molarum.

fo. 81. pag. 2.

Notæ earumdem. folio. 82.

pag. 1.

Præſagia molarum. folio. 83.

pag. 2.

Viſtus pro molis. folio. 84.

pag. 1.

Curatio quæ ſit congrua pro mola



## INDEX.

alienanda.fo.84.pag.1

Vena quæ secanda propter molam.  
fo.84.pag.2

Purgatio per aluum.fol.85.pag.12

Potus pro mola.fo. & pag.ead.

Infessus & balnea.folio. eodem.  
pag.2

Vnguenta, cerata, & emplastra.  
fo.& pag.ead.

Confectiones.fol.86.pag.2

Pessi.fo.87.pag.1

Suffitus pro vtero.fo.87.pag.1

Causæ inflammationis vteri.  
fo.88.pag.1

Notæ inflammationis eiusdem.  
fo. & pagi.eadē.

Nutricatus pro inflammato vtero.  
fo.eo.pag.2

Clysteres pro eodem.fo.89.pag.1

Venæ sectio propter vterum inflā-  
matum.fo.& pag.ca.

## INDEX

Purgatio per aluum. fo. & pag. ea.  
Irrigationes & epithemata. fo. &  
pag. eadem.  
Obstetricis quod sit munus. fo.  
90. pag. 1  
Iniicienda quæ sunt per metranchi-  
tum. fo. 90 pag. 2  
Pessuli. fo. & pag. ea.  
Potus pro vtero inflammato.  
fo. 91. pag. 1  
Placentæ, morsuli, & eclegmata.  
fo. & pag. ea.  
Inunctiones pro vtero. fo. eod.  
pag. 2.  
Emplastra ad idē. fo. & pag. ea.  
Cause inflammationis locellorum.  
fo. 92. pag. 1  
Notæ inflammationis eorundem.  
fo. 92. pag. 2  
Prædictiones eiusdem. fo. 94  
pag. 2



## INDEX.

- Victus ad idem. fo. 95. pag. 1.  
Quæ vena secanda ex tali inflammatione locellorum. fo. eo. pag. 2.  
Serapia & potus pro eodem. fo. 96. pag. 1.  
Purgatio ad iddem. fo. eo. pag. 2.  
Fotus ad iddem. fo. eo. pag. 2.  
Cataplasmata pro eodem. fo. & pag. 1. eadem.  
Emplastra & inunctiones. fo. 97. pag. 1.  
Inseffus pro supradicta inflammatione. fo. 92. pag. 2.  
Dilutiones per metranchitum. fo. 99. pag. 1.  
Pessi pro locellis inflammatis. folio. 100. pag. 1.  
Vnguenta ad inflammationem locellorum. fo. eodem pag. 2.  
Epithemata ad iddem. folio & pag. eadem.

## INDEX.

Vomitio ad idem. fol. 101. pag. 1.

Abscessus pro eodem. folio &  
pagina eadem.

Notæ inflammationum locellorum.  
fo. eo. pag. 2.

Prædictiones eorum quæ de locello  
rum inflammatione dicta sunt.  
fo. 102. pag. 1.

Viçtus similis pro locellorum in  
flammatione vti & vteri. fo.  
& pag. eadem.

Cataplasmata pro eodem. folio. 103.  
pag. 2.

Inseßus, similiter. fo. 102. pagi. 2.

Pessi apti pro eodem. fo. &  
pag. eadem.

Quæ facienda rupto vteri apoſte-  
mate. fo. 103. pag. 1.

Potus pro rupto abscessu. fo.  
103. pag. 2.

Clysteres iuxta idem. folio. 104.



## INDEX

pag. 1

Iniicienda quæ sunt in vterum per  
metranchitum. fo. 104. pag. 1

Manu qualiter medendum. fol.

104. pag. 2

Causæ exulcerationis locellorum.

fo. 105. pag. 1.

Notæ exulcerationis eorūdem.

fo. 105. pag. 1

Quæ per metranchytum iniicienda  
sunt fo. 105. pag. 2

Sarcotica quando immittenda. fo.

107. pag. 1

Vnguenta pro exulceratione locel-  
lorum. fo. 107. pag. 2

Pessi pro eodem. fo. 108. pag. 1

Emplastra ad illud necessaria. fo.

108. pag. 2

Sectio venæ ob exulcerationem lo-  
cellorum. fo. 109. pag. 1

Nutricatus pro vlcere locellorum.

INDE X.

pag. 1. fo. 109

Prædictiones ex his vlceribus. fo.

109. pag. 1

Causæ, cur abscessus vteri fuerit pi-  
tuitosus. fo. 109. pag. 2

Notæ ex abscessu vteri pituitoso. fo.

109. pag. 1

Curatio quæ sit abscessus vteri. fo.

110. pag. 1

Iniicienda cum metrâchyto. fo. 110.

pag. 1.

Emplastra pro tali abscessu. pag. 2.

fo. 110

Scirrhus & scleroma vteri. fo. 111.

pag. 1

Causæ scirrhi. fo. 111. pag. 2.

Notæ scirrhi, & scleromatis vteri.

fo. 112. pag. 1

Vena secâda pro scleromate vteri.

fo. 112. pag. 2

Subductio humoris pro tali sclero-



## INDEX.

mate fo. 113

Cataplasmata, malagmata & emplastra. fo. & pag. eadem.

Unguenta satis utilia pro scirrho vteri. fo. 114. pag. 1.

Cucurbitulae pro scirrho vteri. fo. 114. pag. 2.

Inseculus pro eodem. fo. 114. pag. 2.

Immittenda cum metranchito. fo. 114. pag. 2.

Pessi pro vteri scirrho & scleromate. fo. 116. pag. 1.

Cancer vteri. fo. 116. pag. 1.

Causae canceris vteri. fo. 116. pag. 1.

Notae canceris vteri. fo. 116. pag. 1.

Praedictiones de canceris. fo. 116. pag. 2.

Victus quis exhibendus propter cancerum. fo. 119. pag. 1.

Missio sanguinis e vena, si cancer vteri. fo. & pag. eadem.

Eucathisma pro cancro vteri. fo. 119.



## INDEX.

pag. 12

Potus pro eodē vt supra. fo. 119. pa. 2.

Cataplasmata & cerata, fo. & pag. ea.

Vnguenta maximē requisita pro  
cancro vteri. fo. 120. pag. 1.

Adhibenda intrinsecus per metran  
chytum. fo. 120. pag. 2.

Rhagades, condylomata, & hemor  
rhoides vuluæ. fol. 122. pag. 1.

Causæ rhagades. fo. 122. pag. 1.

Notæ rhagades. fo. 122. pag. 2.

Pessi & epithemata in rhagadis. fol.  
123. pag. 1.

Clausura muliebrium locorum. fol.  
124. pag. 1.

Causæ ex clausura muliebrium lo  
corum. fo. 124. pag. 1.

Incessus & cataplasmata. fo. & pag.  
eadem.

Pessi apti pro loco muliebri. fo. 124.  
pag. 2.



## INDEX.

Suffimentis vtendum pro eodem.  
Fol.& pagi.eadem.  
Fotus & lotiones ad aperiēdas clau-  
fas mulierū vuluas. fo.& pag.eadē.  
Hiatus hostii vteri.fo.125.pag.1.  
Contortiones & peruerfiones vul-  
uarum.fol.126.pag.1.  
Causæ sterilitatis.pag. & folio eodē.  
Notæ sterilitatis fo.131.pagina.2.  
Prædictiones ex sterilitate.folio.  
135.pag.1.  
Victus qualis fit pro sterilitate.  
Folio.137.pag.1.  
Potus quis pro sterilitate. folio  
139.pag.1.

## RECEPTIONES AD sterilitatem.

Rx. pro pituita, si parens sterilitatis.

ō

INDEX.

fol. 139. pag. 2.

Rx. si bilis flaua. folio. 140. pag. 2.

Rx. pro atra bili, si conceptionem  
impediat. fol. 141. pag. 1.

POTIONES PUR-  
gantes.

Receptiones potio. purgātes pro pi-  
tuita. fol. 142. pag. 1.

Rx. si bilis flaua. fol. & pag. eadem.

Rx. ab atra bile. Folio. 142.  
pagina. 2.

Catapotiæ recept. si pituita. folio  
& pag. eadem.

Catapotia pro bili flaua. folio. 143.  
pagina. 1.

Rx. pro bili atra, fo. 143. pag. 1.

Catharticus bucellatus, & ecleg-  
mata aluum subducentia. folio. 143.



## INDEX.

pagina. 2.

Rx. Cathartici bucellati, pro bili  
flaua. fol. 144. pagi. 1.

Rx. si vitellina bilis. folio & pagina  
eadem.

Rx. si atra bilis. fol. & pag. eadem.

Sectio venæ ex sterilitate. folio &  
pagina eadem.

Balnea, infessus, & fatus propter ste-  
rilitatem. fol. 144. pag. 2.

Rx. propter muliebrium locellorū  
humiditatem, si bilis flaua. folio.

145. pag. 2.

Rx. ad idem, si atra bilis. folio. 146.  
pagina. 1.

Rx. si ex sola siccitate. folio. 146.  
pagina. 1.

Eclegmatum receptio, si pituita. fol.  
146. pagina. 2.

Rx. eclegmatum, si bilis flaua. folio  
147. pag. 2.

ō ii

INDEX.

Recept.eorundem, si ex sanguine.  
folio.148.pag.1.

Rx. altera ex eisdem, si atra bilis.fo.  
148.pag.1

Eclegmatum recep. si ex sola ficci-  
tate.fo.148.pag.2

Pessi receptio, si pituita. fo. 148.  
pag.2

Rx. pessi, si ex bile flaua. fo.149.  
pag.1

Rx. pessi, si ex sanguine.fo.eodem.  
pag.2

Rx. eiusdem, si ex atra bile.fo.& pag.  
eadem.

Pessi recep. si ex sola ariditate.fo. &  
pag.eadem.

Iniicienda per metrāchitum ex bili  
flaua.fo.150.pag.1

Suffitus ex pituita.fo.& pag. eadem.

Suffitus recept. si ex bile. fo. 151.  
pag.1



## INDEX.

- Emplastra & cataplasmata extra  
balneum deferenda. fo. 151. pag. 2  
Conceptio, foetus generatio, impræ-  
gnatio. fo. 152. pag. 1  
Causæ conceptionis. folio. 161.  
pag. 1  
Notæ conceptionis. fo. 161. pag. 1  
Notæ conceptionis ex lotio. folio.  
165. pag. 1  
Notæ imprægnationis ex pulsu. fo.  
166. pag. 2  
Notæ sexus. fo. & pag. eadem.  
Prædictiones ex notis conceptio-  
nis & imprægnationis. folio. 166.  
pag. 1  
Abortum facientia. folio. 172.  
pag. 2  
Simplicia abortum facientia ex Pli-  
nio. fo. 174. pag. 1  
Nutricatus quo gravidæ sunt alen-  
dæ. fo. 174. pag. 2

## INDEX.

Clyster pro grauidis. folio. 175.

pag. 1

Purgatio vtero gerentibus conueniens. fo. & pag. eadem.

Venæ sectio pro grauidis. folio. 175.

pag. 2

Cataplasmata & emplastra pro grauidis. fo. 175. pag. 2

Picæ, seu malatiæ, & fastidii cura. fo. 176. pag. 2

Vnguenta ex pica siue malatia. folio. 179. pag. 1


Eclegmata & pulueres. folio. 179. pag. 2


Victus satis conueniens grauidis. fo. 180. pag. 1

Contra tumores pedum prænantium. fo. 181. pag. 1

Causæ difficultatis partus. folio. & pag. eadem









# INDEX.

- Notæ difficultatis partus.  
fo. 125. pag. 2.
- Præfagia ex difficultate partus.  
Folio. 124. pag. 1.
- Pariendi ratio. Fol. 184. pag. 2.
- Iuuantia partus ex Plinio.  
Fol. 186. pag. 2.
- Iuuantia partus ex monumētis Ara-  
bum. Fol. 192. pag. 2.
- Inseſſus pro partu iuuando. fol.  
& pag. eadem.
- Vnguēta post balneū. fol. 193. pag. 1.
- Potus pro partu. fol. 2. pag. eadē
- Species aromatica. fol. 193. pag. 2.
- Quid faciendum in hora parturi-  
tionis. fol. 194. pag. 1.
- Cataplaſmata & emplaſtra adhiben-  
da in hora parturitionis. f. 194. pa. 2.
- Iniiciēda per metranchytum in par-  
turitione. fol. & pag. eadem.
- Potus dādus parturiēti. f. 195. pag. 1.

DE MORB. MUL.

Catapotia & orbiculi. fol. 195. pa. 2.

Eclegmata apta in parturitione.

Folio. 196. pag. 1.

Secundæ retentio. fol. 196. pa. 1.

Secundam extrahendi modus.

Folio. 197. pag. 2.

Eclegmata confortantia cerebrum.

Folio. 198. pagina. 2.

Encathismata pro retentione secundæ. fol. 198. pag. 2.

Linimenta, inunctiones & portanda. Fol. 198. pag. 2.

Potiones quæ menses prouocant.

Folio. 200. pag. 1.

Suffitus pro retentione secundæ.

Folio. 200. pag. 2.

Pessî pro vt supra. fol. 201. pag. 1.


Puerperæ cura. Fol. 201. pag. 2.


Monstra propter quid fiant. Fol.

202. pagina. 2.

FIN.









# De mulie-

## RVM MEATIBVS

feminariis.

De foëminarũ genitalibus mem-  
bris, ac ipſorum morbis deſcribere  
par eſt. Venæ igitur humoris, quam  
prolificun plerique medici prædi-  
cant, eandem fermé in foemella,  
quam in viris originem habent, ac  
flexuoſis orbibus in teſticulos deri-  
uant, inde ad vuluæ oſtium tédunt,  
vnde ſemen tanta voluptate pro-  
rumpit quod vanum atque inutile  
philoſophorum princeps Ariſtote-  
les aſſeuerat, cui & Arabs Auerroës  
ſubſcribit. Veruntamen (fateor) ex  
renibus, ſpina, coxis, lumbis, venæ  
ac arteriæ multæ, quæ ſparſim fun-

Alexan-  
der bene-  
dictus, li.  
20. anat.  
c. 23.

a iii



DE MORB: MVL:

dūtur in fibras per vuluam tenuissi-  
mas) tendunt, ex quibus genitalis  
humor, crassus, albus, oui albori si-  
milis intus colligitur ( vt bilis quo-  
tidie in stomacho) ad conceptum ne-  
cessarius: quod in ouis contigit, in  
quibus quod candidū est ac luteū  
a foemina prodit, semine maris tan-  
tū constituyente: ex ea materia mē-  
bra quæ spermatica vocamus gene-  
rantur, at ex mensibus rubentia, qua-  
lis caro est nutrienti similis, fiunt.  
Aristoteles de piscibus hæc refert.  
Que autem rupto, foetus veluti nu-  
cleus' constat, qui primum nullum  
accipit cibum, sed oui humore iam  
hausto increscunt, post nutriuntur  
aquis dulcibus fluuiorū, vsque dum  
satis augeantur. Idem author. An id  
verum, non dicitur, alimentum om-  
ne esse extrinsecus, sed protinus vt

Arist. lib.  
6. de hi-  
storia ani-  
malium  
c. 3.



In plantarū seminibus inest aliquid tale primum quod lacteum vocatur, sic in animalium materia excrementum constitutionis alimentum est, incrementum verò foetui per vmbilicum contingit, eodem quo plantas modo per radices, atque etiam animalibus ipsis, vbi absoluta iam sunt, ex eo (quod continetur) alimento idē accidit. At quod foeminis in venere prorumpit, non per saltus exit sicut virile: quoniam inutile est & vitiato simile, omnino differens ab eo, quod intra vuluam sine libidine quādoque restagnat. Ex vtrisque itaque maris & foeminæ foetus membra figurantur, ac spiritalis vita producitur: verū ex virili semine principalia membra, ex foemineo cætera ignobiliora constituuntur, ex puriori veluti materia, sicut &



spiritalis vigor. Maris enim semen in medio genitalis foeminei alboris colligitur, vt generandi potestatem in materiam vniuersam diffundat, ex Galeni sententia, atque ita membra formantur menstrui sanguinis nō indiga, donec exhausta materia, maiori corpus indigeat nutrimento, quod ex vmbilico postea quaeritur. A conceptu enim ad septimum vsque diem feminis prolifici fluxiones simplices apparēt, quo tempore & vmbilicus inchoari & secundæ videntur. Decimo die cordis bulla tumet, spiritu intus ebulliente & calore extrinsecus exsiccante, secundarum materia firmatur: quoniam & planta, & cortex eodem, generantur tempore. Post eos dies cætera membra describuntur, nec vno tempore principalia gerantur membra, quo-



niā diuersæ sunt naturæ. Cor enim  
primū progeneratur, exinde re-  
liqua describuntur membra, postre-  
mō replentur pictoris imitatione,  
circiter diem.30.masculina figuran-  
tur membra ex Hippocrate. Alii ta-  
men(inter quos Aristoteles) mari  
40.diem statutum pronuntiant, fœ-  
minæ trium mensium vel post, quo-  
niam figura in humido post abor-  
tum non permanet, sed statim dis-  
soluitur. Mas si in aquam frigidam  
diffunditur, cogitur consistitque in  
membranula, qua rupta, fœtus  
ipse apparet magnitudine formicæ  
maiusculæ, & mēbra iam inde dis-  
creta tum cætera omnia, tum geni-  
talia constant, & oculi(vt in cæteris  
animantibus)prægrandes.

TESTES FOEMI-  
narum.



Alex be.

Melanc-  
thon in  
commen-  
tario de  
Anima.

Testes in foeminis ab vtraq; parte  
refimi sunt, leporinis similis, ex qui-  
bus (vt alii arbitrantur) meatus, alii  
ad vuluæ cauum exeunt generatio-  
ni apti, quæ sententia refectione ip-  
sa facile ostenditur. Habet & mu-  
lier (inquit Melancthon opinione  
Galen) testiculos sitos iuxta cornua  
matricis vtrunque, minores virili-  
bus & frigidiores, sed tamen semen  
quoddam generantes, quod est qui-  
dem tenuius virili & subaquosum,  
sed tamen in procreatione foetus  
miscetur virili semini, eique velut  
alimentum est, vt augeat virile se-  
men, & foetus ex vtroque procree-  
tur. Nam vtrumque semen & actiue  
& passiuè se habet, in generatione  
foetus, multum in vtroque spiritu-  
um inest, sed virile quàm sit calidius  
& minùs rarum, magis se actiue ha-



bet. Quum autem mulieris testiculi sint extra matricem, & tamen ab ipsis muliebri semen in matricem transmitti oporteat, vt inūgatur virili, sciendum est, vt in viris vasa spermatica vehunt seminis materiā ad testes, deinde testes trāsmittūt per quasdā ābages in parastatas, ita propemodū fit in mulieribus. Nā vasa spermatica materiam seminis muliebris vndiq; ex corpore muliebri attrahūt, deinde testes excipiūt, exceptum & coctum trāsmittunt in parastatae, quæ sunt vasa amplectentia matricem, quæ quum à testiculis recedunt, incipiunt fieri paulò latiora, donec ingrediuntur matricem. Per hos ramos (quia in concubitu aperiuntur propter motum) illabitur muliebri semen in cauum matricis. Differunt autem viriles parastatae à muliebribus, quia viriles



DE MORE. MUL.

per longas ambages perueniunt ad  
virgam, sed in muliere amplectun-  
tur matricem non longo ductu.

DE MULIERVM  
locis.

Lib. II. c.  
37

Vterus in foeminis (inquit Pli-  
nius) loci vocatur, in reliquis anima-  
libus vulua.

Gal. lib.  
de fi.

Loci ex duabus venis, totidem-  
que arteriis constant.

Alex. be.

Ostium vuluæ in muliere ac in  
cæteris animalibus naturam, atque  
os genitale vocari vidimus: In me-  
dio tunica vtrunque apparēs nym-  
pha *νύμφη* & cletoris *κλετορις*  
dicitur. Ea intus natura ita custodi-  
tur, vt in maribus glans præputii ter-  
gore, vt hoc primo munimento aër  
arceatur. Interior pars ceruix voca-



tur, in cuius medio ferè neruosa exi-  
litas est, venulis dispersa tenuibus,  
virginitatis testimonium affert. Eu-  
giō vel Hymē vocatur, primo enim  
coitu scinditur. Naturalia interdū  
adeo cōpacta sūt à natura, vt chirur-  
gi opera indigeāt. Partem interiorē  
matricem locosque appellamus, quī  
desiderio coitus sæpe descēdunt in  
iis, quæ acetabula κοτυληδόνες sūt,  
vocantur, quibus per vmbilicū fœ-  
tus augetur. Vulua nullā vim immu-  
tādi seminis, sed cōseruatricē tātum  
possidet. Locorū ostium internū na-  
tura glandulosum est, ad glādis viri-  
lis similitudinem mucronatū, foras  
in ceruicem prominēs suo turbine.  
In ceruis triplex ostiū est, ob eā cau-  
sam grauidæ (quia dolent) coitum  
refugiunt, mulieres verò adamant,  
vnde & quandoque superfoetant.



Vulvæ acetabula non omnia perfecta animalia possident, sed cornigera & vna parte dentata, dum partum gerunt: ex vtraque parte dentatis lepus, mus, vespertilio, habent acetabula. Sus vulvam leuem habet, & conceptus vulvæ non acetabulis adhæret. Semen itaque trahi à locis vteri, atque ob eam rem multa generari pro numero locorum & acetabulorum: sæpe enim eodem in loco vteri, gemini consistunt.

Acetabulis vulvæ ex secundis robustior adhæret ea parte, qua confusa quædam fibrarum multitudo est.

Umbilici orificia acetabulorum orificiis respondent, vnde ali dicimus. Asperitas enim vtrinque fibrarum orificiorumque tenacitatem facit, vt in parietibus fieri solet.

Scalpunt enim prius, vt cementum



superinductum magis hæreat asperitati. Umbilicus cum inuolucro hoc est secundis, functus officio, ab acetabulis abscedit, veluti pomi pediculus iam maturi à ramo sponte cadentis. Ex iis acetabulis à partu menstrua profluunt: similis in maribus materia est, quæ in semen genitale per concoctionem vertitur.

Locorum ostium in cōceptu aperitur, & exinde clauditur, nec amplius recluditur, nisi mulier superfoetet, vel fluxionibus laboret, vel si menses fluant, os id adeo occlusum est, ut aër subire nequeat. Loci ipsi posituram habent inter spinæ imæ partem, quā os sacrum vocamus, supra vesicam, contra mediam positi aluum, inde paulum ad dexteriorem coxam conuertuntur, postea super rectum intestinum progressi, illius feminibusque



latera sua annectunt, rectam cū vesica continuatāque cervicem habent, quem Canalē vocant, qui cervici vesicæ suppositus, carnosus cartilaginofusque admodum est: is in prægnante contrahitur.

Alex. bened. Ex  
celso. lib. 4. c. 1. Vulva in virgine exigua est, in muliere (nisi ubi grauida est) non multo maior, quā manu comprehendi possit. Ea cordi, arteriis, nervis, cerebro, spinæque medullæ cōmittitur, præcordiis item, māmīs, renibus, ventri, iliis, coxis, pubi, quæ omnia in vulvæ strangulationibus percipiuntur: quibus anima subducitur, vertigines sentiunt, capillos in vertice vel occipitio conuelli arbitrantur, lumbos præterea, fœmora, inguina & stomachum dolent, quædam obmutescunt, aliquibus mentes soluuntur. Illis præsertim



adalligatur neruulis quibusdam re-  
tortis, qui grauidis protenduntur.  
Nulla vena de maiore, recta via ad  
vuluam pertinet, de aorta verò mul-  
tæ frequentésque veniunt. Eius ma-  
teria neruosa est, rugosa, pelliculosa,  
pollicaris crassitudinis, quæ ad con-  
ceptus magnitudinem extendi pos-  
sit. Qui eo tempore acetabula vuluæ  
inquirunt ad magnum vulgi deside-  
rium, digna frustratione frustran-  
tur: videri enim minimè possunt,  
nec primo conceptus tempore cum  
inuolucra (quæ secundas vocant)  
robustius vuluæ adhærēt: tum enim  
evidentius membrana valētior per  
vmbilici radices acetabulis (quæ  
*κοτυληδόνες* Græci vocant) cō-  
mittitur, quales in polyporum fir-  
rhis videmus, qui suctu cum aliquid  
capiunt, continent. Hæc accrescen

b



re foetu conspicua sunt cum vtero,  
cauo autem ad foetum conuersa ex  
Aristotele. In ipso inuolucro ex se-  
cundis quædam carnosæ extantia fi-  
bris referta minimis acetabulis affi-  
xa, quæ sanguinem & spiritum velu-  
ti radicum fibræ exsugunt, digerunt-  
que per venas, & ad vmbilicum vs-  
que deferitur sanguis, spiritusque per  
quem alimentum haurit foetus.

Melæctho  
lib. de aia Matrix  $\mu\eta\tau\epsilon\rho\alpha$ , partes duas ha-  
bet, Receptaculum, factum vt foetum  
continere possit, idque vocatur  $\rho\epsilon\sigma\epsilon\tau\epsilon\rho\alpha$ .  
Altera pars est angustior, quæ est  
aditus longiusculus, ideoque Col-  
lum matricis dicitur. Et quoniam  
receptaculum amplius est, qua par-  
te versus collum tendit, sunt addita  
cornua, vt quasi lunæ crescentis fi-  
guram referat. Nam hæc cornua sūt  
ligamenta, quæ matricem alligant



toxis. Est & matrix intus vndique  
consperfa tanquam punctis. Sunt  
autem hæc puncta, orificia venarum  
vndique tendentium ad matricem,  
& hæc orificia vocantur ideo *κο-  
τυληδόνες*, quia vt amplecti possint  
fibras, quibus foetum in vtero & re-  
tinent & alunt, sunt fimiles extre-  
mis polypi pedibus, qui appellantur  
cotyledones, propter cauā figuram  
& aptam adprehendendum.

Triplex vtilitas est cotyledonum.  
Sunt enim canales, per quos san-  
guis menstruus effluit: suppeditant  
etiam sanguinem puriorem alendæ  
matrici & alēdo foetui, & figura sua  
fibras apprehendunt, vt retineri in  
vtero foetus possit. Oriri autem Co-  
tyledones alii putant à vasis semina-  
riis, Galenus etiam à caua vena,  
Aliquæ haud dubiè rami sunt vena

b ü



rum, quæ à mamillis ad vterum tendunt: attrahunt enim mamillæ partem aliquam sanguinis ex vtero, quæ mutatur in lac, quemadmodum Hippocrates ait lac menstruo fraternalium esse. Gemini matrici Sinus sunt ab utraque laterum parte leuiter discreti (in dextra masculinum, in sinistra foemininum concipi volunt) geminis in mare testibus respondentes, in vacca veluti cornua plurimum discreta sunt.

Foeminis vulua scorti conuersi similitudinē refert, extrinsecus nervosa, intrinsecus autem carnosior, & est receptaculū foetus; Muliebris pudendi sinus pilis decoratus, Græcum nomen *κτῆς* obtinet. At quæ sinum ambiunt Alæ vocantur. Inter has autem caruncula, quæ bifariam excreuit Græcorum lingua



*νύμφη*, nostra colliculum appella-  
re licet, quem quòd multo promi-  
neat, Aegyptii in virginibus exci-  
dere consueuerunt. Porro in ipsius  
naturalis collo musculus est, quo  
vrinam cum lubet retinemus, Anu-  
lus à figura, ab officio Fibula voca-  
tus est. Venæ in partem eius infe-  
riorem plurimùm aperiuntur, per  
quas sanguis expurgatur, qui graui-  
dis retinetur, cæditque in alimen-  
tum foetus & formationem. Nam à  
venis quæ secundas implicant, bi-  
næ aliæ prodeunt venæ, ab arte-  
riis indidem sitis binæ arteriæ, & à  
neruis vnus nervus mutuo in vnũ  
congressu, meatum quendã ab ana-  
tomicis græcis *ὀυαχον* appella-  
tum absoluunt, qui infantis vmbili-  
co inferitur, ex quo & enascitur &  
suspensus est, vel alueus est foetus, lo-



cus cui pōst suppeditat nutrimentū.

## DE MENSIBVS.

Alexan.  
bened.

Menstrua quum plurimum lunæ motu singulis mensibus profluunt, quo profluuiο virginibus vox mutatur, vt in maribus primo coitu, māmæ inde tumescant. Hæc non nisi semen incoctum ab Aristotele appellantur, ex partibus quæ supra infræque renes sunt, & à lumbis, minimis venis prodeūt ad vuluæ acetabula, quibus fœtus in vtero alitur, (vt dictum est) vel à puerperio iuxta naturalium ora: ex venis quoque duabus secundū os pubis iuxta vrinæ exitum erumpunt. Ex ea parte & fœminarum non prolificum semen in coitu (vt dictum est) effunditur, tanto in plarisque impetu, vt masculorum more longius exiliat, diuer-



sæ quidem naturæ ab eo, quod in  
vulvæ cauo prolificum restagnat. Gal.lib.  
Menstrua cōtingunt mulieri, vt sa- defi.  
nitatem tueantur. Retenta enim in  
conceptione foetui fomētum mini-  
strant: facta quidem ad conceptio-  
nem & lactis generationem. Alterū  
(inquit Galenus) nostræ generatio-  
nis principium, sanguis menstruus  
videlicet, humidum natura est. Gal.  
in comment. 1. lib. aph. sententia. 14.  
Qui crescunt. &c.

## DE PURGATIONE menstruorum.

Plærisque sane puellis anno. 14. Aegineta  
mensium expurgatio primū inci- lib. 3.  
pit, paucis admodum ante annum  
tertium & decimū, aut duodecimū  
muliebria proueniunt: plurimis ve-

b iiii



rò post annum decimum quartum tandem prorumpunt. Tempus autem vnicuique purgationi statum non est: plerisque etenim per biduū aut triduū, maximæverò parti quinque dierum spatio menses excernuntur, aliæ vsque ad septimum: paucae raræque sunt, quæ ad duodecimum vsque diem huic profluvio iugiter obnoxia expurgantur. Sistuntur autem huiusmodi muliebres denique expurgationes, partim quidem anno ætatis suæ quinquagesimo, partim verò, quanquam ea rara sit avis, non ante annum sexagesimum, nonnullis à septimo statim ætatis, (vt ita dicam) lustro, & potissimè bene curata cute, ac præpinguibus desinere atque ònino cessare menses cœperūt. Quando igitur lètè ægréque ea purgatio procedit, circa prothesmiam



Certum menstruorum terminū la-  
ua, potionatōque vel sisanno, aut  
porro capitato, cū pipere & ruta in  
hoc ipsum decoctis, reliquus potus  
ex passo fiat cretico: bibens autem  
huius potionis ea affectione oppres-  
sa cotylam, deambulando commo-  
uebit menstrua. Manducet verò lo-  
ligines, sepias, polypodas, & quæ-  
cumque id genus sunt: nam sangui-  
nem turbandi proliciendique po-  
tentiam habent.

DE MENSIVM FACVL-  
tate, Ex plinio.

Iam primum abigi grandines tur-  
binēsque, contrā fulgura ipsa in mē Plinius  
se connudata, sic auerti violentiam lib. 28. c.  
cæli, in nauigando quidem tempe- 7.  
states etiam sine menstruis. Ex ipsis  
verò mensibus monstrificis, alia di-  
ra & infanda vaticinantur: ē qui-



bus dixisse non pudeat. Si in defe-  
ctu lunæ solisve congruat vis illa,  
irremediabilem fieri. Non segnius  
& in silente luna coitus suos mari-  
bus exitiales esse atque pestiferos.  
Purpuram quoque ab his eo tempo-  
re pollui, tanto vim esse maiorem.  
Quocunque autem alio menstruo,  
si nudatæ segetem ambiant, erucas  
ac vermiculos scarabeosque ac no-  
xia alia decidere. Metrodorus Scep-  
sius in cappadocia inuētum prodit,  
ob multitudinem cantharidum il-  
las ire per media arua, rectetis super  
clunes vestibus. Alibi seruatur, vt  
nudis pedibus eant, capillo cinctū-  
que dissoluto. Cauendum verò ne  
id oriente sole faciant, sementem  
enim arescere. Item nouella vitis  
eius tactū in perpetuum læditur. Vt  
ad noxiam res medicatissima trans-



feratur, rutam & ederas illico mori.  
Sed præter hæc certum est, tactis  
alucariis apes fugere, linæque quum  
coquatur nigrescere. Aciem in cul-  
tris tonforum hebetari, æs contactū  
graue virus odoris accipere, & æru-  
ginem magis, si decrefcente luna id  
accidat. Equas, si sint grauidæ, ta-  
ctas abortum pati. Quin & aspectu  
omnino, quamuis procul visas, si  
purgatio illa post virginitatem pri-  
ma sit, aut in virginea ætate sponta-  
nea. Nam bitumen in iudæa nascēs,  
sola hac vi sponte superari. Et fila  
vestis contactæ, ne igne quidē vin-  
cuntur, quo cuncta. Cinisque etiam  
ille, si quis aspergat eum lauandis  
vestibus, purpuras mutat, floribus  
colorem adimit, ne ipsis quidē fœ-  
minis malo suo immunibus. Abor-  
tum facit illitus, aut si omnino præ-  
gnans supergrediatur. Que lais &



Cleophātus inter se contraria pro-  
 didēre de abortiuīs, carbone ē ra-  
 dice brassicæ vel myrtæ, vel tama-  
 ricis in eo sanguine extincto: item  
 asinas non concipere tot annis,  
 quot grana hordei contacta ede-  
 rint: quæque alia nuncupauēre  
 monstrifica, aut inter se pugnancia,  
 quum hic fœcunditatē fieri iisdem  
 modis, quibus illa sterilitatem pro-  
 nuntiaret, melius est non credere.  
 Bythus dyrrhachinus hebetari as-  
 pectu speculorum nitorem tradit.  
 Iisdem aduersa rursus contuenti-  
 bus, omnem talem vim resolui, si  
 nullum piscem habeant secum.  
 Multi verò inesse etiam remedia  
 tanto malo aiunt, podagras illini,  
 strumas & parotidas, panos, sacros  
 ignes, furunculos, epiphoras, tra-  
 ctatu earum mulierum leniri, lais



& salpa, canum rabiosorum morsus, & tertianas quartanásque febres, menstruo in lana arietis nigri, argenteo brachiali incluso.

Diotinus thebanus, vestis omnino ita infectæ portiuncula acu, vel pelliceo brachiali inserta. Sortica obstetrix tertianis quartanúsque efficacissimum dixit plantas ægri subterlini, multóque efficacius ab ipsa muliere, etiam ignoranti.

Sic & comitiales excitari, morbósque sanari Icethidas, aliás icacidias, medicus quartanas coitu finire, incipientibus duntaxat menstruis, spopondit. Inter omnes verò convenit, si aqua potúsque formidetur à morfu canis, supposita tantum calici lacinia menstruo tincta tali, statim metum eum discuti, videlicet præualēte sympathia illa Græ-



corum, quum rabiem canum, eius sanguinis gustatum incipere dixerimus.

Cinere enim eo iumentorum omnium vlcera sanari certum est, addita caminorum farina & cera, maculas autem è veste eas, non si & eiusdem farina ablui volumus. Cinerem verò per se rosaceo mistum, foeminarum præcipuè, capitis sedare dolores, illitum fronti, asperrimamque vim profluuii eius esse primis annis, virginitate resoluta. Id quoque conuenit, quo nihil equidem libentius crediderim, tactis omnino menstruo postibus, irritas fieri magorum artes, generis vanissimi ut æstimare licet.

Solum animal menstruale mulier est.



Nihil facile reperitur mulierum  
profluuium magis mōstrificum. Ares-  
cunt superuentu musta, sterilefcunt  
tactæ fruges, moriuntur insita, exu-  
rūtur hortorum germina, & fructus  
arborum quibus insidēre, decidunt  
Speculorum fulgor aspectu ipso he-  
betatur, acies ferri præstringitur,  
eborisque nitor, aluei apum emori-  
untur, æs etiam ac ferrum rubigo  
protinus corripit, odórque dirus aë-  
ra, & in rabiem aguntur gustato  
eo canes, atque insanabili veneno  
morsus inficitur. Quum & bitumi-  
num sequax alioquin & lenta na-  
tura, in lacu Iudææ (qui uocatur As-  
phaltites) certo tēpore anni super-  
natans, nequit sibi auelli, ad om-  
nem contactum adhærens, præter-  
quam filo quod tale virus infecerit.  
Etiam formicis animali minimo,

Plinius.  
lib. 7. c. 15.



inesse sensum eius ferunt, abiicitque  
gustatas fruges, nec post eam repe-  
tit. Et hoc tale tantumque omnibus  
tricenis diebus malum in muliere  
existit, & trimestri spatio largius.  
Quibusdā verò saepius mēse, sicut ali-  
quibus numquam, sed tales non gi-  
gnunt, quando hæc est generando  
homini materia, semine è maribus  
coaguli modo hoc in sese glome-  
rante, quod deinde tempore ipso  
animatur, corporaturque. Ergo cum  
gravidis fluxit, inualidi aut non vi-  
tales partus æduntur, aut faniosi, ut  
author est Nigidius.



CVRANDIS.  
17  
MENSIVM MORA.  
CAVSÆ.



Quæ singulis quibusque Aegineta  
mensibus mulieres repe lib. 3. c. 61  
tit purgatio, supprimitur  
quadoque vniuerso qui-  
dem corpore in-  
commoda vale-  
tudine affecto, interdū verò locel-  
lis modo earumdem priuata ægritu-  
dine vexatis, propter loci illius fri-  
giditatem, aut plagam, aut distēpe-  
rantiam oborta, vel acquisititiā af-  
flictionē, vt plurimū verò ex abor-  
tionibus, & propter principem ali-  
quam corporis partem, propria pas-  
sione afflictam, verbi causa, iecur,  
aut vētriculum, aut pectus quē græ-  
ci θώρακα dicūt, aut aliquid hu-  
iusmodi, quæ in diuturno accidunt

ε



morbo.

Gal. lib. 3  
de sym-  
ptomatu  
causis.

Neque mensium suppressionem, neque prauas expulsionem, omnium quæ ex utero profluere solent, difficile fuerit inuenire, si similes tibi scopos proposueris. Etenim nonnūquam uteri ipsius corpus, si solidum fuerit aut durum, causa est cur menses supprimantur: detinentur etiam nonnunquam ob materiam ipsam, quā vel crassum fuerit excrēmentū, vel viscosum, supprimuntur etiam nonnunquā, licet utile fuerit excrēmentū, obstructis ob huiusmodi humores vasis, quæ ad uterum descendunt. Præterea vniuersi corporis occasione, mulier interdum nihil expurgat, interdum plus iustò, interdū minus, nonnūquā etiam deprauatū. Nihil omnino excernit, ob multas exercitationes, & victum tenuē, &



quum ad alias partes repunt humores. Minus excernit, easdem ob causas, sed remissiores quàm pro naturali cōsuetudine. Plus autē ob diuturnum otium, & victū opiparum. Cæterum deprauatæ per vterū fluxiones (nominatur verò quicquid huiusmodi est fluxus muliebris) fiūt expurgato per hanc partem vniuerso corpore. Atque talē semper refert speciē id quod excernitur, quale est id quod in animante redundat: quippe rubrum excrementum sanguinis saniem declarat, album pituitam, pallidum bilem amaram. Præter iam dicta, est aliud ex vtero deprauatum profluuium, ob affectū aliquem ipsum infestantē eueniens. Insuper menses interdum supprimuntur, nō ob sanguinis penuriam, quā vel multa exercitatio (vt dictū est)

C II.



vel tenuis victus induxit, neque ob  
affectum in vtero cōsistentem, sed  
propter robustas vires, sanguine ad  
alias partes irruente. Etenim nemi-  
nem latet, quòd nōnunquā aut ma-  
ior mensium copia fluit quā antea,  
aut minor, aut omnino nihil fluit:  
aut prauum est quod affluit, ob pro-  
prios vteri morbos, siue ipsius cor-  
nua, siue ceruix, siue totum spatium  
afficiatur, atque sub hac diuisione  
steriles quoque cōprehēdi possunt.

Gal. in 5. Menstrua possunt fieri pauciora,  
aph 57. vel quia venæ ferentes ad vterum  
si menstrua menstruam purgationem cōprimū-  
plura. & c. tur, vel obstruuntur ob crassitudinē

sanguinis vel frigiditatem, & robur  
ipforum quæ sunt in vtero vasorū,  
adeo, vt quod influit non admittāt.

Fuch sine Mulieribus quibusdā menses sup-  
ex paulo primuntur, vel naturaliter, vel præ-  
& xio.



ter naturā. Si naturaliter, hinc colligere licebit, quòd mulier nulla inde molestia vel totius corporis, vel vteri afficiatur. A etatis itaque rationem iam descripsimus. Steriles *c. iia* mulieres in vtero habentes & saltatrices, naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis recremēti est, nimia exercitationis vehemētia absumitur, & vt summatim dicam, mulieres calidioris temperaturæ, validisque exercitiis vtētes & agrēstes, parum aut nihil per menstrua purgantur. Nonnunquam autē præter naturam menses nimia vel pinguedine, vel gracilitate supprimi solēt. Pingues enim exanguiore reliquis sunt, minimasque venulas habent: quique illis inest paucissimus sanguis, fere in pinguedinem transit. Graciliores verò ob diuturnum ali-

c. iiii



quem morbum extenuatae, nihil prorsus superuacui sanguinis continet. Præterea menses non defluunt, quibus sanguis vel crassus, vel lentus, vel per alia loca delatus fuerit: sicuti per nares, aut sedem, aliis etiam quod est thorace sanguinem eiectionerint, aliis quod est dissecta vena ultimam sanguinis inanitionem tolerauerint, menses suppressi sunt: sed & reliqua excretionum genera idem effecerunt, ut sudoris multitudo, assidui vomitus, alui profluvia, ac pustularum omne genus, quæ in cute efflorescunt. Sic præter has omnes causas menses supprimuntur ob acutos maximosque morbos, & ob alimenta quæ vel paucitate, vel multitudine sua excesserint. A paucis enim alimento paululum quidpiam confestim expirat, à multo verò meatus obstruuntur,



& exiretio intercipitur: sæpe etiam in ore vteri calli obtorti, aut carnis excrescentiæ, aut pinguedinis copia purgationem menstruam impediunt. Quibusdam etiam cicatrices vlcerum quæ in vtero præcesserunt, vasorum ora à quibus sanguis in vterum ferebatur, obstruxerunt. Nōnullis post abortum vteri ore exulcerato, ac deinceps ad cicatricem ducto, obstructio ac compactio superuenit, quæ sanguinis per vterum excretionē aufert: curæ quoque pertinaces, formidóque immodica, & ingens mœror menses intercipiunt, frigida denique aut alia vteri intemperies menses remoratur.

## NOTAE.

c iiii



Gal, lib. 6  
de locis  
affectis,

Accidentia quæ ob astricta menstrua infestare solent, nunc enarrare aggredior, sumpto initio ab his quæ ab Hippocrate in Aphorismis scripta sunt, præcipuè verò quum dicit: Si mulier neque prægnas, neque puerpera lac habet, menstrua eius defecerunt. At nullo in mammis apparente lacte, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas totū corpus molestat, item fastidiū quoque ut nulla sit cibi cupiditas, horror inæqualis, quòd si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atque fastidium, cupiātque mulier quædā aliena, iube ut obstetrix uteri cervicem tangat. Nā si citra durtiem clausa inueniatur, eā prægnātem esse coniicies. Nōnullæ cibum præterea euomūt, ac terrā, aut extinctos carbones, aut alia quædā huius-



cemodi ædūt. Si verò clausū fuerit os ceruicis vteri, ac duritiē quoque habeat, affectū aliquem in vtero esse portendit. Oportet itaque speculari obstetricē ad quā partem, vel declinet, vel retrahatur: nā in ea parte affectam vteri sedem esse coniiciendum est. Atque in quibusdam fœminis, eius partis dolor cum grauitate nō nihil significare potest: quin etiā in coxam dolor transit, ac crus ipsū quod ē regione est, per incessū claudicat. Quod si lōgiori tēpore supprimatur menstrua, nullāque medicus mulieri vacuationē promoueat, tumor aliquis præter naturā in ilibus interdū exoritur, ostendēs nimirum ex internis partibus quāmpiam esse inflammata. Nonnullis panus in extrema ilium parte excitatur: veluti viris quoque eodem in loco



nonnūquam oriri solet, qui vbi sup-  
 puratus aliquando fuerit, longo tē-  
 poris spatio vix finitur. Huiusmodi  
 accidentia suppressa menstrua sequi  
 consueuerūt, ac præterea lumborū,  
 & colli, & sincipitis dolor, qui etiam  
 oculorum fundamenta infestat: itē  
 febres ardentes, & vrinæ nigrican-  
 tes, cum rubra quadā sanie, perinde  
 ac si aquæ ex qua nuper mactatæ  
 carnes ablutæ fuerunt, fuliginem  
 quis immiscuisset, quibusdā vrina,  
 aut difficulter redditur, aut omni-  
 no supprimitur. Quum ergo horum  
 aliquid in muliere conspexeris, v-  
 terum veluti radicem ipsorum con-  
 iicere oportet. Quòd si per alium  
 quempiam corporis locum sanguis  
 effluxerit, aut inflammatio, aut  
 Erysipelas excitatur, an menstrua  
 purgentur interrogare debes: siqui-



dem nihil horum accidere solet integre purgatis,

Frigidioris autem temperaturæ Fuchf. fœminas ex iis potissimum dignoscemus, quòd somnolentiores, ad omnemque motum segniores sunt, ac colore candidiores, seu plumbeæ, vrina aquosa, pituitam quoque iugiter excreant, & interdum etiam pituitosos humores euomunt.

Calidioris autem temperaturæ notæ, iam commemoratis prorsus contrariæ sunt.

### PRAEDICTIONES.

Mulieri sanguinem euimenti, 5. Aph. 32  
menstruis erumpentibus solutio fit. 5. Aph.

Menstruis deficientibus, sanguis 5. Aph. 36  
ex naribus fluens, bonum.

Mulieri menses decolores, nec



per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam.

5. Aph.  
59

Si mulier neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt.

5. Aph.  
57

Si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si non fiant, ex vtero morbi contingunt.

Hipocra-  
tes libro  
de foetu.

Menstruorum retentio sequentes morbos gignit, conceptum impedit, corpus calefacit, venas implet atque distendit, vetricam premit, vrinam prohibet, dolorem lumborum & suffocationem excitat, coxendicem molestat, interdum putrescit & suppurat.

Dictis addunt Arabes, deliria, comitiales, locorum strangulationem, eorundem abscessus, corporis grauitatem, inappetentiam, con-



coctricis facultatis debilitatem, nau-  
seam, ructus, tusses, anhelationes,  
aqua cutem subeuntes, febres, mor-  
bos articulares, animi angustias,  
capitis & radices oculorum dolo-  
res, oletulorum exitum inhibet.

Suppressa muliebris purgatio mul *Aegineta*  
tarum & diuturnarum ægitudinū *lib. 3. c. 61*  
causa fieri consuevit.

Vrina lactis modo alba & densa,  
aut obscura liuénisque, mensium  
suppressorum, aut locellorum affe-  
ctorum argumento est.

Vrina albescens, rufescénsve  
cum squammosis resolutionibus  
nigricantibus eadem arguit, mo-  
dò mensium suppressorum reliquæ  
adsint notæ.

## NUTRICATIVS.



Fuchf,

Si à frigidis ac crassis humoribus  
 menses supprimuntur, cibos cali-  
 dos & extenuantes exhibebimus.  
 Vinum etiam fuluum, odoratum  
 & antiquum vt bibant præciple-  
 mus. Exercitia quoque & alia quæ  
 corpus calefacere, crassosque ac len-  
 tos humores incidere & extenuare  
 possunt, præscribemus.

Fuchf,

Cæterum calidiores & plurimū  
 exsiccatae mulieres curantur, si quā  
 maxime humectentur humerore hu-  
 midiorēque cibo & potu, quales  
 sunt qui ē carnibus agni, hædi, ē  
 piscibus teneras carnes habenti-  
 bus, auibz aleilibus, & similibus  
 parantur.

Vino vtendum candido non ad-  
 modum antiquo & diluto, Balneis  
 item dulcium aquarum, & vt in  
 paucis rem cōtraham, victus ratio-



ne ea vtendum, quæ hecticis adhibetur.

Alimenta porrò congruunt bel. Aegineta  
lè instructa, ritèque disposita, & humida holera, ac dulciora cuncta. Pisces saxatiles, aues teneriores, & lactis potatio, confectiones ex melle quæ μελιττώματα græcè dicuntur.

Vinum tenue, colore candido, non admodum vetus.

Non probantur carnes, neque legumina, excepta ptisana.

Vbi autem præfinitum purgationis tempus pro foribus iam constiterit, desquamatos pisces marinos, & ceu dictum est, molliores, quæ μαλάχια vocantur, & quæ cutis modo integuntur testa, vnde illis græcè nomē ὀσρακόδερμα est inditum, necnon porra capitata, cum ruta ac pipere elixa sumant, ius



quoque eorundem bibant.

REGVLAE CVRAN-  
DI MENSES SV-  
PRESSOS.

Quibus ex corporis ariditate  
menses suppressi sunt, denegabis  
ea quæ calefaciendo siccant.

Aperientibus medicamentis le-  
uioribus in curæ aggressu vten-  
dum, subinde sensim exhibenda  
sunt quæ validius aperiunt.

Hippocratis sententia est, calefa-  
ctione ex aromatis muliebria e-  
duci.

5. Aph.  
28

Lib. 8. de  
regali di-  
pouitioe.

Hæc emplastri modo vmbilico  
admoueri debere asserit Haly.



Intentio sanationis in ipsis est, ora quidem aperire vasorū quæ per-  
tingunt ad vterum, sanguinem ve-  
rò extenuare.

Gal.in.5.  
aph.36.  
Mulieri  
mēses de-  
co. &c.

## SECTIO VENAE.

Quum igitur ob aliquam inte-  
rancorum primariam affectionem  
abscinditur aut remoratur mulie-  
bris purgatio, nihil neque præstan-  
tius neque vtilius, quàm membri  
statim peculiari vitio mederi, atque  
post hæc vuluam sui muneris ad-  
monere per potiones. At vbi ni-  
hil horum quidem adfuerit, perspi-  
cuum est per se, & non per consen-  
sum matricem affici. Si itaque ne-  
que ætas, neque habitudo corpo-  
ris, neque aliud id genus prohibue-

Argineta

d



rint, sanguis per venam detrahendus est, non ante tamen præscriptum mensium diem.

Progressu verò temporis adiiciantur dies decem.

Aegine-  
tæ & Ga  
leni tem  
pore fie-  
bat. Auferatur verò non plus duabus  
libris cū dimidia, neque etiam mi-  
nus vna, siue venam secabimus.

Quod si febris pariter infestarit,  
in primis statim diebus febris san-  
guinem detrahare oportet.

Fuchsius. Si plenitudine laborauerit mu-  
lier, & nihil aliud prohibeat, à san-  
guinis missione curandi ratio in-  
choanda erit.

Secunda verò vena malleoli aut  
poplitis, idque non ante statum  
mensium tempus.

Gal.lib.  
de ratioe  
curandi  
per sang.  
viti. Quæ ex cubito fiunt euacuatio-  
nes, purgationes menstruas com-  
primunt, sanguinemque ad supe-



riores corporis partes retrahunt.

Que verò fiunt ex cruribus, tantum abest vt retrahant, vt etiam menses promoueant, ac vbi id facere volueris, tempus consueti mulieris circuitus tribus quatuorve diebus anteuertas, aut vena incisa, aut scarificatis talis cruris vnus pauculum euacuato: deinde postero die similiter facito in crure altero, vt tamen etiam istis diebus in quibus vacuas, & ante eos

quatuor aut quinque

extenuantem vi-

etum procu-

res.

**POTVS:**

**d il**



Gal.in.5. dunt, & humorum crassitudinem  
 apho.36. extenuant, quale est quod ex Cala-  
 Nu.men- mento fit, quo nos assidue vtimur,  
 ses deco. sapius enim ciere solent tardantes  
 &c. mensium purgationes. Mulieribus  
 Gal.lib. menses abunde prouocant & nepi-  
 de curan di & pulegium. Exhibebis ea in me-  
 di rone licrato cocta, sed antea contusa, ari-  
 per sang. da, cribróque subtili discreta, ac  
 missione. rursum trita vsque dum pollinem  
 tenuitate referant, ita denique me-  
 licrato insperge. Porro conuenien-  
 tissimum potui tempus est à balneo  
 inuolutis adhuc linteo. Atque hæc  
 quidem medicamenta mitia sunt.  
 Valentiora sunt fauina, & dicta-  
 mum, cæterum vsus antedictis si-  
 milis.

Aegineta Auspicante iam stata muliebri-  
 um hora adimat quidem cōpedes,



& potetur myrrhæ obolus, aut fabæ  
quâtitas aut castorium ex passio, vel  
melicrato, artemisiæve decoctû: aut  
saluiæ post balneû ex passio & absin-  
thio. Vinum verò absinthile ad om-  
nem curationem propinetur. Ve-  
rûm si validiora vehementiorâque  
res ipsa postulat remedia, hæc fuerit  
eorundē materia: Iris illyrica (quam  
vulgò Romani gladiolum dicunt)  
pota cum vino, cyperi radix, græcè  
cyperis nuncupata, ari radix, & ca-  
sia, rotundi odorati iunci (quem græ-  
ci *σχοίνον* dicunt) flos, nardus, he-  
lenique radicis decoctum, & myr-  
rhæ fabuly græci magnitudo, cum  
passio in dimidiato cyatho poscæ, &  
dictanni elixationis cyathi duo, &  
gutta ammoniaca, & sagapenum.  
Cæterum quæ nimia anxietate sto-  
machi torquentur, opopanax exi-

d iii



guum in pilulas redactū, & in cocto melle irrigatum & eliquatum. Con-  
suetā quædam nobis semina mulie-  
bria ciere nata sunt. Cæterum infe-  
riora & minoris efficaciam sunt, fœ-  
niculum, cuminum, apium, daucus  
Creticus, fœseli, anisum, ciceres &  
cercides, & omnia quæ ad mingen-  
dum cient.

Potui dentur radices circa ter-  
tium ordinem aperientes ex vino  
albo aut decocto quopiam menses ciē-  
te, verbi gratia: Radices apii, gra-  
minis, fœniculi, oreoselini, asparagi  
rubia passiuæ pentaphyllon, rufci.

Artemisia, nepeta, calamentum,  
scolopēdriom, semen rufci, acorum,  
absinthium, perpenſa, radix iridis,  
Lupini, semina apii, oreoselini sati-  
ni, & macedonici, origanum, men-  
tastrum, meum, valeriana, filer mon



tanum, ammi, fefeli cuminum, dicta-  
mum, casia, Inula, fatureia, abroto-  
num, allium, smyrnium,

Fortiora prædictis sunt ruta, gitti,  
sinapi, castorium, Veratrum atrum,  
colocynthis, astaphis, agria, myrrha,  
āmoniacum, fel tauri, succus cucu-  
meris syuestris, fel gallinæ, opopa-  
nax, piper, pyretthrum, papauer lu-  
teum, asphodelus.

### QVAE MENSE SCI-

ent simplicia ex plinio.

Aprii & oreoselini semen. li. 20. c.  
11. Cuminum Aethiopicum siue re-  
gium. lib. 20. Gith. lib. 20. c. 17. Si-  
napi satinum. lib. 20. c. 22. Narrubiū.  
lib. 20. c. 22. Hippomarathri semen  
& radix. lib. 22. c. 23. Lilii radices in  
vino decoctæ. lib. 21. c. 19. Centum-  
capita herba. lib. 22. c. 8. Oleū sam-  
psuchinum, siue Amaracinum. lib.

d iiii



21. C. 22, Anthemis siue chamæmilō  
 pota. lib. 22. C. 21. Bulbi radix pota.  
 lib. 22. C. 22. Sion latius apio in aqua  
 nascens. lib. 22. C. 22. Lupini sylue-  
 stres. lib. 22. C. 25. Cortex radicis lau-  
 ri. lib. 23. C. 8. Chamædris quæ & trif-  
 sago. lib. 24. C. 15. Ampeloprason. ibi-  
 dem. Stachys. ibidem. Chrysocomes  
 radix. lib. 21. C. 20. Thimum vtrum-  
 que. lib. 21. C. 21. Anemone cum pti-  
 sana sumptæ, aut vellere appositæ.  
 lib. 21. C. 23. Heliochrysum siue chri-  
 santhemum è vino pota. lib. 21. C. 25  
 Batis. lib. 21. C. 27. Vrtica cum sale.  
 lib. 22. C. 13. Caucalis. lib. 22. C. 22. Cō-  
 drillon siue condricille habet proxi-  
 mam terræ mastichen tuberculo fa-  
 bæ, quæ apposita, foeminarum men-  
 ses trahere dicitur. lib. 22. C. 22. Laser  
 è silphio foeminis datur in vino: Et  
 lanis mollibus admouetur vuluæ ad



menes ciendos. lib. 22. c. 23. Horde-  
um murinum, siue herba phoenicia  
trita ex vino pota, præclare ciet mē-  
ses. lib. 22. c. 25. Phacos syluestris. lib.  
22. c. 25. Cicercula. ibidem. Vitis ni-  
gra. lib. 23. c. 1. Fici succus lacteus ap-  
positus cū luteo oui, aut potus cū a-  
mylo. lib. 23. c. 7. Caprificus pota mē-  
ses cit cum luteo oui. ibidem. Baccæ  
lauri appsitæ tritæ, vel potæ. lib. 23 c.  
8. Cupressi ramenta pota. lib. 24. c. 5.  
Styrax potu. lib. 24. c. 6. Viticis se-  
men. lib. 24. c. 9. Ederæ corymbi ap-  
positi. lib. 24. c. 10. Harundo indica  
syriacâque admotu. lib. 24. c. 11. Ery-  
throdani, siue Rubiæ radix & semē.  
lib. 24. c. 11. Rosmarini semen. ibidē.  
Pæoniæ radix. lib. 26. c. 15. Radix cal-  
læ. lib. 27. c. 8. Onopordō lib. 27. c. 12  
Smyrni folia & radix. lib. 27. c. 13.  
Thlaspe alterum genus. ibidem.



Impubium puerorū vrina si deco-  
quatur ad dimidias partes cum por-  
ro capitato nouo fictili, vaporatio  
ea menses foeminarum cit. lib. 28. c.  
6. Fel taurinum lana succida apposi-  
tum. lib. 28. c. 14. Olimpias thebana  
addidit hyssopum & nitrum. ibidē.  
Testes castorii duabus drachmīs  
ex aqua cum pulegio poti. lib. 32. c. 3.

### POTIONES COM- positæ.

Radicum acori, iridis, oreoselinī,  
asparagi. an. ʒ. i. seminum apii, foeni-  
culi, ainsī, dauci, ammi, vrticæ. an. ʒ.  
i. calaminthæ, absinthii. ā. ʒ. f. origa-  
ni, abrotoni, artemisiæ, pulegii, asa-  
ri. ā. m. i. hisopī. m. i. f. Bulliāt singu-  
la in aqua iustæ quantitatis, quoad  
tertia pars absumpta fuerit, dein ex-



colentur & saccharo sufficienti adhibito, adiiciantur serapia ex calamintha, & hyssopo, & ex marrubio. an. ʒ. i. ꝑ. misce, fiat potio pro terna portione propinanda à cubili ieiunæ.

Castori. ʒ. i. mentastri in puluerem redacti. ʒ. ꝑ. Vini antiqui, aut mulsæ. ʒ. ʒ. misce, & à balneo calidum propinato. Potio serapionis medici danda mulieri cui suppressi sunt menses, hælitaturque an<sup>u</sup> vtero gerat: si pregnans est, foetui vires calfaciendo præbet, alioqui menses cit locellos aperiendo.

Castorii, anisi, seminis apii. an. ʒ. i. trita secerniculo traiice & ex vino potui dato.

Potio Galeni menses deducit foeminis, probè cit vrinam, & omnino admiranda confectio est hy-



DE MORB. MUL.

dropicis, hepaticis & nephriticis. Aloes. ʒ. c. mastiches. ʒ. i. croci. ʒ. i. nardi indicæ. ʒ. i. cinnamomi. ʒ. i. carpo balsami. ʒ. i. asari. ʒ. i. tundito, & angustissimo cribro excernito, atque aridum vt ne transpiret seruato, & cū vino potui dato cochlear vnum. Menses porro puluis iste valentius ducit artemisiæ decocto dilutus.

SI EX PITVITA  
comprimuntur menses,  
potiones.

Chamæ pitheos, chamedrios, origani, saluiæ, rosmarini, sisimbrii, calamenti, mentastri, thymi. an. m. i. rad. rusci, asparagi, apii, oreoselini, raphani sylvestris, rubiæ & valerianæ. ā. ʒ. i. f. seminis iuniperi. ʒ. ʒ. seminis vrticæ, dauci cretici, ammis, anisi,



foeniculi, costi. an. ʒ. ʒ. phaseolorum  
rub. cicerum arietinorum, an. p. ʒ.  
terantur parum & decoquantur, &  
ex decocto colo secreto cum saccha-  
ri libris tribus confice serapium, qui  
aromatizetur cū cinnamomo electo  
& casia, præbe coquendum curato.  
Portio exhibitionis esto sesquidra-  
chmæ cum. ʒ. tribus decocti sequen-  
tis quolibet mane, ieiuno ore ven-  
triculi. Phaseolorum rubrorum, ci-  
cerum rubrorum. an. p. ʒ. seminis iu-  
niperi. ʒ. ʒ. radicum valerianæ, ra-  
dicum rusci, raphani sylvestris, A-  
sparagi, apii, & oreoselini. ā. ʒ. ʒ. cha-  
mædryos recētis. m. ʒ. dauci, ammis,  
anisi, foeniculi. an. ʒ. ʒ. radicum ru-  
biæ. ʒ. ʒ. conterito paululum, & co-  
quantur.

Oxymellitis compositi. 3. 3. sera-  
pii ex artemisia. 3. 2. liquoris stillati-



tii artemisiæ, quinque radicum communium aperiētium calidarum, vel bipinnellæ, aut betonica, vel florum sambuci, aut apii. an. ʒ. ʒ. limpidum facito, omnia simul mista pro triplici portione, poteris aromatis condire puta cinnamomo aut casia. Diebus octo ante mēsum naturale profluuium hanc curandi rationem aggreditor. g.

### SI EX FLAVA BILE.

Artemisiæ. ʒ. ʒ. adianti, oxalidis, intybi erratici, scolopendrii, betonica, eupatorii, apiastri, mercurialis. an. ʒ. ʒ. quattuor seminum vulgò refrigerantium dictorum maiorum, seminis viticis, seminis buciæ, seminis pæoniæ, seminum asparagi, seminum abrotoni, intybi erratici, basilici, & lithospermatis. an. ʒ. ʒ.



Radicum valerianæ, rusci, asparagi,  
oreoselini & apii . an. ʒ. 2 , iuniperi,  
foenigræci. an. ʒ. 1. f. cyperi, spicæ car  
di. an. ʒ. 2. f. cicerum rubrorū , pha  
seolorum. an. p. 1. trita parum omnia  
in aqua coquantur, cōfice serapium  
cum tribus sacchari libris, quod o  
doratiorem cinnamomo electo fa  
cies . Huius sumito sesquiunciam,  
quam immisce liquorum stillatio  
rum intybi erratici, cichorii & ab  
sinthii. an. ʒ. 1 . similis esto ponderis  
quælibet portio , perseverando ad  
mensium debitum tempus vsque,  
vel quo ad alteratum fluxuūque vi  
cinum percipias humorem nocen  
tem. Serapii acetosi simplicis. ʒ. 1 . o  
xymellitis simplicis. ʒ. ʒ. liquoris stil  
latitii endiuæ, Cichor. & absin  
thii. an. ʒ. 1. misce.



DE MORB. MVL.  
SI EX ATTRA BILE,  
potiones.

Scolopendrii, adianti, chamædry-  
os, origani, calamenti, artemisiæ, stœ-  
cadis, eupatorii, florû genestæ, bora-  
ginis, buglosæ & violarû, vniuscui-  
usque. m. f. radicum asparagi. fœmi-  
culi, apii & capparum. an. ʒ. i. thymi  
in fine decoctionis iniecti. ʒ. i. præ-  
dictis potes addere glycyrrhizæ, vua-  
rum passerarum. an. ʒ. f. coquantur, &  
ex decocto colo traiecto concinna  
serapium cum sacchari libris tri-  
& aceti. ʒ. 4. quod odoratius sit cin-  
namomo sibi misto, cuius portio e-  
sto. ʒ. i. f. cum liquorû stillatitiorum  
fumariæ, buglosi, & artemisiæ. an. ʒ.  
i. detur à cubili & vespere, quotidie  
ad humoris solutionem vsque.



Vel. Oxymelitis simplicis. ʒ. 2. sc-  
rapii acetosi ex radicibus. ʒ. 1. liquo-  
rum stillatitiorum florum, sabuci, bi-  
pinnellæ & asparagi. ā. ʒ. 2. sunt duæ  
portiones, quibus clarificatis non-  
nihil cinnamomi addere commodè  
potes.

## PVRGATIONES HV- morum per aluum.

Et quidē purgatio totius corporis, Gal. in. 5  
quando crassi euacuātur humores, Aph. 36.  
tales sanat dispositiones. Si verò de- mul. cri  
colores scriptum sit, multo magis mēses de  
purgatio sanabit ita se habētes mu- co.  
lieres. Neque enim propter humo-  
rem pituitosum tantummodo, sed  
& propter melancholicum & bilio-  
sum, menses fiunt decolores.

Datur suppressionis mensium tē- Ga. lib.



de curā pore medicamentum, quod proprie  
di rōne amarum dicitur, centum habens  
per sang. drachmas mixtis aliorum medica-  
miss.

Hiera pi minum cuiuscunque sex. Optimum  
cra.

est vbi cinnamomū acceperit, post  
diem septimum, siue octauum, pur-  
gatione cum hiera vtendum. Hiera  
quidem ex colocynthide purgabi-  
mus, duarum drachmarum pondus  
Paulus. in melicrati cyathis sex potui præ-  
bentes. Quòd si febris pariter infe-  
stet, hiera quidem vtendi locus non  
est. Hiera picra, Eclegma diaphœ-  
nicon, Eclegma. indum,

Catapotia ex Agarico, ex benedi-  
cta, Foetida.

## SVBDVCTIO PI

tuitæ.

Medullæ cassiæ fistularis extra-  
ctæ cum decocto chamædryos, gly



cyrhizæ, cassuthæ, vuarū passarum,  
polypodii querni, & adiati. ʒ. ʒ. ecle-  
gmatis indi. ʒ. ʒ. serapii de radicibus  
cum aceto. ʒ. ʒ. misceto, dato ieiunæ  
à cubili.

Vel.

Agarici. ʒ. ʒ. zingiberis. ʒ. ʒ. salis  
gemæ ʒ. ʒ. diluatur sero caprillo ad-  
dita oxymelitis scillitici. ʒ. ʒ. immer-  
gatur simul horis duodecim, & cō-  
pressum coloque traiectum ius potui  
à cubili ieiunæ dato.

Catapotia foetida voranda nocte  
exibeto.

Turpeti. ʒ. ʒ. zingiberis. ʒ. ʒ. sal.  
gemmæ. ʒ. ʒ. sacchari candidissimi.  
ʒ. ʒ. omnia leuigato, & cum sero ca-  
prillo aut iure pulli, vel iure cicc-  
rum arietinorum propinato.

Rosarum rub. zingiberis, cinna-  
momi. an. ʒ. ʒ. fantalorum alborum  
& rub. an. ʒ. ʒ. hermodactylorum. ʒ. ʒ.

e u



DE MORB. MVL.

turpeti. 3. 4 . diacrydii. 3. 2. f . masti-  
ches. 3. 1. sacchari librā vnam quod  
soluatur in liquoris stillatitii arte-  
misiæ, confice quadras pōd. 3. f. dato  
vnam ieiunæ a cubili.

SI EX BILE

staua.

Medullæ casia fistularis decocto  
communi extractæ, aut manna. 3. 1.  
eclegmatis ex succo ros. 3. 1. f. confe-  
ctionis hamech. 3. 1. serapii violacei.  
3. 1. potui dato.

Rhabarbari electi 3. 2. spicæ nar-  
di. 6. aut cinnamomi tantumdem.  
Vino optimo dilue, & horis duode-  
cim in sero caprillo immerge, sub-  
inde valenter traiciendo compri-  
me. Colamento adde manna, au me-  
dulle casia fistularis cribro secretæ  
3. 1. separii violacei. 3. 1.



Propinato demum ea quæ bilem  
per sedem educere valent, quæ te  
edocēbunt alii medici.

**BILIS ATRA SIC**  
educitur

Adianti, florum vtriusque bu-  
glossi & violarum, lupi salictarii,  
stæchadis, chamædryos. an. m. f. po-  
lypodii. 3. 3. glicychizæ vuarum  
passarum. an. 3. f. terantur paululum  
& coquantur in aqua sufficienti, in  
fine decoctionis adde epithymi. 3. f.  
& cum hoc decocto, cribro extraha-  
tur medullæ cassiæ fistularis, aut  
mannæ. 3. 1. confectionis hamech. 3.  
1. f. diaphœnicon. 3. 2. serapii viola-  
cei. 3. 1. detur à cubili.

Cortic. Myrobalanorū indorū. 3. f.  
luteorū. 3. 2. diluantur horis duo-

c iiii



DE MORB. MUL.

decim in sero caprillo, colo valen-  
ter deinde traice, colamento adde  
medullæ casia fistularis aut mānæ.  
ʒ. i. epithymi friati. ʒ. 2. zingiberis.  
gran. 6. mell. rosacei. ʒ. i. fiat potio,  
detur. &c.

Globuli indi uorandi sunt.

BALNEA ET INSES-  
sus.

Si ex pituita.

A succorum subductione balnea  
sunt ex chamæmelo, artemisia, mē-  
tastro, & aliis quæ in decocto pitui-  
tam proffigante memorata sunt.

Vel. Sabinæ herbæ, origani,  
calamenti, apiastri, pulegii, menta-  
stri, fertulæ cāpanæ, chamæmeli. an.  
m. 2. chelidonii, peucedani, prassii,  
absinthii. an. m. 1. foliorum lauri, la-  
uendulæ, mercurialis, rosmarini,



ocymi, florum sambuci. ā. m. 3. artemisiae. m. 6. rad. valerianae. lib. 2. conterantur paulum omnia simul dempta artemisia, quæ seorsum in sacculo includatur, deinde omnia simul coquantur. Ex his rebus sacculus vnus impleatur, super quem in balneo sedeat mulier, & super fœmur sacculum artemisiae calidum teneat, & bis in die ieiuna balneum intret, & pro arbitrio in eodem stet. Cubile subinde petat, & vnguento vngatur quod inter sequentia vngenta offendes.

Si ex flaua bile.

Subducto humore bilioso, tertio die tale confice balneum, quod accipit. Althœæ cum rad. m. 6. artemisiae. m. 4. florum sambuci. sol. salig.

c. iiii



DE MORE. MYL.

cis, foliorum violarum, polytrichi.  
an. m. 2 valerianæ sesquilibram, fœ-  
nigræci lib. 2. seminis lini lib. 1. f.  
terantur parum, artemisia seorsum  
recondatur in sacculo. Ex aliis im-  
pleatur sacculus vnus & coquantur  
omnia simul, artemisiæ sacculum in  
balneo super fœmur teneat, altero  
sacculo insideat, dein pétat cubile:  
tuncque pubes & os sacrum inun-  
gatur vngueto quod describemus.

Si ex atra bile, balneum esto tale,  
quale ex pituita.

VNGVENTA.

Si ex pituita.

A balneo in lecto hoc vngvine  
vngatur ante & retrò. Olei lilini,  
olei amygdal. dulcium, medullæ cru-  
ris vituli. an. 3. 1. mucoris althææ,



foenigræci & seminis lini. an. ʒ. ʒ. f.  
ceræ parum. Post inunctionem bi-  
bat pulueres & edat confectiones  
describendas.

Si ex bile flaua.

Olei amygdal. dulcium. ʒ. ʒ. f.  
medullæ cruris vitul. ʒ. ʒ. butyri re-  
centis, pinguitudinis gallinæ, mu-  
coris foenigræci & seminis lini. an.  
ʒ. ʒ. f. ceræ parum, cōcinnato vnguen-  
tum, quo os sacrum & pecten inun-  
gantur.

Ex atra bile.

Vngatur vnguento quo pituitosæ  
inungendæ sunt. Post quartum di- Aeginetæ  
em à purgatione, dropace vnguento  
circa pectinem lumbos ac foemora  
ægotans illiniatur.

Olea quibus inungi debet mulier,  
cuius menses suppressi sunt. Oleum  
lilinum. Rutaceum. Spicatum. Ole-



tim ex sabina herba.

PVLVERES, ECLEGMATA,  
ET PASTILLI.

Si pituita.

Inunctione peracta exhibeto cochlear pulueris sequentis ex vino decoctionis pituitam proffigantis.

Cinnamomi electi reiecto cortice exteriori, corticis casia fistularis. an. 3. 2. casia. 3. 1. f. croci. 3. 2. aristolochia rotunda, perpenſa, calami odorati, corticis radicum capparum, costi, dictami, rad. tormentilla, rad, iridis, eryngii, lacca. an. 3. 2. chamaepithyos, chamedryos, foliorum lauri, origani, polii, zingiberis, calamenti, thymi, seminis smyrnii, seminum ruta syluestris, dauci, nusturtii & hisopi, carpesiorum, nigellae, ammis, anisi, marathri, baccarum lauri, sagapeni. an. 3. f. sacchari quod pon-



dere omnia æquet, friato & vtere vt dictum est. Vel.

Acci. pulueris prædicti dēpto saccharo. ʒ. ʒ. sacchari candidi liquati in decocto menses ciente lib. ʒ. pan ge quadras, quarum pondus esto. ʒ. ʒ. detur vnā post inunctionem, dein bibat decocti menses prolicientis. ʒ. 2.

Pastilli ex myrrha. Triphera magna siue opio profunt. Acci. fructus sabinæ. ʒ. 1. ʒ. rutæ siccæ. ʒ. 2. ʒ. seminis rutæ aggreſtis. ʒ. 2. laserpicii, ammoniaci, rubiæ passiua. an. ʒ. ʒ. confice ex his simul friatis globulos serapio ex artemisia exceptos, exhibeto ægrotæ. ʒ. 2. ex vino decocti menses cientis, à balneo, aut à suffitu, vel ab euaporatione.

Vel. Cinnamomi, succi cyrenaici, fructuum sabinæ, piperis nigri. ā. ʒ.



2. myrrhæ, castorii. an. 3. f. excipe  
melle sufficienti in eclegma exhibe-  
to. 3. 2. ex vino decocti menses pro-  
ritantis, à suffitu, aut balneo, vel ab  
æstuatione.

Si ex staua bile.

Abalneo dato cochlear sequen-  
tis pulueris cum. 3. 2. decocti menses  
suppressos ob stauam bilem cientis,

Cortic. casia fistularis, cyperi. an.  
3. 1. f. rad. tormentillæ, rad. pæoniæ,  
cinnamomi reiecto superiori corti-  
ce. an. 3. 2. croci, seminis bauciæ syl-  
uestris, seminis pæoniæ. an. 3. 1. semi-  
nis viticis, seminum apii, ocymi, o-  
reoselini, mercurialis, asparagi &  
milii solis. an. 3. f. adianti, polytri-  
chi, chamæmeli, betonicæ, eupato-  
rii, spicæ nardi, schanianthi, lupi sa-  
lietarii, seminis endiniæ. an. 3. 1. sac-  
chari ad pondus omnium, leuigato



& misceto.

Reiecto saccharo, ex puluere prædicto pange rotulas aut quadras, in quibus concinnandis pro . ʒ. i. fragmentorum adde sacchari (quod in decocto biliosos iuuante liquetur) libram vnam.

Si ex atra bile.

Ex his quæ attram arcent bilem pulueres & placentas confice.

His peractis saphena vena aperienda est, hinc ad ligaturas veniendū est.

LIGATURA E.

Probatum item inferiorum corporis partium arctior cū ligaminibus ad treis vel quatuor dies cōstrictio: auspicante verò iam statura muliebrium hora, adimat quidem cōpedes, sed potetur myrrhæ obolus, & propinentur reliquæ potiones menses cientes.

Aeghmeta



# FOTVS, EVAPORA- tiones & suffitus.

Abili.

Abrotoni, anethi, artemisiæ, chamæmeli, calitrichi, apiastri, mercurialis, florum sabuci. a. m. .i. fœnigræci, seminis lini. an. lib. f. ex his contritis & in vino coctis in vaporario aut folio, balnei loco vaporetur mulier. Huius loco talem facito suffitum. Seminis viticis. ʒ. .i. f. anethi. m. .i. carei, costi, an. ʒ. .i. terantur parum, & per infundibulum fumum mulier in locellos vestibus tecta sedensque recipiat.

A pituita.

Para æstuarium ex pharmacis quibus confectum est balneum.

Amoni, galbani. an. ʒ. ʒ. succi cyrenaici. ʒ. .i. f. frangantur parum, & in carbones iniiciantur, suffianturque



locelli, fumus tamē non pertingat  
ad nares.

Fuchsius.

Suffitis etiam ex styrace galbano, thure, bdellio, radice aristolochiæ, artemisia, nigella, cariophyllis, cinnamomo & similibus paratis vtendum erit. Fouēdus quoque vterus odoratis fomentis, maiorana, serpillio, calamintha, chamæmelo, fertula campana, pulegio, artemisia, radice iridis, & similibus in olla decoctis, quam operculo perforato operire oportet, arundinemque, aut alium canalē foramini insertū vndique circumlinere, vt deinde sedens mulier excepto canali foueatur.

Proderit etiā vt mulier huic decocto vsque ad vmbilicū infideat, & inde pessos sibi admoueat.

CVCVRBITVLAE.



Nequæ inutile erit cruribus cucurbitulas affigere.

Iniectiones

Fuchf.

Paulus,

Métrachitæ, siue metrâchitæ gallicè vne sonde. Arabicè argalia.

Metranchitis etiam vtendum, in quem vsum vtero infundimus olea calida, irinum liliaceum, laurinum.&c. In sinum porrò ipsum infundatur susinum, aut amaracinum.

Succi mercurialis & absinthii, artemisiæ.an. ʒ. 6. poteris addere. ʒ. 2. puluerum vl. ciendi menses habentium, & innciere in locellos.

PESSI ET PRO  
sthera.



Est autem pessulus lana pectita, & quodcunque aliud teres, digiti hu-  
 mani speciem præferens, in quo me- Aegineta  
 dicamenta sustinentur. Pessus ergo  
 apponatur ex medicamento è no-  
 uem rebus constante, & ob id  
*ἐννέφαρμακον* nomen obtinente,  
 aut olibanius.

Prostheta præterea (sunt autem ea Aegineta  
 medicamenta quæ molliore lana ex-  
 cepta, mulierum naturalibus subii-  
 ciuntur & condiuntur, barbari na-  
 stalia vocant) quæ menses ciendi  
 munus subeunt: ex his constant,  
 myrrha, absinthio, aut lupinorum  
 elixatione eliquata, seu rutæ succo  
 contrita, bdellióque non absimili-  
 ter. Styrax item & syluestris oleæ  
 gummi, succúsve rutæ compari mo-  
 do, vel Aristolochia longa in col-  
 lyrii, hoc est glandis formam affa-



brefacta, & concinata. Consimili  
 præterea eodémque modo centau-  
 rii grandioris radix, aut veratri, aut  
 liquor scammoniae & colocynthi-  
 dos, medulla per se, & artemisia ca-  
 taplasmatis modo illita, cum ruta,  
 galbanúmque facto inde suffitu &  
 fotu. Quæ utique ipsa & foetum e-  
 tiam conceptum utero elidere, at-  
 que eiicere naturæ suæ aptitudine  
 possunt. Pessis etiam in uterum de-  
 missis, necessitate sic exigente utē-  
 dū, ex quorum numero hic est, qui.  
 R. Tripheræ magnæ citra opiū.  
 ʒ. i. farinæ erui, nigellæ, rubiæ tin-  
 ctorum, artemisiæ, pulegii. an. ʒ. i. f.  
 succi rutæ. ʒ. 2. misce, fiat pessus, qui  
 cum lana, vel æsipo supponatur.  
 Vel. Myrrhæ, bdellii, styracis, an.  
 ʒ. i. calaminthæ, abrotoni, absinthii.  
 an. ʒ. i. f. radicis acori, rad. rubiæ



tingtorū. an. 3. i. feminis nigellæ, rutæ aridæ, baccarum lauri. an. 3. 2. fabinæ. 3. i. castorii. 3. f. redigantur singula in puluerem, & cum melle, aut triphera, aut mithridati antidoto quod satis est, formentur pelli.

Si menses supprimantur ex pituita valentioribus pellis ciendi sunt, vt theriacæ electæ. 3. f. castorii, ammoniaci. an. 3. i. misce, & coto in mercurialis succo immerso excipe.

Vel Nigellæ, Astaphisagriæ, centaurii minoris. an. 3. i. veratri candidi, vitri friati, salis gemmæ, piperis nigri, diacrydii. an. 3. i. aloes, ladanii galbani, herebintbinæ, styracis. an. 3. i. f. ambaris. 3. f. omnia cū pistello calido misceantur, demum in panno lineo cum mercurialis succo immerso include. Vel.

Theriacæ, mithridatidis aut opopa-

f ii



inacis. ʒ. i. castorii, ammoniaci. an. ʒ.  
 i. succo mercurialis excipe in pessulos.  
 Si ex flaua bile.

Ex cuiuslibet pharmaci sequentis friamentis, pessulos conficere potes, aut ipsorum succo. Mercurialis, artemisiæ, sampsuchi, absinthii, chamædrys, chamæpithyos succo. Pulueres sunt ex nitro, amomo, myrrha, aristolochia rotunda, calamo odorato, caryophyllis, maiorana. Eclegma ex succo rosarum cum saccharo in canulam immittitur, ut pessi solida formam recipiat, & pessus filo appensus & in locellos immissus, filo. fœmori alligatur.

Ex radicibus oleo tinctis concinantur pessi. Verbi causa: Ex radicibus Rubiæ passiuæ, flōmi, vtriusque maluæ, iridis, apii, acori.

Olea sunt, ex lilio, ex castorio, ex



succo cyrenaico, & ex costo. Pulue-  
res quibus pessuli aspergendi sunt,  
ex succo cyrenaico, costo, castorio,  
euphorbio, myrrha, turpeto, scam-  
monio, veratro cādido, sabina her-  
ba, nigella, & galbano.

## NIMIA MULIEBRIS EX

PURGATIO, HAEMOR-

rhagiāque locellorum,

& muliebri proflu-

uium.

Destillatio (quā *ῥευματισμὸν* græ- Paulus  
Aegineta  
ci nuncupant) est muliebriū locel-  
lorum fluxus, vniuersi corporis ex-  
purgati. Redundare menses in Fuchf.  
mulieribus dicimus, quando vltra  
consuetum tempus purgationis ma-  
gnā copiā effluxerint. Tempus au-  
tem vnicuique purgationi statū &  
ordinatum non est, multis enim ad

f iii



duos tréſve dies, haud paucis vſque ad quintum profluit, aliis etiam ad ſeptimum vſque, rarò ad duodecimum purgatae ſunt.

**Aegineta** CA V S A E, hæmorrhagiæ & fluxus muliebrium locellorum. Cæterum immodicè & plus iuſtò expurgantur non rarò mulieres, interdum quidem menſibus auctis, atque cumulatius quàm par ſit, impetùque procedētibus, interdum verò iniuſtæ & integræ ætatis nouæ nuptæ partubus. Nonnullæ magna quidē ex parte ſua quoque ſponte ceſſant. Continuè verò in ἐμβλάſεει fortiter ſanguinis ſit profluuium, ita quidem vt plerunque inferat periculum, cauſæ fluxus muliebrium locellorum.

**Aegineta** Eiufcemodi verò ideam ac ſpeciem præfert id quod euacuatur, cu-



iufmodi eft humor qui in corpore  
redundat: Aliud rubrum quidem,  
inftar faniei, aquofive humoris, quē  
ἰχθῦς græci vocant.

Alterum verò candidum à pitui-  
ta proueniens, Aliud autem palli-  
dum luridūque, aliud pirrocholō,  
id eft, amaræ bilis inftar. Nonnū-  
quam aqueum denique fanguinem  
eiiciunt, quemadmodum in phle-  
botomia aufertur atque procedit.

Animaduertere interim accuratiffi-  
mè oportet, ne qua anabrosis, id  
eft erosio in locellis enata consti-  
terit, fit ob fracta, aut aperta vafa,  
vel magna vel parua.

Poffibile eft fi ora vaforum quæ  
pertingūt ad vterum vltra modum  
aperiantur, & fi fanguis vel calidi-  
or, vel tenuior fiat, & totum corpus  
propter malum habitū aliquem ag-

Fuchf.  
Gal. in. 5.  
Aph. 57.  
fmēftrua  
plura fiāt  
&c.

f iiii



grauetur sanguine, & si modum naturæ conuenientem sua multitudine non exceſſerit, quare ipſum expellit ad venas quæ in vtero ſunt, vt in fluctionibus accidit, alias ad aliam partem immodicas fieri menſtruorum euacuationes.

Opinio  
Arabum.

Redundantibus humiditatibus ex venis opplētur locelli, quæ ex aliis ſæpe membris in ipſos deferuntur, quos humores natura per vuluā eiicit: nam duæ venæ magnæ, caua ſcilicet & porta, in venulas tenuiſſimas plurimâſque diſperſæ locellos intrant à quibus nonnūquam diuturni ſucci, deſtillationis modo, interdum rubri, quandoque pallidi, ſæpe etiam albi, aquoſique interdum deſluunt. Quorum cauſa eſt, locellorum, iocinoriſve, aut alicuius alterius membri, vel concoctri-



cis eorundē facultatis imbecillitas.

Causæ externæ sunt, percussio, Arabum, casus, vulnus, cursus, saltus, cibi sanguinem extenuantes, vel ipsum acutiorem vel ardentiolem facientes. Verbi causa, Aromata calida, Vini albi & clari potus.

Causæ internæ sunt locorum calor exuberans, sanguinis redundātia, facultas expultrix ualens, retentrice imbecilla.

### NOTAE.

Notanda autem ac deprehendenda fluxus species est, ex perpetuo locorum madore, dissidentibus colore humoribus. Laborans autem plarumque solet pallefcere, cibum auersari, & mediam sustinere, in deambulationibus quoque spiritus difficultatem sentire, oculos insuper habere tumefcentes, interdum

Aegineta  
de mulie-  
bri pro-  
fluio.



quidem cum dolore, interdum verò  
citra dolorem, & id quidem vel cū  
exhulceratione, vel absque exhul-  
ceratione, siue vulua inflammante  
fordidè, siue purè.

Fuchsius

Amplioribus vasis ruptis aut a-  
pertis confertim sanguis profluit,  
minoribus verò apertis, sensim, nec  
magna copia promanat. Ab erosio-  
ne si accidit, tum non solū pau-  
latim, verū etiam cum maximo  
dolore effluit. Porro quum im-  
modicè promanant menses, color  
fædus consequitur, pedes molli tu-  
more attolūtur, corporis robur pro-  
sternitur, vitatur ciborum tum ap-  
petitus tum concoctio.

### PRAESAGIA.

aph. 57 Si menstrua plura fiant, accidūt  
morbi: & si non fiant, ex utero mor



bi contingunt. Mulieri menses  
decolores, nec per idem semper tē- 5.aph. 39  
pus venientes, purgationem indi-  
cant esse necessariam. Mensium  
fluor redūdans iuuenibus molestis-  
simus, senioribus autem vt pluri-  
mū mortalī. Si longo tempo-  
re fluxerint menses, tandem aquas  
cutem subeuntē inducunt, & ani-  
mam subinde agere cogunt.

In fluxu muliebri si conuulsio & 5.aph. 56  
animi defectus aduenerit, malum.

Non confestim sanguinis impetū Fuchs,  
localibus remediis reprimere conā-  
dum: nam multa sequerentur in-  
commoda, nempe hydrops, neruo-  
rum, aut oris ventriculi, aut capitis  
pathemata.

## VICTVS.



Aegineta  
Fuchsius.

Chondrus lotus è posca, aut oryza, aut halica, cibi loco sunt adhibenda. Vino ita habentes abstinere expedit. Cibis & potionibus austeris & adstringentibus vtendū, Assis autem potius quàm elixis vescatur ægra, carnibus potissimum, quibus suapte natura deficcandi facultas inest, vt auium mōtanarum, & agrestium animalium: motu verò abstinendum, & pro eo adstringenti potione vtendum. Lac in quo extincti sint lapides fluuiales candentes, aut ferrum ignitum, potui detur. Oryza, chondrus, portulaca hesitātur, rubi item surculi cum carniū iure decocti, brassicæ probe cocti, lens palustris ex aceto cocta.

Singulare præsidium in sequenti ferculo esse asserit Gaynerius.

Accipe folia plantaginis & flo-



res flommi, terito: his adde nonnigil radicis symphyti probè coctæ, & secerniculo traiectæ, parum item casei recentis pinguitudine referti, & pinguedinis renum caprarum, aut arietis momētum, rapellūmque, dein pastæ nondum fermentatæ cū luteis ouorū pistatæ, aut farinæ tenuissimæ supradicta immisce, & in iure carniū coquito, & ægrotæ exhibeto. Assis carnibus vesca-  
tur potiusquàm elixis, quæ infartiā-  
tur rhoe, fructu oxyacanthæ, & aliis  
vim sanguinem arcendi fluentem  
habētibus. Nocent aromata, ma-  
ximè crocus. Si ob vires ficulneas  
vinum potui dare cogaris, esto ni-  
grescens, vtcunque adstringens,  
crassum, aqua cælesti, aut aqua in  
qua ferrum candens extinctum fue-  
rit, aut puteali aqua dilutum. quie-



te fruatur. Somno indulgeat, gaudio non afficiatur nimio. Venerem fugiat. Aer esto temperatus, fructus maturi non adstringentes & calidi nocent. Potus nimius crapulâque obsunt.

## CVRANDI RATIO.

Aegineta  
de mulie  
bri pro-  
fluio.

In defectu verò & interualli spatium, habet enim circuitum nonnunquam, sed ulò vtendum fuerit gestationibus præstatis, diuersique generis deambulationibus, vociferationibus, vñtionibus, cucurbitulis, dropace vnguento, aut leuigationibus, frictionibus, vnguentis depilatoriis quæ psilothra dicuntur, sinegmate, sinapismis, vomitibus cum radiculis prouocatis, curatione recreandis defectibus restituendisque viribus facta, lauacris,



vinique omnifaria educatione & alimento.

In mensium profluuium nimio, neque balneis, neque calefactionibus vtendum. Mensesium fluor ex repletionem, aut ex matricis humorum abundantia factus, non est adstringendus, praesertim si colore tingatur assueto mulier, nisi ipsius vires prosteruantur.

## SANGVINIS MISSIO E VENA.

In rubro fluore primum, si aetas Fuchf. & alia permiserint, ad sanguinis missionem vertimur. Ablationem vero sicut in iis qui sanguinem excreant, partiri oportet, vt paulatim prolixiori tempore auersio fiat. Secunda vero si erit in cubito vena, aperiatur vena axillaris.



Aegineta  
de mulie  
bri profl.

Hydromeli austerum, aut ompha-  
comeli, Propinandum insuper in  
posca balanstium, hypocystidis, siue  
acaciæ cremor, aut lycium, aut sa-  
mius aster, aut omphax aridus, aut  
rheum quod rha quidam nuncupāt,  
aut lentis in Italico vase fictili cre-  
matae cinis, aut sesamum in posca  
maceratum ad mollitiem vsque &  
teneritatem manducandum. Ea  
quoque quæ vrinam cient porrigi-  
to: ē quorū numero habetur aqua,  
in qua elixa sint asarum & apium.  
Ad hæc portulaca etiam mansa, at-  
que succus eiusdem herbæ potus, ad  
hunc modum affectis subuenit. Ba-  
lanstium item rubique cum fructus  
tum flos, & ea quæ inter quercum  
& corticem suum interiacent, pren-



ni membranofum, & id quod sub  
exteriore glandis cortice contine-  
tur. Hippuris potiffimè (quæ conus  
ex cauda equina est) rubeum fluxū  
pota ex aqua aut vino, sistit: aut hy-  
pocystis, fructusque lentisci frictus  
& in vino potus, Samius aster, Len-  
nium sigillum, Coagulum lepori-  
num, aut hædinum, aut agninum,  
aut vitulinum, aut ceruinum, gi-  
garta id est acini, myrta, omphax  
aridus, piceæ cortex, acacia, coral-  
lium, lycium, galla, polyginum,  
symphytum vtrumque, hæmatites,  
calyces glandium, plantago, oxya-  
cantha.

Cornu ceruinum cum acacia &  
tragacanthæ lachryma maceratum  
potui dato his quibus ex locellis hu-  
mor defluit, ieiuno ore ventriculi.

Spica item nardus, lapis gypseus,



cornu ceruinum vstum & rosacea  
 lotum, rosæ rubæ, rhus coriaria,  
 nymphaeæ semen & flos, hæc sunt  
 quorum in pollinem tenuissimum  
 redactorum drachmam ex vino da-  
 bis potui. Præterea hypocysti-  
 dem, succinum, lachrymam arabi-  
 cam, achilleæ succum concretum,  
 glebam armeniacam, flores & se-  
 mina cotoneorum, fidiam, balau-  
 stium, malicorium, vniones, mum-  
 miam, myrtorum fructus, libanum,  
 iunci rotundi odorati florem, cine-  
 rem testarum ouorum<sup>s</sup>, friato potui  
 ex vino dato, friamenti picis naua-  
 lis vncia cum succo plantaginis bi-  
 bitur. Fimi caprilli drachma aqua  
 cælesti macerata cōmodè bibitur.

Stercoris itē asinini pari pondere.  
 Succus porri potus. Ferri & si ste-  
 rilitatem inducat, mensium tamen



fluorem compeffit.

Si albus fit fluor, medicamenta quoque craffos & pituitofos humores extenuãtia, vrinãque ducen-  
tia bibantur, vt aſarum, fœniculum,  
apium. &c. aulus.

## SIMPLICIA EX PLINIO.

Pulegium ex melle & aceto men-  
ſes fiſtit. lib. 20. c. 14. Xenocrates  
tradit rem miram, ſi vera eſt, men-  
ſtrua cõtineri vno die, ſi vnum gra-  
num coriandri biberint fœminæ,  
biduo ſi duo, & totidẽ diebus quot  
grana ſumpſerint. lib. 20. c. 20.

Hippocrates menſtrua fiſti cibo  
bliti putat. lib. 20. c. 22. Violæ al-  
ba & lutea extenuant menſtrua. lib.  
21. c. 19. Nardum gallicum men-  
ſtrua fiſtere. lib. 21. c. 20. Leucanthe-  
mum impositum. lib. 21. c. 22.



Heliochrysi folia trium obolorum  
pondere in vino albo. lib. 21. c. 25.

Centumcapita herba mulierum  
menfibus siue abundant, siue subfi-  
dant. lib. 22. c. 8. Fex aceti. lib. 23. c.  
2. Foliorum olearum succus expri-  
mitur tufis, affuso vino & aqua cœ-  
lesti, siccatusque in pastillos digeri-  
tur. Sistit menses in lana admotus  
vulvæ. lib. 23. c. 3. Palma quæ fert  
myrobalanum in vino austero. lib.

23. c. 5. Balauftium cytini floscu-  
lus. lib. 23. c. 6. Ramenta ligni lotu  
(quam fabam græcam nuncupant)  
decocta in vino. lib. 24. c. 2. Gallæ  
cremata & aceto falso extinctæ, fo-  
tu. lib. 24. c. 4. Ulmi folia, cortex &  
rami illita. lib. 24. c. 8. Spina ara-  
bica. lib. 24. c. 12. Rhannus candi-  
dior in lacte bibitur. lib. 24. c. 14.

Dracunculus si ferro non attin-



gatur. lib. 24. c. 16. Menses nimios  
 sistit achillea imposita & decoctum  
 eius insidentibus. lib. 26. c. 15. I-  
 dex herbæ (quæ & oxymyrina dici-  
 tur) flos. libro. 27. c. 11. Leucogra-  
 phis. libro. 27. c. 11. Medii radix  
 drachmis duabus cum melle eclig-  
 mæ per aliquot dies sup. o. lib. 27.  
 c. 12. Succida lana imposita sub-  
 ditæque. lib. 29. c. 2. Quorum lu-  
 tea cocta, & ex vino pota. lib. 29. c. 3.  
 Ferri rubigo imposita velleribus.  
 lib. 34. c. 15. Misy. lib. 34. c. 12.  
 Sinopis quæ magis cæteris rubet,  
 pota denarii pondere, foeminarum  
 profluvia sistit. lib. 35. c. 7.

POTIONES COMPO-  
 SITAE ET SERAPIA.

Serapiū rosaceum. S. myrthinū.  
 g iii



Serapium mirabile & certum quo frequenter mensium fluorem sistere coegimus. Acci.fimi asinini succū quātum vis, & ex eo arte & igne saccharoque serapium confice, propinabis ipsum myrthino serapio & aquæ plātaginis mistum ad cubile.

Labri veneris succus aut friamētum datur in ouo sorbili.

Si ex erosione, aut vlcere profluāt menses, Sumito lapilli hematitis, achilleæ succi concreti, quem sanguinem draconis vocant, succinni, corallii, balaustiorum, glebæ armeniacæ, terræ lemnia, seminis portulacæ partes æquas, trita omnia serniculo traice, potui dato. ʒ. i. cū succo, aut liquore stillatitio myrtorum aut plantaginis.

Si ex acuitate sanguinis aut aliorum humorum menstrua defluant,



auxiliabuntur, Serapia ex cotoneis  
S. myrthinum. S. rosaceum.

Pastilli ex succino. Pastilli ex o-  
xyacantha. P. ex terra lemnia.

PVRGANTIA PER  
ALVVM.

Fluore albo infestante in prin- Fuchsius.  
cipio quidem resistendum non est, Si ex pi-  
vt aliena è corpore excernatur, ne- tuita.  
que præter rationem erit, si quod  
pituitam purgat medicamentum  
adhibeas. Acci. Polypodii  
querni, anisi, fœniculi, epithymi.  
an. ʒ. ʒ. ʒ. coquantur, in decocto ma-  
cera horis decem corticis myroba-  
lanorum, deinde cepulorum tritæ.  
ʒ. i. colo traïce & adde pulueris di-  
aturpeti. ʒ. i. potui dato à cubili ie-  
iunæ.

Eclegma aut rotula

g iiii



diacartami eadem efficit.

Si ex bile flaua, Eclegma ex succo rosarum, Medulla cassiæ fistularis, Rhabarbarum, Myrobalani lutei accommodantur.

## GLOBULI VORANDI

καταποτία.

Globuli ex bdellio maiores & minores ex monumentis Mesuæ Arabis, cuius portio esto. ʒ. ʒ. aut sesquidrachmæ.

Fuchf.

Accipe, Terræ lemnix, glebæ armenix, thuris, mastiches, gallarum. an. ʒ. ʒ. succi achilleæ concreti, hæmatitis. an. ʒ. ʒ. cornu cerui vsti ʒ. ʒ. hypocystidis, acaciæ, corallii rubei. an. ʒ. ʒ. balaustum, rosarum



rubrarū. an. 3. 2. succini. 3. 1. cum se-  
rapio myrthino formētur catapotia,  
de quibus. 3. 1. aut. 3. 1. f. propinabi-  
mus.

Mummia, thuris, mastiches, cor-  
nu ceruini vsti & loti, an. 3. 1. coa-  
guli leporini, aut hoedini. 3. 2. exci-  
pantur in globulos succo polygo-  
ni, quorum portio esto. 3. 1. Voren-  
tur a cubili & ad cubile, prædictis  
potes addere nonnihil caphuræ.

## CONSTRICIONES.

Primum igitur atque præcipuum Aegineta  
est, vt membra ab alis & pube con-  
stringantur, & extrema.

CVCVRBITVLAE



Aegineta

5 Aph. 50

Cucurbitulae inanes spatiosae  
plærūque sub mammis adglutina-  
tae, tantum ut desideres in contra-  
ria reuellunt.

Mulieri si velis menstrua cohi-  
bere, cucurbitulam quā maximā  
ad mammas appone.

Gal. in commentario inquit  
melius non ad ipsas mammas, sed  
sub ipsis partibus inferioribus firma-  
re cucurbitulam, ubi maximae sunt  
hae, quae ad ipsas venae de subter ve-  
niunt.

## ENCATHISMATA,

SIVE INSESSVS.

Aegineta

Eucathisma insuper illud his qui  
sanguinis mensium eruptiones pa-  
tiuntur apprimē conducit.

Oxyſchæni quod est acuti ro-



tundi iunci odorati, capitis myrti,  
foliorum rhanni, rosarum, virgul-  
torum rubi tantundem coquens in  
aqua, qua insidentibus muliebria  
loca foeminis vtiliter fouentur.

Aliud. Sumantur corticis mali  
punici dulcis, radices myrti, corti-  
cis cupressi, singulorum medinni  
tres, gallæ, medinnus vnus, aquæ  
quantum satis est.

Hippuris, lentisci, foliorum mo-  
ri, foliorum pirorum, prunellorum,  
sorbarum, mespilorum, symphyti,  
corticum internorum quercus, ro-  
sarum, labri veneris. an. m. 2. fidiæ,  
bistortæ, gallarum, fructuum myr-  
ti. an. lib. 1. rad. vlmi, radicum fili-  
cis, mespilorum, & sorbarum, cali-  
cis glandium. an. lib. 2. ex his om-  
nibus cōfractis & decoctis in aqua  
cælesti in cisterna capta, seu in a-



qua in officina fabri ferrarii hausta,  
quantum sit satis, fiat infessus, in  
quo infideat mulier mane ieiuna &  
ferò, saltem horam vnam.

## SUFFITVS.

Si infessibus suffitus præferat, per  
infundibulum fumum recipiat in  
locellos, pannis tecta, sedens in se-  
de perforata.

Acci. colophonix. ʒ. f. spodii, gle-  
bæ armeniæ, papaueris nigri, hios-  
cyami. an. ʒ. 2. parum trita in car-  
bones ardentes iniiciantur.

Eadem facito ex blattâ bizâtina,  
& ex symphito, fiant etiam suffitus  
ex coriis, quæ e domo eiiciunt sar-  
tores calceorum coriariorum, & ex



gallis & ex viuaceis, dein præbe ex  
ecligmatis nonnihil.

Si ex pituita mensium fluxus,  
Fiat suffitus ex ladano, mastiche,  
galla, menta sicca, galbulis cypres-  
si, sampsucho. &c.

## ECLEGMATA ET

PLACENTAE ROTV-

LAEQVE.

Conseruæ rosarum antiquæ. ʒ. i. Ex Ara-  
diacitonit. siue speciebus saccharo bibus.  
conditi. ʒ. 4. vel diacodiòn concina  
ti per quadras tantundem, corallii  
rub. tenuissimè triti. ʒ. 4. margarita-  
rum, spodii, lap. hæmatitis, mum-  
miæ. an. ʒ. ʒ. condiantur omnia si-



mul saccharo sufficienti & serapio  
ex malis cotoneis, quibus poteris  
addere momentum ex bracteis au-  
ri, confice eclegma, detur ex eo  
manè & vespere pro qualibet por-  
tione, quod castaneæ crassitudinē  
æquet, per duas horas ante cibi sum-  
ptionem, superbibátque vini meri  
cyathum. Vel,

Sumantur radices vtriusque sym-  
phyti, coquantur, & pistello tendan-  
tur, cribroque traiciantur. Eadem  
facito ex plantaginis radice. Ex  
traiectis radicibus sūme. ʒ. ʒ. rad.  
plantag. ʒ. ʒ. f. sacchari libr. ʒ. sol-  
uatur saccharum aqua cælesti ex  
cisterna, aut liquore stillatitio plan-  
taginis, in ea fricato hæmatitem  
quousque rubescat, subinde lento  
igne sensim coquantur, addendo  
radices, concoctione probè facta



decocto perfrigerato immisce friamentorum succi achilleæ concreti, acaciæ, rhois obsoniorum, terræ lemnæ, succini, cornu ceruini vsti & loti, an. 3. 1. margaritarum. 3. 4. corallii rub. 3. 1. f. spodii, lap. hæmatitis, seminis apii. an. 3. 2. concinna eclegma solidum sectum in rotulas aut in quadras, vel si maioris eclegma confice non solidum, ex quo mane à cubili dato. 3. f. deinde bibat vini meri cyathum.

Hæc quidem exhibenda censeo mulieribus, quæ sumere ea renuunt quæ palato grata non sunt.

Si ex pituita, Exhibeto the-riacam magnam, Dialibani.

Vel dato cochlear eclegmatis frequentis si prostratæ sint vires.

Acci. Conseruæ rosarum antiquæ. 3. 1. dialibani. 3. 1. corallii



rub.3.1. margaritarum.3. f. cymini  
 & inter diu aceto macerati.3. 1. f.  
 mentæ sicca.3. 4. libani. 3.2. spi-  
 cæ indicæ.3.1. fiat mistura deaura-  
 ta, detur crassitudo castaneæ à cu-  
 bili.

## EPITHEMATA ET CATAPLAS- MATA.

Foris autem egregiè subue-  
 niunt epithemata, quæ adstrin-  
 gendi & stipticandi naturam ha-  
 bent, & ex dactylis palmæ coto-  
 neisque cataplasmata, quæ ma-  
 licoria continent, aut priuobalanii,  
 aut rubi virgulta, aut folia lentisci,  
 balaustium, acacia, hypocystis, gal-  
 læ parum, alumen. Sed omnium ma-



xime illud, taurinum glutinum, quā  
taurocollā dicunt tantisper dum e-  
liquefcat, & dissoluatur, postea mace-  
ratur, deinde in linteolum pannū-  
ve alium robustum emplastri mo-  
re impingitur, & illinitur lumbis  
affectæ. Vel,

Acc. Succi simphiti, succorum  
plātaginis, pentaphylli, quinquener-  
uiæ. an. aceti parum, pannos duos in  
talibus succis vnā mistis immerge,  
quorum alter ab umbilico ad pu-  
bem alter ossi sacro imponatur.

Frusta linteoli aceto electo dilue,  
& vtriquæ mammæ admoue, subin-  
de pubi & ossi sacro aliquod vnguē-  
torum impone.

h



## VNGVENTA.

Acc. Olei myrthini. ʒ. 4. olei mastichini, succi plantaginis. an. ʒ. 2. mastiches friatæ. ʒ. 2. rhus coriariæ, hypocystidis, myrti fructus, terræ lemnia, glebæ armeniacæ. an. ʒ. 2. ʒ. ʒ. spodii, rosarum, an. ʒ. 1. hordei vsti. ʒ. ʒ. ceræ quātum sit satis pro cōcinnādo vnguento, quo inungatur etrum & os sacrum.

Vnguentum comitissæ accommodatissimum est quod etiam inceptum abortum inhibet, & colore viribus destitutos renes refrigerat robur addendo,

## EMPLASTRA.

Efficaciter quoque ac strennuē admodum ad hoc faciunt emplastra Aegineta etiam quæ glutinandi vim retinēt, verbi causa, composito Icesii, Icesii



fios appellata, emplastrum atheniense, Meelinum indicū, atque id genus cætera. Vel,

Accipe Acaciæ, hypocystid. fidia, terræ lemnia pastillorum ex succino, colophonix. ā. ʒ. f. leuigato omnia & liquore stillatitio plāraginis excipito in emplastrum, quod bipartitum pubi & ossi sacro imponatur.

Vel, Mastiches, libani, mummiæ, succi achilleæ concreti. an. ʒ. i. friato, dein oui albugine mētæ que succo & artemisiæ excipito & emplastri modo vtrunque admoueto.

Vel, Acc. Herba pulicaris feminis vsti, aluminis, arrillorum immaturorum, glebæ armeniacæ, succi concreti achilleæ, radicis symphyti, fidia, balaustiorum partes æquales terito, cribróque secernito, & in emplastrum oui albore excipito, dein



ossi sacro pubique imposito.

Anus nostrates fuliginem aut calcem friatam sumūt, & oleo myr-  
tino ouique albore excipiunt in  
emplastrum pauco aceto addito, &  
prædictis duobus imponūt locis, sic  
que menses supprimūt, foetūque  
ne ab orsu pereat seruant.

## PESSI.

Aegineta

Pessi quoque vtiliter, vel plura  
alioqui vellera locis ipsis apponan-  
tur ex vino & oleo, siue rosaceo, si-  
ue melino, siue myrthino leuigata,  
Pessuli præterea (sic enim  $\pi\rho\acute{o}\delta\epsilon\tau\alpha$   
interpretor) qui naturalibus foemi-  
narum admouentur, muliebrium  
sanguinis eruptiones compescunt,  
ex hypocystidis succo concinnati,  
aut acacia cum manna aceto eliqua



ta. Post hæc opis plurimum, & admiratione dignum confert auxiliū in eiusmodi profusione, spongia vino aut liquida pice irrigata & apposita, vel deusti ipsius cinis cum aceto, poscave applicatus, pari etiam modo corticis suberis (qui græcè *φελμος* appellatur) Italico vase testaceo cōbusti cinis. Ad sanguinis porrò eruptiones pessis vtitor, gallæ interaneum tritum, & thus irrigatum aqua apponito, aut cytinis, aut dulcia mala punicica confimiliter applicato, aut seminalem leuigatam. Cæterum compositionem ad eandem rem peridoneam ita contexere conuenit. Acc. aluminis fissilis, medullæ gallarum, succi acaciæ, mānæ, singulorū. 3. 4. ouorū assatorū putamina quatuor arida friātur, atque eliquescant in cremore plan-

h iii



taginis, atque tum misceantur. Quum autem vsus atquæ res ipsa monet & exigat, pesslo laneo excipiantur, & intingatur etiam in rosaceû, atque admoveantur.

Fuchf.

Acc. thuris, balaustiorum, gallarum. an. 3. 1. gummi arab. acaciæ, succini, cornu ceruini vsti. an. 3. 2. glebæ armeniæ. 3. 2. singula redigantur in pollinem tenuissimum, & lana rosaceo intincta excepta, in mulieris pudendum immittantur.

Acc. triphera, micletæ, athanasia. an. 3. 1. hypocystidis, acaciæ, glebæ armeniæ, succi achilleæ concreti, radicum symphyti maioris, plantaginis, gallarû, sidiæ. an. 3. 1. trita omnia in pessulos digerantur ex coto & immittantur succo adstringentium excepta. Vel,

Colophonîæ, caphuræ, scorîæ ferri



præparatæ, hoc est in pollinē tenuis-  
simum redactæ, & in aceto & rosa-  
cea inter diu maceratæ, & coctæ  
vsque ad aceti & aquæ absumptio-  
nem. an. quantum vis, succo solani  
excipe, & in pessulos digere.

Vel, Cornu ceruini vsti, acaciæ,  
hypocystidis, glebæ armeniacæ, mū-  
miæ, mastiches, gipsi, partes æquas  
excipe sæuo caprillo & concinna  
pessulos. Ex pharmacis item  
quibus emplastra concinnata sunt  
potes pessulos condere.

Ex magnæ ranæ cinere pessulos  
facias exceptos aceto, aut fimi asi-  
nini succo.

## METRANCHYTA.

Iam verò & per metranchyton Aegineta  
instrumentum ad eam rem factum,

h iii



locellis succum plantaginis, aut ferreos, aut feminalis, aut strychni, aut perdicii, aut psyllii, aut hypocystidis, aut acaciæ infūdito, atque hæc eadē per lanā, aut digitū, aut malā organum, calamūmve in longitudinem formatum, vsque ad os vteri indantur, inseranturque. Et Andromis denique pastillus cum metranchyto infusus cum prædictorum succorū aliquo, aut vino adstringente, efficax & presentaneū est remedium.

## PORTANDA.

Aegra portet assidue iaspidem, Corneliūm lapilū, sapphyrum, pilos dextræ auris asini, magnæ ranæ cinerem lineo panno inuolutū, Hircinē friatā in dextra manu.



## HYSTERICA.

Suffocatio, ὕσξις πνίξις spirationis ob vterum ablatio, Strāgulatio vteri, Suffocatio matricis.

Strāgulatus vteri, in superiorem Aegineta partem ascensus vuluæ est, in societate afflictionis principes corporis partes ducētis, veluti carotidas, cor, panniculos cerebri, quos græci *μῆλον ὕκας* dicunt.

## CAUSAE.

Conuenit inter omnes medicos Gal. lib. hunc affectum magna ex parte vi- 6. de lo-  
duis euenire, idque maximè, si an- cis. aff.  
tea probe purgarentur, ac parerent,  
atque virorum concubitu gauderēt.  
Quibus rebus omnibus priuata,  
quid probabilius excogitari quis



posset, quàm quod ob retenta menstrua, vel semen cohibitum, huiusmodi mulieres vteri dispositionibus crucientur: siue eas apnæas ( id est non spirationes ) siue suffocationes quis vocauerit, siue etiam fortuna contractiones sint membris. Idque fortasse magis à semine contingere potest ut pote magnâ vim obtinente: ut est enim mulieribus humidius, ita etiam frigidius, proinde ipsum excerni oportet, præsertim si naturaliter multo semine exuberat mulier. Id verò viris quoque euenire solet, quippè nō parua est horum differentia. Igitur vteri peruersiones eo quem diximus modo, ad suppressa sequuntur mēstrua, eas tamen ob hoc, accidentium quæ in animalis corpore apparent causas esse nequaquam putandum est: quippe quæ



Communem habent causam, plenitudinem à suppressa menstruorum purgatione euenientem. Quæ verò citra peruerfionem, aut menstruorum retentionem viduas molestant noxæ, hæ retentum semen euenire putantur.

Retenta menstua & semen co- Actius.  
hibitum statuosam quandam refrigerationem in vtero excitant, quæ subinde cordi & cerebro communicantur, contingit etiam refrigerato vtero, quo tēpore menstruæ purgationes effluunt, vel ob difficilem quēpiam abortum, vel vbi quis sanguinis eruptionem ab vtero repente sistere properauerit.

### NOTAE.



Lib. 6. de  
loc. aff.

Ego verò (inquit Galenus) multas vidi mulieres hystericas, alias quidem sine sensu immobiles iacere cum obscuro paruoque pulsu, adeo ut in quibusdam ne percipi quidem pulsus posset: alias sentientes quidem, & moueri potentes, absque integra ratione, sed tamen animi defectione, & difficili spiratione laborantes: alias etiam crura & brachia contrahentes. Ex quibus coniecturam feci multas esse vteri affectuum differentias, vel pro causæ efficientis magnitudine, vel pro specierum quarundam varietate inter se differentes.

Gal. de  
loc. aff.

Quòd autem hos affectus excitandos retentum semen maiorem, mēstruum verò minorem vim obtineat, facile intelligitur ab his mulieribus, quibus quum non sint vi-



duæ purgationes supprimuntur: quâ-  
uis enim pluribus infestentur acci-  
dentibus, spiratione tamen non pri-  
uantur, neque animi defectione, ne-  
que aliis quoque accidētibus labo-  
rare videntur. Præterea ex eo quod  
sunt viduæ quædam, quæ licet æquæ  
ut antea aut paulominus purgan-  
tur, nihilominus similibus corripitū-  
tur accidentibus. Quippe medicæ  
quæ eas exquisitè tetigerunt, faten-  
tur circa vterum notas quasdam ap-  
parere. Nam ceruix eius inclinata  
videtur, interdum quidem veluti  
fursum retractus sit totus vterus, in-  
terdum verò veluti ad latus traha-  
tur, non veluti animal errabundū,  
aliàs ad alium locum discurret in  
mulieribus vterus, sed ab extensio-  
ne retrahitur



Aegineta      Accidit autē languentibus immi-  
 nēte quidem iam paroxysmo tardi-  
 tas mentis, segnities, infirmitas cru-  
 rum, pallor vultus, species luminum  
 percraffa, in stante verò iā strangu-  
 latione in somnum delatio quam  
 κατὰφωραν vocant, dementia, ca-  
 talepsis sensuum sedis cum mutita-  
 te, crurum contractio, deinde inci-  
 piunt rubefieri genæ, & vultus vni-  
 uersus plenus fit. Relaxationis verò  
 tempore promanat quædam è mu-  
 liebribus locellis humiditas ad ta-  
 ctum, & borborygmus, hoc est ven-  
 tris strepitus, & progreditur aliquod  
 intestinum, & ipsa quoque vulua  
 paululum flaccescit, & languescit,  
 tum denique ad se redeunt, sensū-  
 que recipiunt. Mouetur porrò  
 morbus ille quodam circuitu, quem  
 admodum & morbus comitalis,



fracta scilicet vulua, vel seminaria,  
vel alia quapiam materia, aut mate-  
ria in eadam marcida & putrefacta.

Arteriæ motu aspirationeque  
priuata mulier manum vtero admo-  
uet, vt vaporum ascensum inhibeat,  
curua manet, astantium voces au-  
dit, quamquam respondere non pos-  
sit, colore, sensu, motuque orba mor-  
tem gelidam præfert. Comitiali cor-  
repta spumans os habet, contra vte-  
ri strâgulatu affecta: nō priuatur ta-  
mē omni aspiratione vt in attonito.  
Præter dicta præfocationem vteri  
præcedunt cordis tremor, capitis do-  
lor, seipsam alloquitur mulier, ali-  
quando sitit, vultus, oculi & labra  
quandoque rubore suffunduntur, o-  
culis conuiet, nec ipsos aperire po-  
test, præsentit item aliquid ascen-  
dere à pube per aluum & vmbilicū



vsque ad os ventriculi & stomachum, deinde dentibus stridet, strin-  
git maxillas, quandoque manus, bra-  
chia & tibias mouet, animam de-  
mum egisse putares. Si ex femine  
corrupto scitur, quoniam à longo  
tempore non fuit, quamuis pas-  
sim icta fuerit cupidinis sagittis,  
aut virgo est ferre iugum apta, vel  
mulier in delitiis otiosæque viuens,  
quæ cereri temulentoque deo indul-  
get, sobriis nymphis reiectis, atque  
sibi deest in quod eiiciat tenera bra-  
chia collum. Huic obnoxia mor-  
bo, eorum quæ in morbi tempore  
audiuit, memor est, contra in comi-  
tiali.

## PRÆSAGIA.



Plures quidem relatæ & pristinæ salubritati restitutæ sunt, nonnullæ verò in ipso paroxysmo vitæ in mortem subito commutarunt: pulsibus quidem crebrescētibus ac densatis, inordinatimque diffusis, deinde & asphixia (id est nulla venarum pulsatione) sequuta, exiguo verò humore superficiem irrorante, respicationem autem primum quidem ad nichilū redigente & obscurante, postea verò omnino amputante. Cæterum hic languor hyeme atque autunno ingruit inuenibus procliuis ad libidinem, sterilibus, & potissimè si propter medicationem infocundæ fuerint, & aliis refrigeratis.

Igitur prima species (hoc est in qua immobiles sine sensu iacent, cum obscuro paruoque pulsu) cuius

Aegineta

Gal. lib.  
6. de loc.  
aff. c. 5.



Heraclides Ponticus in suo com-  
 mentario mentionem fecit, multam  
 exhibet de ortu suo ambiguitatem.  
 Ait enim sub hac specie, neque pul-  
 sum, neque spirationem mulieris de-  
 prehendi posse: atque ob id dūtaxat  
 non videri mortuam, quòd exigu-  
 um in mediis corporis partibus ca-  
 lorem haberet: ac astantes quoque  
 medicos quæsiuisse ait, an nondum  
 sit mortua. Rursus nonnulli Hera-  
 clide posteriores credentes seruari  
 aliquid spirationis, quamuis ipsa nō  
 appareat, carptæ lanæ flocculos co-  
 ram naribus suspendi iubent, vt ex-  
 actè deprehendatur, num spiritus a-  
 liquis inter spirandum tum intro,  
 tum foras rursus deferatur. Sunt  
 qui poculum aquæ plenum, ori ven-  
 triculi imponere præcipiunt quip-  
 pe immotum omnino seruari humo



rem aiunt, si tota perierit spiratio. Itaque si omnes ita affectæ mulieres interiissent, simplex esset quæstio, quum uerò nonnullæ seruatæ videantur, geminam oriri quæstionem necesse est, inuestigantibus nobis, tum dispositionem ob quam spirationis munus deperditur, tum vel magis, quomodo viuere possint, quæ nihil omnino spirant. Quippe in cōfesso est, & spirationem à vita, & vitam à spiratione separari non posse, adeo ut uiuentē non spirare, & spirantem non viuere sit impossibile. Atque hæc quæstio, quanquam superiore difficilior videtur, non est tamen perinde difficilis: quippe facile sustinebitur, si latebris inclusa animalia consideres, nulla apparēte in ipsis spirationis nota. Hoc enim cognito, perspectisque animalibus



ut pote frigidis, atque eo demonstrato, quod maximus respirationis usus est, ut intimus calor, & refrigeratione & ventilatione seruetur: haud ita difficile fuerit perpendere exiguum illum calorem in ipsis derelictum, arteriarum cordisque officio conseruari, quæ actio à quibusdam medicis transpiratio, veluti ea quæ à thoracis pulmonisque officio prodit, respiratio vocatur. Itaque pereunte ob vteri affectum spiratione, quoniam vniuersum corpus refrigeratur, id enim manifestè videtur, fieri potest, ut nulla prodeat ab ore spiratio, quamuis ea quæ in arteriis sit, nequaquam intercipiatur. Verùm potest adeò esse exigua, ut sensum omnino effugiat.

Si ex semine corrupto fiat, & spuma ex ore destuat, imminet exi-



cium, demum vteri strangulatus  
qualis qualis fit, exitio est, nisi auxi-  
lium præbeatur. Quæ locellorum  
præfocatione corripuntur si futue-  
rint, facile vtero gerentes efficiun-  
tur.

## VICTVS.

Cibo interea & potu paucis ad- Fuchf.  
modum contenta sit mulier, tota-  
que victus ratio exsiccatoria fit, &  
hæc ad accessiones proficiunt. Si ma-  
lum diuturnum fuerit, non parum  
etiam recta victus ratio opitulabi-  
tur: nempe deambulationes matu-  
tinæ, gestationesque vel in curru,  
vel naui, vel iumento. A gestationis  
motu vociferatio & lectio clara,  
modulata, concinna utilis est. Vn-  
ctio præterea, frictio & exercitatio



ex congruis interuallis repetita, eisdem conueniet, balneū aquæ dulcis rariùs, & non nisi sordium abstergendarum gratia adhibendum, Balneis verò naturalibus vti optimum est.

**Aegineta** Inclamet autem quispiam illis altiore horrendaque vociferatione, atque appellet & accerset: Si virgo sit nubat, & futuat.

Vinum nequaquam potui dato, quoniam aqua ipsis est accommodatior, nec carnes concoctu edat difficiles, neque his vescatur quæ semen augent genitale.

## CVRANDI

ratio.

**Avic. sen**  
21.3.

Vtendum censeo clystere, sanguinis missione, constrictione ex-



tremorum membrorum, frictione,  
odoramentis aluum cientibus, cu-  
curbitulis, glādibus, cataplasmatibus,  
sternutamentis, vomitionibus, po-  
tionibus, infestibus, pessis, dropacif-  
mis, rubrificationibus, acopis, exer-  
citationibus, vociferatione, & la-  
uacris.

**CLYSTER ET GLAN-**  
des, Suppositoria  
vocant.

Accessione protracta, & ea quæ Aeginet,  
peditus agunt sunt utilia, cuiusmo-  
di sunt sacculi dactilio, id est sedi  
appositi: exempli gratia, cuminum  
nitrum cum melle, & stercus cum  
latione prolicere ac subducere, ne  
torqueant in accumulatione sua.

i iiii



DE MORB. MUL.  
VENAE SECTIO.

**Aegineta** Cæterum ad vniuersi corporis in-  
staurationē à detractiōe sanguinis  
auspicandum, præcipuè si menstruæ  
purgationes detineantur.

Imprimis secanda est vena axil-  
laris, subinde saphena, modò visci-  
di humores hunc morbum non ex-  
citarint. Si ex semine corrupto, ca-  
ue ne venam tangas.

POTVS.

**Aegineta** E castorio potione vtamur, quan-  
doque quidem cum decoctione ar-  
temisiæ, interdum verò cum aqua  
mulsa. In quibusdam enim expedit  
illud, atque vnicum ad exactam &  
numeris omnibus absolutam cura-  
tionem satis est. Bibat decoctum



aut ius calamenti, aut mentastri, vel  
rutæ, aut viticis. Dandum est casto-  
rii. 3. 1. singulis diebus vt dictum est,  
vel cum vino tenui.

## HVMORES NOXIOS.

subducentia.

Post septimum autem diem pur- Aegineta  
gandum, quæ è colocynthide con-  
texta sit hiera Post sanguinis mis-  
sionem ad expurgationem cum hic  
ra proficiscere, deinde ex aloii con-  
fectam picram porrigito. 3. 1. cum a-  
quæ mulsæ cyathis sex.

Catapotia ex Agarico voranda  
sunt.

## ECLEGMATA, PVL-

ueres & confectiones

aliæ.



Diamarthæ, dicymini, diatri-  
um pepereon potui dentur cum ra-  
dicum aperientium decocto vel sac-  
charo, excepta digerantur in rotulas  
aut quadras, vel eclegmata confice.

## CONSTRICIONES frictionesque.

Quocirca in paroxysmis extre-  
mas corporis partes vincere oportet, & tota crura fricare, atque vni-  
uersum etiam corpus, perinde atque  
eos qui animo defecerunt, reducere  
& refociliare.

Alta voce vocetur, pedes manús-  
que dolorosæ fricentur, tibiæ &  
genu cum funiculis, & aliquando  
coxæ super genu strictissime vinci-  
antur. Cum aceto item & sale extre-  
ma asperè fricentur,



## ODORANDA.

Graue olentia odoramenta ol- Aegineta  
factanda naribus admouere: verbi  
causa, elychnium extinctum, casto-  
rium, picem liquidam, cedriam, vel-  
lera & lintea combusta: quidam ve-  
rò amida quoque abhibuerunt è lo-  
tio veteri, siue oletulo.

Accipe castorii, galbani in aceto so-  
lutorum. an. ʒ. ʒ. sulphuris. ʒ. i. misce,  
& naribus fumum recipiat mulier.

Par suffitus fiat ex asa, foetida,  
sagapeno, ammoniaco, Animalium  
plumæ in carbones iniice, ad suffi-  
tum pertinent, præsertim perdicis,  
capillorum hominis, canis & hirci  
cappillorum, corium quod libet,  
ungulæ brutorum, & quodcunque  
cornu.



DE MORB. MUL.  
SUFFITVS, LINI-  
menta, & per metran-  
chytum iniectiones.

**Aegineta** Atqui in vterum odoratissimā  
fragrantissimāque vnguenta infusa,  
de trahere vuluā naturæ aptitudine  
possunt: veluti amaracinum, mala-  
bathrinum, spicaceum, irinum. Hæc  
etiam obstetrix digitis capiens vs-  
que ad os vteri immittat, leniter ac  
multum defricans, vt eo irritamen-  
to crassus humor excernatur.

Aegra pannis tecta, cauendo ne  
fumus nares ipsius attingat, odora-  
tissimis suffiatur: verbi gratia, lada-  
no, alypta moschata, gallia moscha-  
ta, cinnamomo, caryophyllis, xilo-  
aloe, calamo odorato, casia, lauen-



dula, libano.

Vel,

Acc. moschi. ʒ. ʒ. galliæ moschatae.  
3. ʒ. olei lilini 3. 2. misce in mortario,  
hoc linimento vngat manus obste-  
trix, & leniter os vteri fricet & ip-  
sius interanea, tunc enim corruptus  
exhibet humor, & prospera fruetur  
valetudine mulier.

Vel, . Acc. Pastillorum galliæ &  
alipæ moschatae. an. 3. ʒ. styracis. 3. 3. Fuchsius  
caryophyll. maceris. an. 3. ʒ. agallochi,  
ʒ. 2. cinnamomi, foliorum lauri. an.  
3. 2. ladani. 3. 2. f. redactis singulis in  
pollinem tenuissimum cum stacte,  
styracem liquidam appellant, fiant  
Trochisci, iniiciendi in carbones  
pro suffite recipiendo per infudibu-  
lum.



DE MORB. MVL.  
RUBIFICATIONES  
& cataplasmata.

Sinapi pedibus cataplasmatibus in-  
Aegineta star imponatur.

Nec inutiliter sinapismi & dro-  
pacismi ex euphorbio, pyrrethro, pi-  
pere & sinapi confecti applicatur.

STERNVTATIO.

Aegineta Porro quæ sternutationem pro-  
liciunt, adhibenda sunt è castorio  
videlicet & struthio (condisi barba-  
ri vocant) lanariave, & pipere tem-  
rata.

VOMITIO.



Mali verò elapso acumine atque  
insultu, ad vomendum cogito: om-  
nes enim vomitus leuat, sed eas pre-  
sertim quæ à cibo infestantur.

Acgineta

## ENCATISMA

Neque inutile erit, si infessio-  
nes ex decocto baccarum lauri fo-  
liorūque, pulegii, calaminthæ,  
artemisiæ, marrubii, sabine, althææ,  
chamæmeli, serpilli, iridis, aristolo-  
chiæ, & fœnigreci parentur.

Fuchs.

## ASPERGINES.

Infessionum tempore cerebri cu-  
ram non omittemus, sed rosaceo &  
aceto caput irrigabimus.



**Aegineta** Post septimum diem infestationibus & pessis molientibus ex adipe anserino, styrace, mastiche, ammoniaco & similibus confectis uti licebit. Vterusque etiam iis, quæ calefaciendi statumque educendi vim obtinent, suffiendus.

Menses suppressi si uteri præfoculationem genuerint, curato ut menses cire possis.

## PROCIDENTIA

uteri.

**Fuchsius.** Procidere uterum dicimus, quando ita euertitur, ut exterius emineat: neque enim uterus, ut imperiti suspicatur,



à suis solutis propaginibus totus decumbit, nam si ita procideret, restaurari minimè posset. Quòd si progressu temporis id quòd procidit putrefiat, auferendum est ipsum citra omnem futuri periculi suspicionem: totam etenim vuluam ablutam fuisse memorant putrefactā, & superstitem mansisse mulierem.

Aegineta

Si igitur prolapsa pars diuturnitate temporis propter incuriam putruerit, ob assiduamque vrinae irrigationem & sordem inhaerentem exulcerata fuerit, amputandum aut vrendum quod inutile fuerit, nullius metu periculi erit.

## CAVSAE.

Procidit fanè fœminis vulua rarius, sed plures ob causas, aut enim ex alto delabetur, & in coxendices

Aegineta



quasi radices agit, ruptis membranis quæ intestinum continent, aut vterum vicinis partibus connectunt, aut propter secundæ muliebres locellos ambientis sibi quæ adnatæ extractionem, quemadmodum in difficili partu contingit, aut ob inertem & imperitam fœtus extractionem, aut propter sterilitatem, aut propter plagam vel ictum, aut immensi ponderis elevationem, aut ob animales affectiones, puta amissionem liberorum, tristem scyralem aduersamque aliquod nuncium, aut hostium insultum, aut ob navigationem periculosa, aut aliquam id genus aliam causam, omni eo quod concretum est soluto, collapsa vulua, aut propter paralyfim, & imbecilitatem partium, quemadmodum in senescentibus, & deficientibus



tibus frequenter accidit. Procidit  
sæpe ob humoris plurimi ac tenacis  
defluxum, partiūque frequentiam  
laxatis ac solutis appendicibus, pro-  
cidit autem secundum os eius ma-  
ximè. Nonnulli verò vniuersum  
vterum procidere affirmāt, quod sa-  
nè ineptum est, ne dicam absurdū.  
Quo enim pacto reducta in suā se-  
dem collocaretur.

Fit etiam ob cursum velocem, aut  
ob infessionem rei frigida, aut ob  
diurnam moram in aqua frigida,  
aut ob gelida potum, vel ob tussim  
vehementem, vel propter sternuta-  
tionem, aut vociferationem, demū  
ob mensium suppressionem, nonnū-  
quam etiam ob tenesmum.

## NOTAE.

Signa satis manifesta sunt, & cau-  
sarum diuersitas facile de ægrotan-

lz ii



tis aut affidentium sermonibus cognoscetur.

Arab.

Notæ internæ sunt, si sine locellorum strangulatu vterus ascendere existimetur, comite dolore ab umbilico ad os usque ventriculi, tactuque rotundum quicquam deprehenditur, putat interdum ægra se manu prehensam, ferèque tunc suffocata iacet, non sine gemitu. Adsunt vertigo, capitisque dolor, nausea, ructus, præsertim si flatus huius morbi sit parens.

Vbi vterus procidit, grauedo tumorque percipitur, quòd si vir hæc futuendi gratia aggrediatur, genitali semini ad locellos interiores nullum patebit iter, & hæc accidunt si ad superna repat vterus: sin autem vterus ad ima descendat, dolent renes & pecten. In pectine rotundum



quid, tumens, grauēque tactu perci-  
pitur. Intestinum nempe rectum sæ-  
piissime vesicæque ita comprimun-  
tur, vt neque lotium, neque oletu-  
lum quoquomodo exire possit.

Quòd si lotium emiserint, albescēs  
& densū erit, in cuius sedimēto hy-  
postasis residebit liuens aut nigri-  
cans, arteriæ item motus erit mollis  
paruūque & inequalis.

Si ob neruorum, tendonum, aut li-  
gaminum resolutionem is morbus  
euenerit, vel ob putrefactionem,  
procidet vterus insensibiliter indo-  
lorosēque vt plurimum, putris hu-  
mor vbertim ex locellis defluet.

Sciscitari denique oportet, an  
mulier pituitosa desidiosaque diu-  
tius steterit, & si recentibus fructi-  
bus, aut piscibus assiduē vescatur, Anic. 21.  
sique inter futuendum locelli humi <sup>tertiū</sup>

lz iii



ditate scaturiant.

Accidentia porrò procidentis  
uteri sunt, authore Auicenna, pe-  
ctinis & ossis sacri vertebrarumque  
dolor validus, quandoque febris a-  
dest, supprimuntur & vrina & ole-  
tulum. Adsunt item conuulsio, tre-  
mor, timorque insolitus. Si nihil  
rotundi in pectine percipiatur, his  
quæ uteri procidentia laborant, to-  
tum uterum procidisse signat.

#### PRAEDICTIONES.

In principio facile repositioni  
paret, & rectè locatus perseuerat,  
præsertim si ætas non impedierit.  
Nam in prouectioribus uterus qui-  
dem reponitur, sed rursus qualibet  
leui causa relabitur. Si sursum ele-  
uetur, aut ad latera tendat uterus,  
facile curatur: Si extra os vuluæ exi-  
erit, vix curabitur. Si à longo tem-



pore prociderit vterus, nūquam releuabitur. Si ex corruptis succis aut putrefactis ipsam connectentibus procidat vterus, curæ nulla danda est opera.

## VICTVS.

Toto curationis tempore mulier Fuch. motum, & ea quæ sternutamēta excitant, euitet: vt autem naribus odoratissima sunt adhibenda, sic vterus ab infernis foetidis rebus susciendus est.

Vrina & stercoribus vacuatis ægram supinam figurare oportet, vt coxas habeat subliniores, poplites flexos, cruribus inuicem dilatatis ac diuaricatis, tūcque foueatur locus fomētis aptus. Extrinsecus autem pubem sponsia in posca expressa operiemus. Mulier iacebit extēsis adaptatūque inuicē cruribus, vt

lz iiii



alterum alteri incumbat: tutius tamen erit pedes simul vinciri, fasciā vsque ad genua deducendo, deinde cucurbitæ infingendæ sunt. &c.

## CLYSTERES.

**Aegineta** Oportet itaque in huiusmodi curatione stercus ante omnia clysteræ euacuantes, & lotium excernentes, quo vndique ab omni anxietate libera sit vulua, laborantem supino corpore componere, in altum protendentes coxendices & deustos poplites, cum diuaricatis cruribus, dein accipito systremma.

Venter leniendus, ne si cum difficultate sit egerendum, simul vterus procidat: obseruandum tamen, ne nimium venter subducatur, exoluitur enim, relaxanturque propinquæ partes, & vteri loca procidunt.



Si ex flatu vterus procidat, iniicito  
clysterem qui flatus discutiat, cui  
nonnihil eclegmatis benedictæ ad-  
datur.

### VENAE SECTIO.

Si adfit plethoria, sanguinisque  
detractione egeat ægra, modò dum-  
taxat ad superna aut ad ilia reparat v-  
terus, tunc oppositi pedis saphena  
secanda est: porrò si ad inferna def-  
cendit vterus, axillaris aperienda  
est.

### SYSTEMMA, LA- na conuoluta.

Quum sita fuerit ægra, diuarica- Aegineta  
tis (vt dixi) cruribus, accipito sy-  
stremma ex lana, forma & crassitu-  
dine sinui muliebri respondens, syn  
donéque illud circunvoluito, & in



cremorem acaciæ intingito, aut hypocyrtidem vino in hunc usum immergito, subiicitóque vulvæ, & absque violentia omne id quod procidit sursum torqueto, dum solidus & integer in sinu tumor excitetur, & uterus in proprium reponatur locū.

Obstetrix item præcipitatum veterum manu oleo mastichino intincta in proprium reponatur locum.

## CUCURBITULAE.

**Aegineta** Reposito utero, mulieréque decubante ita ut crus alterum alteri incumbat, post hæc cucurbitulæ sunt adglutinandæ, cum flamma plurima umbilico & utrisque iliis seu lumbis. Quod si repat uterus in latus, lateri opposito affigenda est cucurbitula magna sine scarificatione, cū extremorum eiusdem lateris ligatu



ris dolorem inferētibus, sicque quiescat ægra. Mammarum radicibus in vteri procidentia admouere cucurbitulam proderit.

### OLFACIENDA.

Cum cucurbitulis odoramenta, Aegineta item offerenda sunt perodora.

### PVLVERES, INSES-

### SVS ET FOTVS.

Cæterum tertio die lana finui imposita, mulier in vinum atrum & austerum descendat aliquantulum tepesfactum, siue in decoctione myrti, aut rotundi iunci odorati, rubi, malicorii. Post hæc autem imposita lana tollatur, & altera imponatur eodem madefacta medicamento.

Prolapsam vteri partē oleo tepido, Fuchs.



vel butyro, vel maluæ, althææ, fœ-  
 nigræci, feminis lini, aut similibus  
 decocto fouentes, conuolutam la-  
 nam præparabimus, vt diximus in  
 systemmate. Decocto foliorû lau-  
 ri, mentastri, abrotoni, artemisiæ  
 & similibus fomentatione calefiat  
 vterus, subinde obstetrix gallinæ  
 adipe manus innungat, vterus au-  
 tem feminis cotoneorum mucila-  
 gine inunctus tali inspergatur pol-  
 line. *Rx.* Acaciæ. ʒ. 2. myrti fru-  
 ctus, balaustiorum, rosarum rub.  
 an. ʒ. 1. ꝑ. friato.

Vtero in propria sede reposito æ-  
 gra sequenti decocto infideat.

*Rx.* Rosarum rub. myrti fructuum,  
 rhoi coriariæ, foliorum mespillorû,  
 & cornorum, corticis querni, glan-  
 dium, origani, saluiæ, rutæ, symphi-  
 ti grandioris. an. m. 1. confracta in



aqua cœlesti coquantur, & in deco-  
cto per horam mulier infideat.

## CATAPLASMATA.

Foris cataplasmata inspergentur  
circa epigastrium, diaphœnicôn, sci-  
licet ex farina hordei, aut lente &  
corticibus mali grauari, cum oxy-  
melite, atq; hæc denuo fiant vsque  
ad exactam curationem.

## CERATA ET EM- plastra.

Cerata etiam ex mastiche, agal-  
locho, ladano, thure, iunco odora-  
to, acoro, nuce moschata, lachryma  
arabica, tragacantha, & eiusmodi  
medicamentis parata conueniunt.  
Vel, Fuchsius, R. Thuris, mastiches,  
opopanacis, terebinthinæ, galban.



DE MORB. MVL.

sagapeni, rhesinæ pini, stactes, colophoniarum. an. 3. 1. ceræ luteæ. 3. 3. concinna ceratū, quod corio extensum rotundo super fœmora à muliere deferatur. Vel, Rx.

Galbani. 3. f. galliæ moschatae. 3. 1. caryophyllorum. 3. f. confice ceratū utilissimum. Vel,

Rx. Ladani fordis expertis. 3. 1. f. thuris, mastiches. an. 3. f. agallochi, caryophyll. spicæ nardi & celticæ, ambaris. an. 3. 1. moschi. 3. f. confice ex omnibus oleo ex spica exceptis emplastrum rotundum, quod panno lineo admotum noctu & interdiu assidue deportetur.

VNGVENTA.

Inunctiones in pube fiant ex oleo tigno composito. Vel, Acci.



Olei nucū. ʒ. ʒ. seminis oxylapathi.  
ʒ. ʒ. thuris, mastiches, cornu cerui-  
ni vsti, strobilorum vstorum. an. ʒ. ʒ.  
cera excipe in vnguentum quo in-  
ungatur pubes. Vel, R̄.

Olei ex lilio. ʒ. f. mellis. ʒ. ʒ. pulueris  
cumini. ʒ. ʒ. parum omnia simul fer-  
uere finito, & hoc linimento illine  
pubem calidè, præsertim si ob flatus  
procidat vterus.

## SVFFITVS.

Suffiatur vterus tauri aut bouis  
fimo, colophonia, mastiche, laserpi-  
tio, dictamno in aceto decocto, Hy-  
pocystide. R̄. Acacia, ossis se-  
piæ, balaustiorum, gallarum, nucū  
cypressi, fructuum aut foliorū myr-  
ti. an. ʒ. f. mastiches, libani. an. ʒ. ʒ.  
laserpitii. ʒ. ʒ. ex his contritis coch-  
lear in carbones ignitos iniiciatur



DE MORB. MUL.

& per infundibulum fumus vterum  
intret mulieris ita vestibus testæ,  
quòd vapor ad nares quoquomodo  
peruenire non possit, subindè vte-  
rus aliquo ex præscriptis foru foue-  
atur.

PESSVS.

Rx. Asæ foetidæ. ʒ. ʒ. mastiches. ʒ. ʒ.  
seminis myrti, thuris, gallarum, gal-  
bulorum cupressi. an. ʒ. ʒ. f. oleo myr-  
thino excipe, & pessulum confice.

POTVS.

Si vterus ad latus repat, ore ven-  
triculi ieiuno potui detur ex mero  
vino calido cochlear friamenti se-  
quentis. Rx. Florum & bacca-  
rum lauri, cornu ceruini vsti. an. ʒ. ʒ.  
fructuum myrti. ʒ. ʒ. leuigato.

Vel, Acci. Aristolochiæ rotun-  
dæ. ʒ. ʒ. dato ex vino.



Si vterus ad exteriora procidat, à balneo aut ab infessu propinato portionem sequentem. ℞. Rutæ, artemisiæ. an. m. f. terenda trita simul feruere parum finito in vino, adde nonnihil confectiōis mithridatidis, potui dato.

M O L A. *μύλη* Vteri induratus est tumor, interdum quidem iuxta locellorum ostium, quandoque verò per vniuersam eorundem molem apparens, ad tactum fere lapidosus. Gallis, vng amast.

Aeginetæ

In mulieribus molæ in vtero gestatio: Ita verò appellant informem carnem.

Gal. de morbis curandis. libro. 14.

In mulieris vnius vtero, quas appellarunt molas, ea est caro informis, inanima, ferri ictum & aciem respuens: mouetur, sistitque men-

Plinius lib. 7. c. 15



ses, & ut partus, aliàs letalis, aliàs  
vnà senescens, aliquando aluo cita-  
tiore excidens. Simile quiddam &  
viris in ventre gignitur, quod vo-  
cant scirron, sicut oppio capitori  
pratorio viro.

*Aeginea* Sunt porro qui molam asserant  
carnem esse informem in ipsis lo-  
cellorum tunicis consistentem, &  
quod abortione editur, quemad-  
modum foetus, quæ embrya dicunt.

## CAUSAE.

*Plinius* Molas gigni putant, vbi mulier  
*lib. 10. c.* non ex mare, verum ex semetipſa  
*64.* tantum conceperit, ideo nec ani-  
mari, quia non sit ex duobus: al-  
tricemque habere per se vitā illam,  
que satis a laboribusque contingat.

Fic à seminis muliebris, & plu-



rimi sanguinis menstrui in vtero retentione & affluxu, quem calor immodicus cogit, ac in carnis formam transmutat.

## NOTAE.

A locellorum mole lapidosus tumor cum diuulsione contractionēque superiacētium particularum & hypochondriorum, & gracilentia, pallorēque, & cibi horrore, mensium retentione, & mammarum tumore, tanquam suspicionem conceptionis in quibusdam ab initio statim inducunt, postea verò tēpore discernuntur: molem enim punctationis sensum inferens dolor subsequitur, nec in ea motus vllus, sicut in conceptione percipitur. Nōnullæ verò aquæ inter cutis suspi-

Aegineta



cionem præferunt. Cæterum hoc ex tumoris duritia dignoscendum, nec sicut in hydrope manus aut digitorum impulsui cedat, & ex eo quòd sonitus non redditur dum digitis pulsatur, timpani modo.

Ex arab.

Mola & imprægnatio conueniunt, quòd in vtraque supprimuntur menses, tumescit aluus moueturque, mammae tumescunt, vertigo & oculorum hebetudo sequitur, cordis tremor adest, nausea & cibi inappetentia cum succorum variorum vomitione, cutis defœdatur ei quæ mola correpta est, palpebrae mollescunt, oculi cauantur, pupillae gracilescunt, toruos habet oculos.

Vix tandem ab vtero gerente distinguitur quæ mola laborat, discrimina tamen sequentia te certiorrem reddent. Mensibus debitum



Ordinem servantibus vtero gerens fit mulier, aliquando mola laborans etiam. Intra trimestrem mouetur mola in locellis, contra foetus in locellis vtero gerentis.

Molâ cytissime tumescit aluus, Foetus dextrorsum sinistrorsumque mouetur, contra mola nisi comprimatur, aut mulieris motu excite-  
tur, non mouetur.

In mola durior tactu aluus percipitur, quàm in foetus gestatione.

Prægnans agilior est, quàm molam gerens.

Quamquam in mola aluus tumescat, non tamen semper mammae tumescunt: molliores enim & graciliores efficiuntur, quàm in vtero gerente. Aequaliter mollescunt maxillæ, manus pedesque in mola, contra in prægnante.



Vtero gerens parit saltem in vñ-  
decimo mense, molâ vero laborans  
sæpe in. 14. etiam interdum in. 4. an-  
no aut quinto. &c. In hydrope pe-  
des tumescunt, contrâ in mola.

Molæ motus est ab alto ad infer-  
num.

## PRÆSAGIA.

*Aegineta* Mola in quibusdam re vera in  
hyderum transit ob iocinoris refri-  
gerationem.

Nonnumquam verò incurabilis  
magna ex parte morbus nascitur,  
quibusdam sanè sanguis quoque ef-  
fertur. Mola omnis & pauci  
& multi temporis vix curatur.

Humorosa difficiliùs curatur quâ  
flatuosa, porrò carnosâ difficillimè.

Molæ symptomata colicæ paria ef-  
se putantur. Mola innumeros  
aberrare medicos coëgit.



## VICTVS.

Primum omnium alimenta boni Aegineta  
succī offerenda, ac vini potione utē  
dum moderata. mulier motu non  
utatur vehementi, is enim fluxio-  
nem commouet: sed gestationibus  
& deambulationibus, pedes etiam  
decumbendo elatiores habeat.

Communis igitur decubitus ip-  
sis in domo minimè ampla & opa-  
ca confert, & modicè refrigerante  
circa lectum immobilem: sublimio-  
ra sint quæ pedes earum in quiete  
fulciunt. Efficax quippè ad prouo-  
candum omnem fluxum motio.

Sex rerum non naturalium tem-  
peries esto calefaciens & hume-  
ctans.

REGVLAE CVRANDI

I iiii



Aegineta

Tumores quidem duritiâsque eâ ratione quâ in scirrhis vteri scleromatîsque medebimur: sed aquosas parenchyfes, per ea quæ de hyderis dicemus.

Eruptiones item sanguinis vuluæ, perinde atque fluxiones sanguinis alias, fluxumque curabimus.

Corpore vacuato cataplasmata, fomenta, infusiones, pessi, vnguenta, & cerata quæ relaxandi vires habent, adhibenda, & ea quæ foetum mortuum & secundas trahunt. Humor concoquendus perinde atque in menstruorum suppressione ex pituita dictum est. Euacuandus item.

## VENAE SECTIO.

Principio in plenitudine venâ cubiti incidenda.



PVRGATIO PER  
aluum.

Sanguine misso fiat purgatio per  
catapotia foetida.

## POTVS.

Acci. Hyperici, sabinae, mentastri,  
vtriusque calaminthae, myrini, ar-  
temisiae, rubiae passivae, pulegii. an.  
m. f. anisi, foeniculi, schoenianthi,  
seminis dauci & oreoselini, calami  
odorati, galangae. an. 3. 1. acori, rha-  
phani gallici. an. 3. 1. aceti. 3. 3. mell.  
lib. 1. fiat decoctio, cuius portio. 3. 4.  
detur cum. 3. 2. pastillorum sequen-  
tium.

Rx.

Cinnamomi, myrrhae. an. 3. 1. & 3.  
1. f. rutae, sabinae, calamenti, pule-  
gii siccatorum, rad. rubiae, sagape-  
ni, opopanax. an. 3. f. cardamomi,  
seminis iuniperi, mentastri. an. 3. 2.  
coñice ex his friatis pastillos pōd. 3. 2.



DE MORB. MVL.  
INSESSVS ET  
Balneæ.

Acci. Althææ rad. folia, caulis &  
florum. m. 3. maluæ, branchæ vrsinæ,  
perdicij, chamæmeli, fertulæ campa-  
næ. an. m. 1. fœnigræci & seminis li-  
ni. an. lib. 1. confracta coquantur, &  
decocto infideat ægra, tenendo sac-  
culum super plenum his quæ deco-  
cta fuere.

VNGVENTA, CERATA  
& emplastra.

A balneo os sacrû & pubes hoc vn-  
guento inungantur. quod R. Ol.  
amygdal. dulcium. 3. 1. f. olei lili-  
ni, adipis gallinæ, mucilaginis, se-  
minis lini & fœnigræci. an. 3. f. ceræ  
albæ parum, confice vnguentum.  
Cerata quæ vires relaxandi habent  
adhibenda, qualia sunt quæ ex al-



thæa, malua, chamæmelo, meliloto,  
fænogræco, semine lini & similibus  
parantur. Conueniet in hunc vsum  
vnguentum dialthææ, aut empla- Fuchf.  
strum de meliloto, diachylon sim-  
plex admouere. Vel hoc,

Olei amygdal. dulc. 3. 3. liliacei. 3.  
2. f. pinguedinis anseris, & gallinæ.  
an. 3. 1. f. mucositatis seminis lini,  
fœnigræci. an. 3. 1. ammoniaci, bdel-  
lii. an. 3. 2. rad. althææ, seminum ni-  
gellæ, dauci. an. 3. 2. ceræ, quod satis  
est, fiat vnguentum, gummi disso-  
lutis prius in vino.

Inunctiones item & emplastra  
fiant ex oleo rutaceo, oleo benedi-  
cto, oleo ex castor. & aliis oleis cali-  
dis.

Vtile erit vnguentum agrippæ, si  
flatibus vterus sit infarctus.



## CONFECTIONES.

Acci. Diacumini, diagalangæ, dia-  
 cinnamomi. an. 3. f. diambaris. 3. 1.  
 dialaccæ. 3. f. cinnamomi electi, hy-  
 perici, calami odorati, perpenſæ,  
 rad. acori, seminis anifi. an. 3. 1. se-  
 minis rutæ, zingiberis, artemisiæ,  
 marrubii, dictanni, saluiæ. an. 3. f.  
 sacchari. 3. 6. soluatur saccharum ar-  
 temisiæ & hyperici succo, fiat con-  
 fectio in morsulis ponderantibus. 3.  
 2. aut tres, detur morsellus quoti-  
 die à cubili.

Post inunctionem rotulam sequē-  
 tis confectionis comedat, deinde  
 bibat momentum vini in quo dilu-  
 tum sit asarum. Rx.

Cinnamomi. 3. 1. casia, aristolo-  
 chia rotundæ, corticis casia fistu-  
 laris. an. 3. 4. asari, laccæ, ruthæ syl-  
 uestris, seminis sabinæ, croci. an. 3.



℞. sacchari. ʒ. 3. liquetur saccharum  
rosmarini succo & rotulas concin-  
na pond. ʒ. 2.

## PESSI.

Pessi quoque subiiciendi ex bu-  
tyro, adipe porcino, medulla cerui-  
na, passulis, caricis, seminibus lini  
& fœnigræci confecti.

Acci. Rad. asari, acori, rubiæ tin-  
ctorum. an. ʒ. 2. seminum rutæ, ni-  
gellæ. an. ʒ. ʒ. f. maioranæ, nucis my-  
risticæ, caryophyll. baccarum lauri.  
an. ʒ. 1. sabina. ʒ. 1. castorii, euphor-  
bii. an. ʒ. ʒ. f. Redigantur singula in  
pulverem tenuissimum, & cum te-  
rebinthina chesina formentur pessi.

Vel,

℞.

Asphalchi, nitri, castorii, centaurii  
grandioris, dictanni, veratri candi-



DE MORB. MVL.

di, galbani, gentianæ, opopanax,  
sabinæ, sagapeni, scammonii. an. 3.  
f. omnia friata porri succo excipiā-  
tur & in petiam raram indātur, di-  
gerantur in pesslos, qui immissi filo  
cruribus suspendantur.

SUFFITVS.

Suffiatur vterus vngula equi aut  
asini, & omnia tandem fiant quæ in  
mensibus suppressis descripta sunt.

Mirificè etiam confert vti bal-  
neis naturalibus, potissimum si ma-  
lum diuturnum fuerit.

INFLATIO VTERI

quam græci ἐμπνευµα-  
τισµὸς dicunt.



## CAVSAE.

Inflatur vterus frigiditate, aut corruptione, aut incommodo partu ostiolo conniunte, sanguinéque in exiguos globulos concreto, in eodem cunei modo obstructo, quandoque sanè in concauitate loculamenti sinuosi flatibus relictis, nonnumquam verò in laxationibus totius corporis vuluæ.

Affidua comestio ciborum qui flatus gignunt, vt raporum, castaneorum, panis filiginei. &c.

## NOTAE.

Hanc comitatur tumor pectinis, Aegincta atque ventris circa vmbilicum hypogastrii appellati, cum duritia & dolore punctuoso, vsque ad septum transuersum, & stomachum, & inguen pertingente ac transeunte: &



ad digitorum pulsationem sonitus tympani instar editur.

A tympanite discrimen habet, quòd ægrotæ hoc flatu correptæ nō ita siti præmuntur, neque corporis supernæ partes sensim liquantur, ut in tympanite aquarum cutem subeuntium genere.

Adfunt ructus, & flatus per os exeunt, qui has leuant.

### PRAEDICTIONES.

Flatus in cauo locellorum sinu contentus facilius discuti digerique potest, quàm ille qui in angulis ipsorum consistit.

At qui locellorum villis & substantiæ hæret difficillimè curatur.

### NUTRICATIVS.

Quæ flatus gignunt cibaria vitāda,



comedenda autem sunt quæ status  
discutiunt.

### CLYSTERES

Clysteres conficito ex his quæ  
status discutiunt, cum hiera picra  
galeni.

### VENAE SECTIO.

Medendum itaque, primò qui-  
dem detractione sanguinis, si nihil  
impedimento sit.

### PVRGATIO PER aluum.

Inueterata autē affectione picra *Aegineta*  
purgandum atque hiera.

Hieram archigenis exhibeto cum  
decocto eorū quæ status discutiunt.

### IRRIGATIONES ET epithemata.

Mox circa paroxismos inedia & *Aeg. acti*  
irrigationibus ex oleo rataceo fa-  
ctis medendum. Epithemata prate-  
m



DE MORB. MVL.

rea quæ emolliendi potētia regnāt,  
puta polyarchium & diaspermation  
& diadaphnidon, applicanda sunt.

Vel, Filtrum nouum ferueat  
in aqua cum cineribus, & aniso &  
maratero, & calidum imponatur pu  
bi & ossi sacro, sudorem prouocan  
do. Decoctiones sunt ex perdi  
cio, ruta, absinthio, artemisia, hedera  
terrestri, abrotono, nepita, foliis viti  
cis, origano, calamēto, pulegio, sam  
psucho, thymo, serpyllo, ex quibus  
etiam potiones propinabis.

INSESSVS.

Aegineta Lucathismatis medendum ex de  
cocto rutæ, pulegii, artemisiæ, casia  
& id genus aliis. Fiant etiam in  
sessus ex herbis calefacientibus &  
siccantibus, & seminibus flatus dis  
cutientibus.



## CATAPLASMATA.

Cataplasmatibus item vtendum,  
quæ ex feminibus, apio, cymino, fœ-  
niculo, aniso, ameos, hordacea fari-  
na conficiuntur.

## CUCURBITULAE.

Cucurbitulis quoque leuibus in- Aegineta  
anibûsque, & incisa cute scalpello  
vtere. Cucurbitulæ ( inquit A-  
uice.) ignitæ sine scarificatione ma-  
tricis regioni admouendæ sunt.

OBSTETRICIS MV-  
nus.

Cæterum obstetrix digitum an- Aegineta  
tea illitum inferens, incumben-  
tem sanguinem in frustula conglo-  
batum si assequatur, auferat clemen-  
ter ipsum resoluens, deinde rursus  
cataplasmatibus modo imponenda, fi-  
cus, nitrum & absinthium.



DE MORB. MVL.  
PER METRANCHY-  
tum iniicienda.

Origani, foliorum viticis, rutæ  
an. m. f. carei, anisi, ameos. an. 3. f. co-  
quito in olei & vini. an. lib. x. ferueat  
vsque ad consumptionem vini, in  
colamento solue hierapicræ. 3. f.  
& iniice. Hiera archigenis pari mo-  
do iniicienda est.

PESSVLI.

Accineta

Pessuli denique ex ruta, melle,  
nitroque formentur, cum primis au-  
tem ille accommodatus est qui fa-  
berrime è ficuum pinguium con-  
cussarū. 3. 1. cymini. 3. 2. spumæ nitri.  
3. 1. concinnatur, sed propter acrimo-  
niam in lacte prius macerentur.

Pessuli postremò cuncti, qui emol-  
liendi virtutem habent, ad eam pro-  
uinciam sunt perquàm idonei.

Acc. bdellii. 3. 1. f. xylobalsami, car-



pobalsami, costi.an.3. 1. origani, cy-  
mini.an.3. f. confice pessulos cum  
oleo nardino & rutaceo, qui nocte  
integra in locellis persistant.

## PLACENTAE MOR- fuli, & eclegmata.

Vtila sunt, Dianison, Diacymini,  
hialogod, diacalaminthæ, Dia-  
permatum, Diamarthæ, Diacucur-  
mæ. Detur drachma vna eclegma-  
tum aut placentarum prædictarum  
ieiunæ ex decocto radicum aperien-  
tiū & seminū flatus discutientium.

Rx. Specierum diacucurmæ, spe-  
cierum diacumini. an.3.3. sacchari  
albi lib. f. liquetur saccharum succo  
rutæ limpidiori, & in morsulos dige-  
rito, à balneo exhibeatur vnus mor-  
sulus cum vino tenui meracissimo,  
in quo dilutum sit asarum.

## POTVS.

m iij



Acc. malorum persicorum nucle-  
os viginti, pistillo tunde cum ouo-  
rum duobus luteis, quibus adde ga-  
lagæ, cinnamomi, piperis longi, zin-  
giberis, caryophyll. croci, nucis my-  
risticæ. an. obolum vnum, adde de-  
mum saccharū & vinū tenue mera-  
cissimū, feruere paulum omnia fini-  
to, & calidum mulieri propinato.

## IN VNCTIONES.

Inungendus aluus est oleis fla-  
tus discutiētibus, puta oleo liliaceo  
& rutaceo.

## EMPLASTRA.

Acc. bdellii, gummi āmoniaci, an.  
3. 1. feminis viticis, centaurii, abroto-  
ni, origani, calamenti, casia, ameos,  
an. 3. 2. terebinthinæ quātum sit fa-  
tis, fiant duo emplastra, quorum al-  
terum admoueat<sup>ur</sup> ossi sacro, alterū  
pubi.



## SVFFITVS.

Suffiatur ladano, myrrha, gallia  
moschata, & euphorbio.

## INFLAMMATIO.

locellorum.

## CAVSÆ.

Phlegmone vteri è pluribus fa- Aeginera  
ne causis originem trahit. E plaga  
namq; ictuue, ac mensium suppres-  
sione, à frigore item & instatione,  
neq; minus etiam abortione, pariter  
& ex partu propter malam foeturā.  
Gignitur item vlceratione, concu-  
bitu metas rationis excedente, sel-  
læ nimis duræ infestatione, lōgissīma  
intentissimāq; deābulatione, sæpe  
& transpiratione ob frigus prohibi-  
ta. Ex sanguine demū, pituita, bi-  
li flaua & atra gigni potest.

m iiii



## NOTAE.

Gal.lib. Inflammatio in vulua est, quæ sit  
 definiti. cum dolore vētris inguinūque in  
 qua cum febribus accidit incipitis  
 dolor, & oculorum cruciatus. Ab-  
 scessus autem in vulua est, quum do-  
 lor intensus est, pulsus fiunt, crucia-  
 tus ad ingnina vsque & lumbos per-  
 tendit, febres accedunt. Comitatur  
 autem locellorum inflammationē,  
 pubis & lumborum dolor, febris a-  
 cuta, dolor capitis & radices oculo-  
 rum & ceruicis, volæque seu iunctu-  
 rarum, manuum & digitorum, nec-  
 non colli conuulsio & inclinatio in  
 contraria, affectionesque stomachi  
 quæ per consensum exuscitantur,  
 osculi matricis suffocatio, pulsus par-  
 ui & densi. Et siquidē obscurior fue-  
 rit inflāmatio, haud valide sanè, aut  
 crudeli dolore vuluam afficit: sin ve



ro strēnuē & fortiter inflammetur,  
tum & ipsa quoque ab omni parte  
quāta quāta est, pulsatoriē dolet.

Tota quidem inflammata, per totā  
pariter ipsam, partē verò modo in-  
flammatione affecta, iuxta hanc po-  
tissimū significatur. Posteriore quip-  
pe ipsius particula phlegmone infe-  
stata, dolor circa lumbos excruciat,  
scybalū hoc est stercus specie oleti  
canini, in angustum redactō atque  
oppresso recto intestino, moratur.

Partibus verò prioribus inflamma-  
tis, dolor circa pectinē, vrinæque sti-  
licidium, aut lotii difficultas oritur,  
stricta atque in arctū redacta vesica.

Si autem latus locellorum inflam-  
matione tentetur, non tam bubo-  
nes intenduntur, quā crura etiā  
aggrauantur. Quòd si pygma, hoc  
est posterior vteri pars inflāmetur,



partes vmbilico circumiacētes dolore potissimum cum tumore molēve infestantur. Vbi autē circa osculum inflammatio occuparit, graui lāguentes secundum omnem ventris partem vmbilico finitimam, quam epigastrium græcè appellant, dolore afficiuntur, digitóque immisso atq; impresso durē ac grauius subsidet ostiolum atque succumbit. Si ex

Arabes.

sanguine lingua nigrescit, sequitur delirium, vrina rubēs, aut subrubēs est cum liuore, arteriæ motus magnus, plenus & vndosus, oculi citrii mali corticē colore referunt cū aliqua rubedine, venæ omnes tumēt.

Gal. de  
arte cura  
tiua ad  
glaucō-  
nem.

Prima igitur inflammationis differentia secundum quam hanc quidem humidam, hanc verò siccam.

Humidam quidē quæ ex calida fluxione membrum occupante con-



tingit: siccā verò quando nullo humore influente calor naturalis effervescit, hoc autem vsq̃ue ad aliquid quidem veluti febris est membri. &c. Nam fluente sanguine altera flaua bile altera, ambobusque simul humoribus, alia tertia. Et quidē in earum singulis vel iam putruit id quod influxit, aut in membro constrictū putrescit, & vel crassum est, vel tenue, & vel optimum, vel acre. Vide cætera lib. 2. artis curatiuæ ad glauconem.

Omnino eius fluxus, qui inflammationem efficit, vel flauæ bilis est, vel atræ, vel pituitæ.

Significat verò verbum inflammari, velut si per vri, succēdi, ignisque proditum sit.

Si ex pituita inflāmatio, pituitosi succi notæ adsunt. Si ex bili atræ aut

Gal. lib.  
2. de crisi  
bus. c. 12.

Gal. in. 1.  
aph. 30.  
Ilia salu  
berrima.



flaua, propriis notis deprehendes.

## PRAEDICTIONES.

**Auicen,** Apostemata vteri ex quacūque oriatur materia difficillime curatur, si in imo locellorū cauore aut profundo abscessus sit, aut inflammatio, vt plurimum nunquam curatur.

Acutorum morborum albo locello rum abscessus, aut inflammatio depingenda est, diebus etenim decretoriis iudicatur. Omnis inflam-

**Arab,** matio, aut abscessus, aut resoluitur, aut per halitū disicitur, aut in scirrhū transit, quo fit si tumor discutiatur symptomáque quiescāt, inflā-  
mationis aut abscessus resolutionē propediem futuram signant, quòd si in pus desinat inflāmatio, dolor pulsatilis & cætera symptomata sensim



augebuntur. Cæterum si pus exierit leue, album, æquale, ac boni odoris, bonum, si autem varium in colore fuerit, & diuersum in substantia cum tetro odore, animam aget propediem ægra.

Pus optimum est, si cādidum, le-  
uēque & quamminimē foetidū est, <sup>2. predi-</sup>  
maximē verò contrarium huic de- <sup>tionum</sup>  
terrimum est. 46.

Ex inflammatione & abscessu gi-  
gnuntur sæpe scirrhus, cancer, rimæ  
uteri. In inflāmate aut abscessu  
locellorum, si percipias sudorem ge-  
lidum, vocis amputationem, animi  
deliquium, scito morituram acutū  
ægram. Maior inflammatio mi-  
nore deterior. Urinæ aut alui flu-  
or in inflammatione bonus est.

## VICTVS.



Aegineta

Cibi quoque commendatur ab-  
 stinentia per vniuersum triduū, me-  
 dendum verò chondro ex melicra-  
 to, aut pane, aut ouorum sotbitio-  
 ne tertio die. In declinatione por-  
 rò vteri victus ratio principio quī-  
 dem tenuis, facta autem morbi rela-  
 xatione pauca.

Fuchf.

Aegram in domicilio obscuro,  
 & moderatē tepido collocabimus,  
 quietem imperantes, ac crura eius  
 ab omni motione prohibentes, de-  
 inde artus & extrema fricabimus.  
 In cibo qui quantitate modicus sit  
 vtatur agra ptisanæ cremore, & ouis  
 sorbilibus. Potus sit decoctum cin-  
 namomi aut hordei. Vescatur iu-  
 re pulli, à triplice malua, cremore  
 hordei & hauenæ.

Aegineta

VENAE SECTIO.  
 Post abstinentiā triduanā, secta



vena cubiti, sanguis (nisi quid impe-  
diat) detrahendus est. In principio  
itaq; curationē aggressi, si neq; ætas  
neq; habitus corporis, neq; āni tem-  
pus obstiterint, neq; inflāmatio post  
abortū aut immēsam sanguinis eua-  
cuationē superuenerit, venā popli-  
tis secabimus ex Gale. decreto, qui  
in lib. de curādi ratione per venæ  
sectionē, inflāmatio nēve vteri à ve-  
nis in crure sectis iuuari scribit.

Fuchsius

Incipiendū à venæ axilaris inci Arab.  
sione, postridie ambæ saphenæ secā-  
dæ sunt, aut altera ipsarū.

## SERAPIA &amp; POTVS.

Serapiū violaceum, zulapia con-  
ficiātur ex refrigerantium herbarū  
decocto, aut liquore ipsarum stilla-  
titio.



DE MORB. MYL.  
PVRGATIO.

Per aluum subducendus humor  
qui morbum genuit, casia fistulari,  
daetilis indicis (quos thamachindos  
vocant) māna, fructuum cordialiū  
decocto. &c.

FOTVS.

In curatione itaque ante omnia  
*Aegineta* quidem irrigatione ex œnelæo, siue  
œnorhodino semine tenus & circa  
ilia seu lumbos vtēdum, per obstru-  
ctiones ē lana pura absque illigatio-  
ne confectas.

CATAPLASMATA.

*Aegineta* Quinto autem die cataplasma  
imponatur ex polline, semine lini,  
scenogræco, mulso maceratis com-  
positum: capita quoq; papauerum  
decocta forbeantur, & ex oleo eadē  
applicentur. Si autem inflammatio



erysipelatoſa exiſtens, calefactiones moleſtè ferat, illiſque magis irritetur ſertulā cāpanā in paſſo elixans, atq; conterens, adiicito ouorū cocto rū putamina cū roſaceo, aut melino, aut croceo, cataplaſmatique modo applicato, aut palmularum dactylos vino temperato coquens, cū tenuiſſimo farinae polline leuigato, & cum quopiam vngvine, factoque cataplaſmate impone.

## CERATA, EMPLASTRA & inunctiones.

In inflammationis aut abſceſſus aggreſſu emplaſtra epigaſtrio & umbilico admoueantur, confecta ex roſis, lentibus reiecto cortice, balauſtiis, plātagine, muccoſitate herbæ pulicaris, ſolano, labro veneris, ſedo,

Arab.



ramento cucurbitæ satiuæ, santalis,  
fructibus adstringentibus, quæ om-  
nia aut similia excipiantur hordea-  
cea farina, & oleo rosaceo, ol. myr-  
thino, ouique albumine.

In vigore inflammationis, aut post  
septimum diem acopa adstringenti-  
bus misceatur, puta, lini seminis pol-  
len & fœnigræci, farina volatilis,  
chamæmelū & ipsius oleū, rosaceū,  
violaceū, & ouorū lutea. Vel tunc  
imponere emplastrū Haly, quod R. fa-  
rinæ hordei & fabarum, maluæ, vio-  
larum, an. ʒ. f. caphuræ. ʒ. f. diluan-  
tur omnia & macerentur liquore stil-  
latio aut succo corianni & labri  
veneris, confice emplastrum addita  
cera. Doloꝛe sedato pubi & pecti-  
ni impone emplastrum sequens.

R. Chamæmeli, fertulæ campanæ,  
rad. althææ, seminis lini, fœnigræci.



an. 3. 1. caricarū pinguiū . 8. numero,  
 dactylos sex, friantur terenda, & o-  
 uorum luteis quinque excipiantur,  
 quibus adde violarū decoctum cū  
 rosaceo, cōcinna emplastrum quod  
 sedabit dolores, molliendo matu-  
 randóque.

Malo remittente cerota nardina, *Aegineta*  
 aut cyprina inferenda adglutinan-  
 da est,

Cæterum aduersus ardentiores *Aegineta*  
 inflānationes, ēplastrū *διακνυλῶν*  
 in diplomate vase cū rosacci lique-  
 factione commisce cremorem plan-  
 taginis, aut sereos, aut cichorii, aut  
 intybi, vel si mauis sequente vtere,  
 constante adipe anserino suilóve re-  
 cente, pondo. 3. 4. cerota rosacea, aut  
 fusina pondo. 3. 1. ouorum assatorū  
 lecythis pondo. 3. 1. croco, pondo 3. 1.  
 myrrha pondo triobuli, opii obolis

n ii



duobus, vel opii loco capilis papa-  
uerum decocto. In declinationi-  
bus matricis quas *πρεγκλίσεις* vo-  
cant, secundum paroxysmos quidē  
perinde atque inflammationibus,  
medelis succurrendum. Verū in  
quietis tēpore & remissionibus mor-  
bi vehementioribus mollificatiuis,  
sed inueteratis, cum his quæ assimi-  
landi virtutem obtinent, foris au-  
tem duritia existente, malagmatis  
vtendum, puta eo quod ē fertula cā  
pana cōficitur, *διαμελυλῶτων* ap-  
pellatur, necnon malagmate man-  
sei & tresii, nigro serapionis, aut py-  
rina.

## INSESSVS.

Cæterum per omnem medicatio-  
nem encathismatis quoq; ex deco-  
ctione foenigræci aut seminis lini,



maluæ, artemisiæ & oleo concinnatis vtendum : at qui in his quæ hæc non sustinent, ex calida aqua eiusdem qualitatis rosaceo infuso fiant.

At vbi inflāmatio declinare cœperit, ad ea veniemus, quæ quadantenus, remittendi discutiendique vires habent, ægrotam igitur in fœnigræci, althææ, seminis lini, maluæ, interdū artemisiæ, marrubii & saluiæ decoctæ vsque ad lumbos sedere iubebimus.

### DILUTIONES PER metranchytum.

Cæterum si agra nodum soluerit herculeum iniice decoctū sequēs in locellos in morbi aggressu.

Acc. ros. rub. lentium cortice reiecto, plantaginis, labri veneris, sola

n iii



ni, endiuia, an. m. i. coquito ad tertias, & cum mettranchyto in locellos prœiice huius decocti. ʒ. 6. tepidè. vel ʒ. decocti gallarum, balauftiorum, lentiũ cortice exutarũ, rhus coriaria, rofarũ & seminis myrti. ʒ. 6. iniice cum mettranchito. Virginem porrò insidere facito decocto dictorum & dicendorum, quæ cum mettranchyto in corruptæ vterũ immittenda sunt. Secundo demum aut tertio die addes chamæmelum, semen lini & fœnigræci.

In morbi vigore sume malua, althæa, chamameli, fertulæ cāpanæ, fœnigræci, semi. lini. an. m. i. caricæ. 20. coquatur, decoctum in vterũ iniice, vel ex ipso fiât encathismata, aut cataplasmata. In inflāmationis vteri inflāmatione. ʒ. sampsuchi, aut sifm. ʒ. 4. olei liliacei, aut de inula ʒ.



2. iniice. Vel ℞. liquoris stillatitii, si-  
 fymbrii aut sampsuchi. ʒ. ʒ. pingue-  
 dinis galinæ, aut anseris. ʒ. ʒ. stactes,  
 galbani. an. ʒ. ʒ. olei liliacei. ʒ. ʒ. mista  
 iniice. Vel ℞. liquoris stillatitii  
 sampsuchi. ʒ. ʒ. medullæ cruris vitu-  
 li, pinguedinis gallinæ. an. ʒ. ʒ. sta-  
 ctes, ʒ. ʒ. ladani. ʒ. ʒ. liquantur vnâ  
 & iniiciantur.

## P E S S I.

Pessi præterea, enchymatismi que **Acgineta**  
 sumendi sunt, ex hyssopo nempe &  
 butyro, medullaque ceruina, necnō  
 adipe anserino, & vnguento susino,  
 & cera lyrrhynica, in his quæ calidi-  
 tatem ferre nequeunt, aureus etiam  
 quem vocant pessulus conuenit, &  
 enneapharmacum, sed quæ ne hæc  
 quidē sustinere possunt, his ex ouo  
 & rosaceo, adipéque anserino seu

n. iiii



galinaceo cōficiatur. Quòd si vehē-  
mentissimus ac nimius infestet do-  
lor succi papaueris lentis quātitatē,  
cū lacte muliebri, & succo fœnigræ-  
ci, ad subiiciendum in velere pessulī  
modo porrige. Porro ad eas quibus  
duritia ac scirrhus cōiūctus est instā-  
mationes, medicamentum rosaceo  
dissoluens, vel modo iam dicto su-  
biice, vel infunde. Vel ℞. ladani.  
ʒ. ʒ. styracis, galbani. an. ʒ. ʒ. pingue-  
dinis anseris. ʒ. ʒ. fiat pessus.

### VNGVENTA.

Vnguantur hypogastrium & os  
sacrum oleo chamæmelino, rosacco  
violacco.

### EPITHEMATA.

Primis morbi diebus tale pubi



& ossi sacro imponendum est epithema. R. succi plantaginis, succi solani. an. lib. ꝑ. aceti. ʒ. i. sanguinis draconis, glebæ armenia, ā. ʒ. ꝑ. misc. prædictis addere potes oleum rosaceum, succū labri veneris, fedi, endiuiæ, quibus calidis diluere potes petias, & eas madefactas dictis locis imponere.

### VOMITIO.

In incremento vomitus ciendus Arabi est.

### ABSCESSVS.

Abscessus dicitur foris impetētia. De abscessibus vide Gal. lib. 2. artis curatiuæ ad glauconem. Abscessus est mutatio corporis ex inflammatione in materiam purulentam.

### NOTAE.



Postquā inflammatio matricis mæ-  
 Aeginet, turuit, inque abscessum trāsit exit-  
 que, intendi signa quæ memorauimus videas, ad hæc indicia quāquā  
 inconstanter cū horrore proferunt  
 sese, principio quidem intensus cum  
 doloribus, postremò verò ad suppu-  
 rationē perducto apostemate, impe-  
 tus aliquantulū remittitur. Caterū  
 in eo quo disrumpitur tēpore, cru-  
 ciatus sæpenumero acriores stimu-  
 losē & quasi cū aculeis incidere vi-  
 dētur, calorēque vehemētiores mo-  
 lestant, atq; nōnunquā quidem vri-  
 na supprimitur, interdum verò ole-  
 tum, factō iuxta affectam vteri par-  
 tem impedimēto, aliquādo verò tu-  
 mor circa pubē apparet, & tanquā  
 clydismi sensus. Quū abscessus  
 grandior fuerit, hoc verò in obuiis,  
 quasque ad manus locis dioptris-



mo instrumento aut digitorum attactu deprehenditur, unde etiam dolores acerbiores infestare ob nervosum ipsius oris consueverunt. Quod si igitur id quod in fundo atque secundum sinum dolore magis vacat, & digitorum attactu tumor minimè succumbit, ostiorum verò matricis gracilius videtur, ei quæ statim aut paulo ante inducta est suppuratio, cataplasmatibus sequentibus utitur.

### PRAEDICTIONES.

Prognostica lege lib. 3. crisia Gal. cap. 9. Gal. & 24. prædictionum lib. sententiâ. 34. Qui tenuem crudamque. &c.

### VICTVS.

Victus esto, uti earum quæ uteri inflammatione laborant.



DE MORB. MUL.  
CATAPLASMA.

Aegineta Cataplasmatibus ex fœnogræco, semine lini, hordeaceo autriticea farina, admixtis interim ipsis ficibus elixis, opitulandum aliquando etiã colubæ stercore.

INSESSVS.

Aegineta Encathismatis præterea uti in inflammatione iugiter utendum.

PESSI.

Pessuli itẽ quum ita se res lague-  
tis habet, ex resina terebinthina,  
myrrha, hyssopo atq; butyro conci-  
nati laudantur.

RVPTO VTERI APO-  
stemate, facienda.



Dum pus cōficitur, dolores ac fe-  
bres accidunt magis, quàm iam cō-  
fecto. 2. aph. 47. Gal. Si pus (inquit  
Gal.) ex sanguine ortū habet qui fo-  
minalē, vt quispiam dixerit, habet  
transmutationē, nam mala simpli-  
citer cum putrefactione fit olida, si-  
cuti quæ simpliciter optima est ipsa  
nutritio partium animalis: at quæ  
pus generat mediū inter has obti-  
net locū, neque à solo calore extra  
naturam, neq; à solo secundū mate-  
riam facta. Mixtus enim quodam-  
modo ex vtrisque est calor inflam-  
mationis. Fit autem dolor extenta  
simul, ac calefacta præter naturā in-  
flammata particula. Febres verò se-  
quuntur principio calefacto, & hæc  
ambo contingunt ex quadā veluti  
ebullitione sanguinis, qui vbi ex to-  
to exustus fuerit, residuū eius fit pus



quæadmodû ex lignorû exustione cinis: atq; ideo tēpore illo dolores sedātur, ac febres, præsertim quū pus fuerit excretû, vt pote iā consumpta materia, extincta autem ignea caliditate.

**Aegineta** Perlege cōmētariū Galeni in. 2. prædictionū Hipocratis, sententiā. 46. Pus optimum. &c.

### POTVS.

Rupto porrò abscessu, siquidem pus in vesicam deferatur, quod scitur ex puræ vrinæ misto, lactipotationibus vtendum, cucumerisque semen potandum. Potanda item sunt decoctum hordei, &. 4. seminū refrigerantium communium maiorū mucillago, serapiūmque violaceum.

### CLYSTERES.



Si in intestinum rectum pus cō-  
fringatur, lentium, corticūque  
malorum punicorū elixatione col-  
luendum.

Vel ℞. Decocti hordei, libro pri-  
mo duo lutea ouorū, olei rosacei. ℥.  
℥. mellis rosacei, ℥. i. fiat clyster.

PER METRANCHY-

tum iniicienda in vterum.

At si apostema sinū versus, quē  
græci κόλπον nuncupant, ruptum  
destuat, siquidē pus immistū purū-  
que existat, rosaceum infundito, aut  
amygdali cortice exuti atq; dealba-  
ti oleū, aut tetrapharmacum regale,  
recens denique butytum, serū ca-  
caprillū melli rosaceo mistū inii-  
ciantur. Vel ℞. Hyssopi, absin-  
thii an. m. i. vini albi, lactis, an. lib.  
i. mellis rosacei. ℥. 4. coquito ad ter-  
tias, & decocti. ℥. 6. iniici. o.



Sed ubi sanies, aquosusve sanguis quem græcè ἰχθῆρα dicūt, eruperit, quemadmodum ex ulcere pascendo repētē noma, maiorem tunc constringendi stipticandique vim immitendum enāma habeat, expedit: id autem fiet, si ex myrtis, palmarum dactylis, lenticulæque componatur. Vel. R.

Arnoglossi, solani an. m. i. coquantur, cuius decocti sume. 3. 4. lactis. 3. 2. albuginem unius oui, rudicula motu misceantur & iniiciantur.

### QVOMODO MANV medendum.

Quum autem in muliebrium locellorum ore natum apostema fuerit, neque illud confringatur postquam extenuaueris circū iacentia puri corpora, ad puris excretionem



chirurgica manu vtamur.

## EXVLCERATIO LO- cellorum.

### CAVSAE.

Exulceratur subinde vulua mu- Aegineta  
lierum, vel ob difficultatem partus,  
vel embryulciam, vel corruptionem  
ex medicamentis acribus, vel ex  
fluxu, vel ex ruptis denique abscef-  
sibus.

Causæ vlcerum quæ in vulua ser- Gal.lib.  
definitio  
punt, interdum abscessus, nonnum- num.  
quam etiam pessus, id est casus vel  
callus corruptus, tabidúsve, aliquā-  
do in vulua durities aut varix.

### NOTAE.

Si in promptu quidem & expedi- Aegineta  
ta fuerit exulceratio, per dioptrismū  
deprehenditur: at si ex profunditate  
ab excrementis, liquidum namque



excernitur & diuersum: Inflammato quidem vlcere exiguum, sanguinolentum, aut feculentum cum ingenti dolore. Si sordidius fuerit vlcus, & ichores, cum minore negotio atque labore, at si depascendo serpat, teterrimi odoris fluxū emittit atrūque, nec sine doloribus vehementioribus, aliisque quæ inflammationem subesse insinuant indicis est. Diærethrisimus ad chalaistica medicamēta, sed ad contrariacuphisimus. Mundo autem existente humor exiguus, leuis & æqualis, insipidus, crassius, albicans, cum facilitate quadam promanat.

### PER METRANCHY- tum iniicienda.

Aegineta Inflammato quidē vlcere, eis quæ  
superius ad inflammationem con-



ducere docuimus, remediis vtēdū.

Quum sordidum fuerit ptisanæ cremore, adiecto melle, colluendū, siue tetrapharmaco, cum susino, siue mulso in quo elixa sint scenum-græcum, aut malua, aut furfures, aut lens deniq; pelle detracta. Cæterum quo exactius ad viuum, vt aiunt, expurgetur, etiam marrubium, aut eruum, siue mel, admista erui farina, aut iri, aut alumine rotundo, vel non absimile quiddam immitte.

Si noma fuerit cum inflammatione, immittendus succus plantaginis, strychnii, seminalis, fereos, primitus quidem per se, deinde verò cum vino austero, siue aceto.

Noma verò citra inflammationē vrgente, immittenda sunt efficaciora: exempli gratia, decoctum mali corii, rosarum, thaliæ, cupressi, ma-



lorum cotoneorum, rubi, myrtorū,  
 lentisci arboris virgultorū, thu quo  
 vtuntur coriarii, è vino ftipante,  
 postremó verò aluminis quoq; & a-  
 caciæ, lycii, hypocystidisque elixatio,  
 Porrò ex iisdem decoctionibus in-  
 fessus etiam constituatur. Quòd si  
 nichil proficiatur, primò quidem  
 compositionem è charta immitte,  
 deinde verò acetum, aut antheram,  
 aut chalcitam, aut atramentum fu-  
 torium, quæ liquoribus dysentericis  
 quoque congruunt.

In exulcerationes vteri principio  
 immittēda sunt quæ vlcus mundāt  
 & abstergunt, deinde exsiccantia, &  
 demū quæ carnem deperditam re-  
 cuperant deterguntque vlcera locel-  
 lorum, vtile erit hydromeli iniectū  
 cum iridis absinthii & mellis deco-  
 cto, aut agrimonix, vel mel rosaceū



cum hordei decocto.

Quod si vlcus in locellorū profun-  
do infideat, cum putrefactione aut  
corruptione, Acci. vini albi lib.  
℥. aluminis vsti, viridis æris. an. ʒ. ℥.  
macerentur tribus horis ante inie-  
ctionem, in incremento.

Decoctum balauftiorum, fidia, gal-  
larum, aluminis & agrimonie inii-  
ciatur. Si vlcus comitetur venarū  
erosio, Asclepiadis succus concre-  
tus, myrrha, thus, gleba armenia,  
crocus, & aristolochia friantur, & li-  
quore stillatio plantaginis & rosa-  
cea diluta immittantur.

### SARCOTICA IMMIT- tenda.

Acci. lactis vaccini. ʒ. ʒ. thuris, aloes,  
myrrhæ, glebæ armenie, sarcocollæ  
corticis cannæ vsti, cineris cucur-

o iii



bitæ vstæ. an. 3. f. friato terenda, hu-  
 ius semuncia ramenti lacti prædicto  
 immisce, & iniice tepidè quotidie à  
 cubili & ad cubile. Tandem si pus  
 multum defluat, ter aut quater in-  
 terdiu iniice sequentem confe-  
 ctionem, quæ accipit Cerussæ, li-  
 thargyri, sanguinis drac. glebæ ar-  
 meniacæ, lachrymæ arabicæ, an. 3.  
 2. fracta in olei rosacei. 3. 6. & lactis  
 lib. 3. fiat ebullitio ad tertias, cuius  
 colo traiecti 3. 6. iniice in locellos,  
 prædictis addere potes ceræ luteæ.  
 3. 2.

## VNGVENTA.

Acci. Lithargyri, cerussæ, sarco-  
 collæ. an. 3. f. excipiantur sufficienti  
 quantitate rosacei olei & ceræ.

Quòd si vlcus sordidum fuerit, ad-  
 des nonnihil rubiginis æris.  
 Iisdem porrò ipsis extrinsecus quo-



que cataplasmatibus modo vlcera illi-  
nito, quæ in sordido vlcere dicta sũt  
à chirurgis, mulso tufis & macera-  
tis. Mundato vlcere, Acci.tuthiæ  
ablutæ partes duas, cadmiæ argenti,  
farcocollæ.an. partem vnā in pol-  
linem tenuissimum redacta excipe  
in vnguentum addita pauca cera.

## P E S S I.

Peculiaris proximum sordido vl-  
ceri opitulatur medicamentum.  
Crocus optimus leuigatur lacte mu-  
liebri, deinde cerata rosacea exci-  
pitur cū adipe anserino, floccoque  
illinitur. Exquisitius autem fuerit,  
industriūque magis, atque ad in-  
gentes dolores competens illud:  
Capita papaueris in passo diluto ir-  
rigantur per triduum, mox deco-  
quũtur vsque ad subactionem, dein-  
de teruntur foliorū rosarum. 3. quin-

o iiii



que croci. 3. 3. admixta caputum pa-  
paueris elixatione, postea macerās,  
perfundito cū rosaceo, cerāque. 3. 2  
& illiniens rosaceo in pefso subiice.  
Cōfert verò & id quod ex ouis cro-  
cōque, ac rosaceo, adipe anferino,  
medullāque ceruina cōtextitur. Nec  
non Aegyptia sine rubigine ad vteri  
vlcera mirificē cōducit. Noma ve-  
rò vbi fuerit cum inflammatione  
quidem panis tepida maceratus, &  
tritus, ex hydromelite, oleo, althæa,  
foenogræco, palmularūque dacty-  
lis pinguibus cataplasmatibus modo  
illiniendus est.

## EMPLASTRA.

Aegineta Expurgato vlcere foris epigastrio  
atque coxendicibus emplastrū nul-  
lam cicatricem inducens imponen-  
dum. Quemadmodum enim ca-  
taplasmatum, ita & emplastrorum



potentia per abditos & obscuros  
transfertur meatus.

### VENAE SECTIO.

In vlcerum locellorum principio Arab,  
mittatur sanguis ex vena axillari,  
perendie autem ex saphena, iudicio  
oculati medici.

### NUTRICATIVVS.

Alimenti porrò perexiguum mi- Aegineta  
nistrato, expurgato verò iam vlce-  
re, lauare crebrius, alere item, & vi-  
num præbere, quo incarnatio fiat,  
oculis expedit.

### PRAEDICTIONES.

Quanto altius in locellis insiderit  
vlcus, præsertim si vteri substantiæ,  
hæreat, tanto exitius. Si id quod  
ex vlcere profluit spissum est, bono  
est, maximè si tunc leuetur æger.



Virus, & succorum crudorum re-  
 dundans fluxus, sordidi vlceris ac  
 putridi indicio est. Facilius cura-  
 tur in puellis, & ætate florentibus,  
 quàm in senio confectis. Si huius-  
 modi vlcus probè curatum non fue-  
 rit, vt plurimum, in aquas cutem  
 subeuntes definit.

### ABSCESSVS VTE-

ri pituitosus, οἰδῆμα, œde-  
 ma.

### CAVSÆ.

Ægræ victus fuit pituitosus, puta,  
 hesitauit fructus recentes, piscēsque,  
 & reliquos cibos pituitam gignen-  
 tes. &c.

### NOTÆ.

Tumet epigastrium cum ponde-  
 rositate & paucò dolore, temperies



corporis pituitosa est, cum oscitatione assidua & pandiculatione, anni temperies & victus pituitosus, ætas item. &c. accidentium remissio.

### CVRANDIRATIO.

Victus esto qui pituitam extermi-  
net, & arceat. Potiones & pharma-  
ca exhibeantur, quæ pituitam pro-  
fligandi vim habeant. Non utaris  
repellentibus neque refrigeranti-  
bus, quoniam ex ipsis sclerosus red-  
deretur abscessus: sed digerentibus  
incidentibusque, & euacuantibus pi-  
tuitâ, crassosque succos. Emplastra  
calida cōcinentur ex dissoluētibus  
& concoquentibus, disuicientibus-  
que.

### INIICIENDA CVM

metranchyto.

Immitte decoctum fertulæ campa-



næ, chamæmeli, fabinæ, origani, artemisiæ, foenigræci, seminis lini, cui immisce axungiam gallinæ, anatis & coturnicis, oleumque lilinum & nardinum, & iniice.

In primis, hoc est in morbi aggressu. Acci. Lycii, thuris, aloës, cyperei, acaciæ, croci ammoniaci. an. 3. f. quæ omnia brassicæ succo diluta cū paucō aceto iniice.

Si abscessus resoluendus sit, in vigore & inclinatione sequētia iniice.

Aluminis, sulphuris, myrrhæ, salis. an. 3. f. rosacei 3. 3. paucō aceto excepta iniice. Si abscessus maturus sit, neque disrumpatur, seminis lini, & ficuum decocto macera-  
fimum columbinum & fermētum, & iniice.

### EMPLASTRA.

Radices lilii, cepas assas, limacias,



fermentum & semen lini pistello tunde, & axungia butyróque confice emplastrum, quod epigastrio imponatur.

Si in osculo aut colliculo fuerit talis abscessus, manu secetur. Rupto abscessu detergētibus prædictis utere, quibus addes nonnihil succi apii. Demum (vt diximus) sarcotica admouere debes.

## SCIRRHVS ET SCLE-

roma vteri.

Scirrhus durities est vix sentiens. Scirrhū nominamus tumorem durum, qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu. Vel, Scirrhus exquisitus est tumor præternaturam, sensu priuatus durúsque, nõ exquisitus verò non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino

Gal. lib. 2.  
de mor-  
bis curan-  
dis,  
Gal. lib.  
14. de  
morb. cu-  
randis.  
Gal. lib 2  
artis cu-  
ratiuæ ad  
glauco-  
nem.



Gal. lib.  
defi.

sentitur. Vel, Scirrhus tumor corporis cum duritie & grauitate, & mouendi difficultate cum insensibilitate.

## CAUSAE SCIRRHI.

Fit autem ex humore lento & crasso scirrhus insolubiliter induratis partibus infixo: interdum itaque statim à principio congregatur paulatim & augetur, crebrius verò medicorum imperitia paratur, quum vehementer Erysipelata & inflammationes astringunt, & infrigidant.

Gal. art.  
curati, ad  
glauc. lib.  
2.

Si quis igitur medicamenta vehementer dissolutiua induratis corporibus adhibuerit, quæ manifestam faciant scirrhi diminutionem, breui tempore non sperauerit perfectam curationem.

Aegineta

Obdurefcit vterus, quandoq; sanè de repente nulla perspicua occa-



sione, plerumque verò ex inflam-  
matione quæ præcessit, & soluta nō  
est, neque dissipata, neque in ab-  
scessum permutata.

**SCLEROMA** conforme est *Aegincta*  
scirrhus, circa vulvæ cervicem ma-  
gna ex parte consistens, tumorem  
quidem habens eodē pacto, sed mi-  
nùs durum, cum dolore mediocri.

#### NOTAE.

Comitatur autem hæc declinatio *Aegincta*  
ad contraria & opposita, tumor ad  
magnitudinem morbi fortiter, con-  
trarius cum grauedine, & difficili  
motu, non crurum modo, sed vni-  
versi corporis, desidiæque ad exe-  
quenda opera. Accidit enim non  
rectè tractatis, malus corporis habi-  
tus aquosus.

#### VENAE SECTIO.

Principio igitur in huiusmodi cu- *Aegincta*



ratione sanguis secta vena anferen-  
dus est.

## HVMORIS NOXII

subductio.

*Aegineta* Eligenda purgatio cum Archige-  
nis hiera, si verò corpori robur nō  
desit, etiā helleborismus probatur.

## CATA PLASMA TA, MA- lagmata & emplastra.

Si quis medicamenta vehementer  
dissolutiua induratis corporibus ad-  
hibuerit, quæ manifestam faciant  
scirrhi diminutionem, breui tempo-  
re non sperauerit perfectam curatio-  
nem. Nam verè ignora quòd resi-  
duū passionis hoc curationis modo  
incurabile redditur, tenuiori enim  
ex eo dissoluto humore, residuum  
exficcatū lapidis duritiem assequi-



tur. Non igitur curandæ sunt partes induratæ medicamento immodicè ficcante, sed cum eo quod calorem habeat tepidum, humiditatem verò, nec multam, nec omnino minimam. Quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissolvit: quod verò minimum, plusquam oportet exsiccat. Oportet autem induratū corpus à medicamēto quod auxilio futurum sit, simile quid pati his quæ sub sole funduntur. Vocantur autem mollificantia huiusmodi medicamenta, de quibus amplius diximus in quinto tractatu libri, quod de simplicium medicamentorum viribus inscribitur. Exempla quoque (ut dictum est) ex simplicibus sunt omnes medullæ atque adipēs, ex medullis primas partes obtinet ceruina, deinde vitulina, ex adipibus au-



tem adeps anseris in volucrum genere, leonis verò in pedestrium cæteris præstat: at vero qui ex gallina sumitur, anserinum, & qui ex par-do, leoninum sequitur, ac deinde vrsinum atque taurinum: at qui ex capris accipitur & crassior & sicci-or prædictis est, idq; magis si ab hir-co accipiatur, Hæc Galenus in. 2. lib. artis curatiuæ ad glauconem. Vide ibi historiam curæ Cercilii pueri.

Aegineta Cataplasmata ex ficibus aridis, hyssopo, nitro & absinthio, Malag-matha nempe polyarchion, & dia-spermaton & diadaphnidon.

Ceratum quod sequitur epigastrio, aut loco tumenti, modo non adfit cancer, imponatur.

Acci. maceratum ficuum immatu-rarum coctarum. 3. i. f. adipis suillæ,



æfopi vdi. an. ʒ. i. picis naualis, ceræ  
luteæ. an. ʒ. i. o. olei liliacei. ʒ. f. diachy  
lon. ʒ. 2. liquantur simul, quibus ad-  
de rad. iridis friatæ. ʒ. tres, cinerum  
corticis falicis. ʒ. 2. concinna cero-  
tum, quod extensum panno bombi-  
cino, aut corio imponatur.

## VNGVENTA.

Locus durus hoc iungatur vn-  
guine. Acci. olei chamæmelini. ʒ.  
tres, olei spicati. ʒ. i. f. medullæ cru-  
rium vituli. ʒ. i. ceræ quātum fit fa-  
tis, adde rad. iridis iussæ. ʒ. i. Vel,  
℞. Olei liliacei, olei sambucini,  
adipis cuniculi & corurnicis, me-  
dullæ coxarum vaccæ & cerui, olei  
amygdal, dulcium, butyri. an. ʒ. i. cō-  
ficiatur vnguentum, quo internæ  
& externæ locellorum partes inun-  
gantur.



DE MORB. MVL.

## CUCURBITULA.

Cucurbitula imponatur post purgationem cum scarificatione.

### INSESSVS.

Aegineta Enchathismata facta ex elexatione ficuum ischadum, artemisiae, pullegii & althææ utilia sunt.

Vel, Acci. chamæmeli, fertulæ cāpanæ. an. m. i. f. althææ cum rad. m. 4. fœnigræci, seminis lini. an. lib. i. terantur & coquantur, decocto insideat ægra.

## CVM METRANCHY-

to immittenda.

Decoctum fœnigræci, seminis lini, cum oleo anethino & fabucino, & chamæmelino & lilino, ini-



ce in locellos. Vel, Acci.olei li-  
liacei, olei chamæmeli. an. 3. 2. adi-  
pis anatis, medullæ cruris vituli aut  
cerui. 3. 2. bdellii in vino liquati. 3. 3.  
luteum oui affati, quibus adde pos-  
cam quantum sit satis, iniice. 3. 6. te-  
pidè. Vel, R̄. Thuris ammo-  
niaci. an. 3. 1. mastiches, castorii, sta-  
ctes, adipis anatis, olei chamæme-  
lini. an. 3. 2. gummi melle soluantur  
& poscâ, & omnia liquata & tusa  
iniiciantur.

## PESSI.

Pessuli componantur è resina te-  
rebinthina, galbano, myrrha, iri,  
hyssopo, dropace.

Pessulus vim habens molliendi.  
Accipe ceræ ponticæ, vnguenti nar-  
dini. an. 3. 3. irini, gleucini, cyprini,  
singulorum. 3. 2. adipis agnini, & an-



Aegineta

ferini, butyri, hyssopi, medullæ ceruinae, resinæ terebinthine. an. ʒ. 3. confice pessulos. Vel. R. po-

lii. 3. 2. myrrhæ. 3. 4. cum vino mendefio conterens, irinóque immergens ad subiiciendum exhibe.

Vel, Cerae tyrrhenæ, adipis vitulini, resinæ terebinthinæ, medullæ ceruinae, mellis attici, olei veteris, æquis portionibus cum syncritico.

Sequens pessus utilis est & ad tumores. R. Vuæ passæ candidæ demptis acinis. ʒ. 3. foliorum rutæ viridis. ʒ. 2. aquæ marinæ. ʒ. 1. f. cymini. ʒ. 4. mellis quantum satis est, illiniens autem pessum immerge oleo cyprino, atque subiice.

Cæterum aureus pessulus atque libanius, necnon enneapharmacum accommodata sunt huic effectiōi: verum peculiarius, qui ē calce sic



titianus.

## CANCER VTERI.

Aegineta

Ex canceribus que in mulierum locellis oboriuntur, partim quidem cum exulceratione, partim verò sine vlcere proueniunt.

## CAVSÆ.

Ab atra bile oritur cancer. Etiam ex scirrho gignitur.

Gal. lib. de morborū differentiis.

## NOTÆ.

Quocirca quæ citra exulcerationem emergunt, in his utique tumor, circa hysterae ostium durus, varius, tumens, colore feculentus, rubicundulusque deprehenditur, interdum verò etiam subliuidus & pergravi dolore tentantur secundum inguina, quæ græci bubonas appellant, & epigastrium, summenque & lumbos: stomachantur.

Aegineta



que & exacerbatur manuum attritionibus, & vario magis medicamento. At si cum ulcere cancer est, præter dolores & duritias, tumoresque, exesa ac aspera speculantur ulcera, magna quidem ex parte sordida, ponderosa & albicantia: quòd si labores humore concreto turgidos habeant, & quæ oculis usurpantur, pura, feculenta, lurida, rubentia & cruenta apparent, continuè inde ichor tenuis, aquosus, ater, aut pus tetri graueolentisque odoris excernitur: nonnumquam verò etiam sanguis profluit, cæteraque indicia quæ in sermone de utero inflammato enumerata sunt.

## PRAEDICATIONES.

Hic sanè morbus immedicabilis  
 Aegineta est, ceu alibi ipse quoque asserit  
Hippocrates.



Cancros occultos omnes melius  
est nō curare : curati enim citò pe- 6,aph.36  
reunt, non curati verò longius per-  
durant. Galenus in glessemate in-  
quit: Occultos cancos dixit, vel e-  
os qui sunt sine vlceratione, vel ab-  
sconditos, hoc est, non apparentes,  
quod rursus idem significat ac si di-  
ceretur, qui in profundo corporis  
sunt. Sed & curare duplex est.

Vnum quidem omnia agere, vt  
particula patiens ad salutem perdu-  
catur. Alterum autem eam adhibe-  
re prouidentiam quæ passioni con-  
gruat, hoc est ipsam mollire ac mi-  
tiores facere, & tum præcipuè, quā  
adest exulceratio.

Tunc enim est necessarium, vt si  
non aliud agamus, saltem saniem  
abluamus, humido aliquo vtentes,  
non quocunque, sed vel per expe-



rientiam, vel per indicationem in-  
 uento, quod neque putrefacere, ne-  
 que irritare partem patiētem, sit na-  
 tura aptum. Ab hac igitur curatio-  
 ne, neque abfistere conuenit, neque  
 illi qui sunt sine vlceratione cancri  
 indigent ea: aliam verò que fit per  
 sectionem, vel vstionem (quæ sola  
 sunt remedia cancrorum) consulit  
 vt in cancris occultis non adhibea-  
 mus. Quòd igitur illi qui sunt in  
 partibus penitioribus talia remedia  
 non desiderant, etiam expetientia  
 docet. Equidem scio omnes qui hu-  
 iusmodi cancos curare tentarunt,  
 magis illos irritasse, & breui homi-  
 nes interemisse. Nam & qui can-  
 crum in palato constitutum, & in  
 sede, & in sinu abscondito mulie-  
 bri, vel vsserunt, vel secuerunt,  
 non potuerūt vlcera ad cicatricem



perducere, & homines in cura afflic-  
tos ac maceratos vsque ad mor-  
tem colliquarunt, quæ si nullam cu-  
rationem adhibuissent, longiori tē-  
poræ vitam cum minori molestia  
transegissent. Tales igitur cancos  
nullomodo curare tentemus. Ex  
eis verò qui in summa parte corpo-  
ris hærent, illos tantummodo quos  
possumus vnâ cum radicibus ipsis,  
vt quispiam dixerit, resecare.

Neque enim malum est, veluti  
radices quasdam cancri, nominare  
eas quæ plenæ sunt sanguine melan-  
cholico venas, & vsque ad loca cir-  
cunstancia distenduntur.

Multi enim magnæ autoritatis.  
Medici, neque hos manus opera  
curari permittunt, sed illos tantum  
qui exulcerati, simulque laboran-  
tes molestant, adeo vt ipsi vltro ma-



nu curari defiderent, & simul sunt in talibus, partibus fiti, quas possumus vnà cum radicibus refecare & exurere. Quidam neque hos amoliri permittunt, sed omnino abstinendum consuluit à remediis potentibus in omni natura cancri.

Quòd verò Hippocrates nunquam consuluisset curare potenter cancros in partibus corporis penitioribus conditos, ex ipsa passionis natura licet coniectari, sed & eos qui in summa parte corporis hæret absque vlcere incertum est, quātum ex verbis aphorismi coniici potest.

Ipsū scripserunt Artemidori & Dioscoridis sectatores, vsque ad ea verba: Non curare melius est.

VICTVS.



Alimenta porrò ritè benèque dis-  
posita, & inculpati succi, sunt exhi-  
benda: verbi causa, paucissimum a-  
quosum, fugientes acriores cibos  
omnes, & cibi satietatem, promptis-  
simè namque ipsis cibaria corrup-  
puntur. Quæ item bilem atram  
gignunt fugienda sunt. Potiones  
purgationesque propinentur, qui-  
bus atra bilis profligari arcerique  
possit. Smaragdus, saphyrusque si  
potentur iuuabunt. Gamari si he-  
sitantur proderunt.

Aegineta

## SANGVINIS MISSIO

c' vena.

Vtile erit venam humeralem  
aut saluatellam incidere.

## ENCATHISMA.

Placandus est ipsarum mulierum Aegineta



dolor infessibus quidem ex fœno:  
græco maluâque paratis, atque id  
genus cataplasmatibus.

## POTVS.

Theriaca ex vino albo potui de-  
tur, Pastilli item ex viperis.

CATA PLASMATA ET  
cerata.

Aegineta

Cæterum valde consolantur in  
exacerbationibus, malua, aut althæa  
in mulso subacta, colliquatâque cū  
paucorofaceo, & instar cataplasma-  
tis adglutinata: nec non compōi ex  
ficibus aridis, & fertulis campanis,  
ruta, thure, napique herba accuratē  
cum oleo contusa. Lenit item cata-  
plasma ex palmularū dactylis in pas-  
so decoctis, adiectis ouorum puta-  
minibus, atque farina, aut ex papa-  
uere cum coriano, aut feminali, aut  
sereos. Hæc quidem in ipso: crucia-



tus tempore. Post hæc verò abster-  
gatur cerotâ ex rosaceo, aut myrti-  
no, aut ananthino, aut melino cum  
palmulis in passio elixis. Peculiariter  
verò hinc negotio quadrat cata-  
plasma ex fece officinarum fabriliû,  
que assata leuigatur, cerotâque ro-  
sacea excipitur, tantisperdum cras-  
situdinem emplastro ideoneam in-  
duat. Hæc quidem extrinsecus ad-  
hibentur.

## VNGVENTA.

Rx. succi granorum solani vessicarii  
(quod allzelzenge vocant). ʒ. 4. olei  
rosacei. ʒ. 8. ceræ citrinæ. ʒ. 6. liquen-  
tur vna in mortario plumbeo addē-  
do friamento sequentiû pharmaco-  
rum. Rx. cerussæ lotæ. ʒ. 2. plumbi v-  
sti & loti, tuthiæ præparata. an. ʒ. 1. f.  
thur. ʒ. ʒ. f. aris vsti, atimonii, balauft.  
rad. chelidonii, sagui. drac. cadmiæ,



argenti, pulueris vermium terrestri-  
um, an. 3. 2. ita tondetur in mortario  
quoad vnguinis spissitudinem in-  
duerint, quo inunge cancri locum  
internum. Vel, Rx. lithargyri &  
cerussæ partes æquas rosaceo in  
mortario tam diu tonde quoad vn-  
gueti formam suscepit, quibus in-  
unge partes cancri proximas, aut  
ipsummet cancrum. Ex dictis vn-  
guentis potes conficere iniectiones,  
quas per metranchytum iniicies.

Ex lithargyro, oleo rosaceo & ace-  
to confice vnguentum, pro cancro  
vicerato.

INTRINSECVS PER  
metranchytum adhibenda.

Aegineta Interius verò mitigat locos ole-  
um: Vbi autem exulcerati reddun-  
tur, lac quoque muliebri infusum,  
tepidusque plantaginis cremor. Si



sanguine conspergantur, succus seminalis herbæ cū pauco thure, comulcet. Omnium verò efficacissimè operatur, & aduersus etiam sedis affectiones illud, quod Accipit spumæ argenti italice lotæ. ʒ. 6. thuris masculi hyssopi, adipis porcelli nouitii, butyri recentis, ceræ thyrranicæ, singulorum. ʒ. 2. rosacei. ʒ. 4. spumam argenti contritā, in cremore fereos liquefactis reliquis iniice

Vt non vlceretur cancer, & si vlceratus fuerit, ne vicinas depascatur partes. R̄ succi solani purioris limpidiorisque, aut ipsius liquoris stillatitii. ʒ. 6. tuthiæ præparatæ, plumbi vsti, an. ʒ. 1. caphuræ. ʒ. 1. moueātur cum pistello in mortario diutissimè, & iniiciatur in locellos.

Ad vlceratum cancrum exper-



tissimū. R. Herbae roberti, stommi,  
 scabiosae, capuifolii, anethi oletu-  
 li humani, æquas partes, vrantur,  
 quorum cineris. ʒ. ʒ. excipiantur. ʒ. 6.  
 liquoris stillatitii solani, & ducan-  
 tur pistello in mortario & iniician-  
 tur,



# Rhagades,

## CONDILOMATA

& hæmorrhoides  
vulvæ.

Circa fæminarum naturalium  
ostiũ, rimæ (quas græci *παρυαδᾶς*  
vocant) proueniunt, aut scissuræ.

Condylomata, tubercula sunt ex  
inflammatione nascentia. Vel, sunt  
rimæ inueteratæ in callum transen-  
tes.

Gal. lib.  
definit.  
Aegineta

Hæmorrhoids est enervatio vaso-  
rum quæ sedem ambiunt, aut prote-  
gunt.

Gal. lib.  
definit.

## CAUSAE.

Rhagades quandoque ex labo-  
rii

Aegineta



rioso partu & violento proueniunt.

## NOTAE

**Aegineta** Rhagades primū quidem recentibus etiam dum ex puerperio doloribus delitescentes fallunt, postea verò paulatim sensu precipiuntur, nonnunquā manu etiam admodum deprehenduntur, interdum verò & in congressu venereo, dum ex attrito polluantur cruore, arguuntur. Præterea & sinus indicantur stillicidio, rupturæ namque in corona ostii speculantur. **Aegineta** Hemorrhoides præterea in mulierum naturalium ostio siue ceruice exurgunt: quæ quidem partibus dioptrismo tentatis, ex eo deprehenduntur, quia in paroxysmis quidem sanguinolentum, subrubrum, dolorificum quiddam eximie apparet. In relaxationibus



verò fluxus dolore vacans subliui-  
dus & strangulosus.

## PESSI ET EPITHE-

mata..

In rhagadis sanò chirurgia, & ero- Aegineta  
dendi mordēdique virtute prædita  
medicamina abhorrēda: mitioribus  
verò & simplicibus epithematis at-  
que pellis vtendū, seraccōmodatum  
porrò habetur eisdem scissionibus  
tetrapharmacū dissolutum, quòd si  
calloſſis labris fuerint rimæ, com-  
positione ex charta, cū roſaceo vtē-  
dum. Quum autem vehementiam  
eius laborans non tollerat, irim illy-  
ricam resina terebinthina excipiens  
imponito. Vlcusculis verò pereun-  
tibus euanescentibúſque, magno  
cum emolumento adhibetur me-  
dicamentum ē cadmia, aut eorum

q iii



aliquid, quod ad sedis affectus placandos & persanandos est compositum, & ob id hedicum appellatum cuiusmodi est ea, quæ ex spuma argenti contextitur confectio.

**Aegineta** Postquam autem eiusmodi diuisiones inueteratæ in callum (quem condylomata dicunt) transeunt, consimilibus atque eiusdem planè facultatis medicaminibus uti expedit. Callus emollientibus quidem discutendus, & in cicatricem redigenda sunt condylomata.

**Aegeneta** Hemorrhoidibus quibus igitur opus est, siquidem fieri potest, in remissione exactione utitor, Mydio apprehendens: sin verò minus, cum medicamentis ipsas constringito: nunc quidem aridis malicoriis, adiecta galla, aut quopiam eiusmodi applicatis: nunc verò his que in san



guinis vteri profluuiō posita sunt  
adhibitis, quæque diarrhis, & sangui-  
nis fluxum patientibus congruunt  
deprehensis continua vuluæ ex in-  
teruallis cruentatione: neque id quī  
dem in menstrui expurgationis tē-  
pore solum, sed aliās etiam iugiter.

**MVLIBRIVM CLAV-**  
sura locorum, *φιμονφιμον.*

Fit angusta quædam interdum  
circa muliebrium locorum os præ-  
clusio, quam *Aegineta* appellant.

**CAVSÆ.**

Id fit aut propter exulcerationem  
quæ præcessit, aut duratam inflam-  
mationem. *Aegineta*

**INSESSVS, ET CA-**  
taplasmata.

Medendum igitur est encathili-  
*Aegineta*

q̄ iiii



matīs mollificātibꝫ, quæ constitu-  
untur ex hydræleo & fœnigræci eli-  
xatione. Cataplasmata consimi-  
liter sunt applicanda.

## PESSI.

**Aegineta** Pessī item qui emolliendi vim  
habent adhibendi. Discutit præte-  
rea eiusmodi nexum etiam pessulus  
ex hyssopo, mintro, resinæque tere-  
binthina contextus, si nihil aliud  
quàm clausura ostii vulvæ coarctetur.

## SUFFITVS

**Aegineta** Quòd si inueterauerit id malum,  
suffimētis vaporibꝫque aromatum  
vtendum.

## FOTVS ET LOTIO-

nes.

**Aegineta** Conniuentes porrò & clausas  
mulierum vulvas aperire conuenit,  
fragrātibus lauando & fouendo cō-



fectionibus ex. malua & semine lini, fœnigræci, & oleo, interdum etiā melle. Vehementioribus item artemisia, videlicet, monyza & nepita, & pulegio, & anthemide (quam chamomilam vulgò vocant) ad hæc resina quoque terebinthina, nitro, cucumere syluestri, Elaterio, cassia, horopissa.

## HIATVS OSTII

vteri.

Quibus ostium vteri hiat, his diætæ quidem, & fœtus, & medicamenta aridiora, & constringentia, cytini malorum punicorum, & rotundus iuncus odoratus, & rubi radices, & myrtha, & breuiter quæcumque in humidioribus vulua expediunt, accommodatissima censentur. Ad vuluam adstringendam. ℞. rad. symphiti,



aluminis, balaust, myrrhæ, liba, mā  
 stiches, colophoniæ, glebæ armenia  
 cæ galbulorum cypressi, cornu cer-  
 ui. vsti. an. quantum volueris, in pol-  
 linem tenuissimum friato, potui de-  
 tur ex vino adstringente. 3. 2. ex re-  
 liquo decocto astringente misto ca-  
 lide foveatur locelli. Vel, ex di-  
 ctorum decocto fiat epithema.  
 Vel si mauis lana aut coto excipere  
 confice pessos, qui ad cubile indan-  
 tur. Foveantur etiam locelli de-  
 cocto ex vino & aceto mastiches, la-  
 chrimi arabici, pilularum cypressi,  
 gallarum, aluminis saccharini. an. 3.  
 1. Vel confice pessos aut suffitus.  
 &c. Aluminis myrrhæ, agallochi, pi-  
 lorum leporis tenuissime incinso-  
 rum, rutæ, baccarum lauri, doronici,  
 pilularum cypressa. an. 3. 6. styracis.  
 3. 2. ambaris. 3. 1. moschi. 3. 6. friato, &



oleo myrtino excipe in pesos vel  
frangito & cum infundibulo vterus  
suffiatur.

## CONTORTIONES

peruersionesque vuluarum.

Fometationibus, quas pyrias di-  
cunt dirigito & corrigito, & quæ  
vim habent emolliendi cathetis.

## STERILITAS.

Causæ.

Causa sterilitatis duplex, vna à Gal. lib.  
viro, altera, à fæmina prodit. Ab defi.  
hac, vel propter humiditatem nimi-  
am, aut pinguedinem vuluæ: A ma-  
ri autem quando ipse est spado fa-  
ctus & testiculis caret, vel alio quo-  
uis pacto ægritudine detentus.

Quæcunque frigidos & spissos

Hippe. 5  
aph. 63.



uteri habent non concipiunt. Et quaecumque præhumidos uteros habent, non concipiunt: extinguatur enim in eis genitura. Et quaecumque siccos magis & adurentes: nam ex defectu alimenti corrumpitur semen. Quaecumque verò ex utrisque mediam habent temperaturam, hæc fecundæ sunt.

Bene temperati uteri ad conceptionem sunt idonei, malè autem temperati, si parùm à bonitate recedunt, difficulter concipiunt: Si verò nimium, mulieres steriles fiunt, ita quòd simul datur intelligi unde viri sint steriles, sed hoc multos latet. Qui verò ea quæ dicta sunt diligentius considerat, primùm quidem sciet quã ob causam, & quidam viri omnino steriles sunt. Secundo loco post hoc de viris quidem, ac mulieribus



bonam habentibus temperaturam, quòd semper generabunt, etiam si cum malam habentibus coëant. De habentibus autem malam temperaturam, quòd cum solis his qui contrariam babent coëunt, gignent. Priùs autem dicetur de mulieribus sterilibus, quarum; vterus statim ab initio est malè temperatus, exuperante scilicet vel vna duarum qualitatum, vel duabus, quēadmodum in cōmentariis de temperaturis determinauimus. Vbi igitur frigiditas immodica exuberat, adeò quòd vterus spissior efficiatur, angusta quidem sunt supramodū ora vasorum quæ ad ipsum pertingunt, mulieres verò steriles, quum secūdæ non possint adnasci ad ora vasorum, neque si hoc fiat aliquando possit bene nutrirī conceptus: vel enim nullo mo-



do fiunt hisce mulieribus purgationes, vel omnino paucae, & hæ ipsæ vitiosæ, solo tenuiore atq; aquosiore sanguine perlabente. Sed & hæ quoque ora facile obstruuntur, & propter nativam angustiam, & quoniam magna ex parte hæ mulieres humorem aggregant pituitosum, siquidē & corpus totum ut plurimum est uteris simile. Contingit & maris semen in talibus uteris refrigerari, nisi sit natura calidissimum. De prima itaque frigida temperatura Hippocrates fecit mentionem, inquiēs. Quæcumque frigidos & spissos uteros habent, Non per iouem volens simul coniungere in ipsis cum frigiditate densitatem, veluti si succitatem aut humiditatem addidisset. Harum enim neutra semper consequitur frigiditatem, & præterea ipsi,



modo vnâ, modo altera adiungitur. Densitas verò ex necessitate valde frigidos vteros comitatur, ob quam causâ possunt cōcipere, vt diximus, quare ita sermonem totum huius aphorismi audiemus. Quæcūque frigidos vteros habent non concipiēt, propter substantiæ ipsorum spissitudinem: Cur verò spissitudo aduersetur conceptioni, dicere prætermisit, vt nobis potentibus intelligere, Et quæcumque vteros nimis humidus habent non concipient: extinguatur enim genitura, quemadmodum in terra palustri cerealibus semina: Et quæcumque ficos siue adurantes habent vteros, propter defectum alimenti non concipient: nam in ficcis vteris tale quid accidit, quale vbi aut harenæ, aut argillose terre, aut petrosæ mandantur semi-



na. In habentibus autem immodicā  
caliditatem, quale vbi valde calidæ  
terræ semina committūtur, quem-  
admodum in æstibus sub cane con-  
tingit, sic quidem quatuor qualita-  
tum Hippocrates meminit singula-  
rum seorsum facultatem exponens,  
vt si quando inuicem misceantur  
manifesta sit earum commistio.  
Post hæc autem inquit: Quæcum-  
que verò ex vtrisque modicè tem-  
peratæ sunt, fœcunditatem habent,  
ex vtrisque autē non qualitatibus  
scilicet (sunt enim quatuor) sed quæ  
sunt secūdum ipsas oppositionibus.  
Vna quidem est bona temperatura  
mistis modicè inuicem calido ac  
frigido, Altera verò humido ac sic-  
co: & fieri potest, vt sit aliquis vterus  
secundum vnā quidem oppositio-  
nem bene temperatus, secundum



alteram male. Sed ne mulier concipiat, potest altera efficere temperatura. Mulierem verò esse fecundam sine ambabus bonis temperaturis est impossibile. Hippocrates quidem, sicuti totum sermonem anteriorem de muliebribus scripsit, sic & nuper dictum de his quas habet uteri temperaturis, non tamen etiam addidit de viris sermonem, vel quia promptum nobis sit ex his quæ dicta sunt, easdem intemperaturas ad semen transferre, vel quia distulit ad sequentia, sed postea oblitus est. Licet nobis ad viros transcendentibus dicere, quòd propter temperaturæ frigiditatem non bene semen cōcoquitur, atque, ideo si mediocris quidem sit intemperatura, in ipso indiget utero calido sufficienter. Si verò immodica sit, est om-



nino sterile, vel propter humiditatem, rursus neque concoquitur, & hoc etiam indiget si modica sit in temperatura, vtero calidiori, ac sicciori: si verò immodica sterile est, eodem modo & propter excedentem calorem semen fitusto simile. Ob siccitatem verò ubi primum excidit neque extendi potest, quod maxime fit necessarium si mulier debeat concipere. Ostensum est enim in sermone de semine quòd nisi per uteri capacitatem parte plurima semen extendatur, mulierem non concipere

Leonar-  
thus.  
Fuchf,

Sterilitas aut viri, aut mulieris ratione accidit. A viro est, quum semen eius vel feruidum & veluti torrefactum, vel frigidum, tenue, aquosum, languidum, quale decrepitorum est, vel crassius quàm oportet,



emittitur: vel quòd viri semispado-  
nes sint, penémque breuissimum ha-  
beant, vt in vuluæ recessum semen  
iaculari nequeant. Quod etiam in-  
terdum nimia obæsitate contingit,  
obæsi enim tam ventricosi euadēt,  
vt semen ad profundiores vteri par-  
tes iaculari non possint. Mulier  
verò sua ipsius ratione non conci-  
pit, quòd vterum habeat vel calidū  
& igneum, vel frigidum & humi-  
dum, vel squallentem & aridum.  
Hippoc. quæcumque frig. &c. Cæte-  
rum crassæ admodū & obæsæ haud  
concupiunt. Hipp. Quæcumque præ-  
ter naturam non concipiunt vtero,  
iis omentum os vteri comprimit,  
& priusquā extenuentur non conci-  
piunt. Graciles denique & macilē-  
tæ non concipiunt, aut si cōcupiunt,  
abortiunt, eodem Hipp. teste. Quæ-

5. Aph.  
46,



S. Aph,  
44.

cumque præter naturam tenues existentes utero gerunt, abortiunt priusquam crassescant. Quædam etiam non concipiunt, eo quod uterus earum debilis est, vel angustus, vel brevis, aut quod vasa eius obstructa clausaque sint, aut cicatricis superuentu excœcata, aut que uteri cervix in obliquum ducatur, aut quod os eius vel nimis angustum vel nimis amplum sit.

Causæ internæ sterilitatis sunt, aut testium vitio, aut colicis, aut alicuius membri organici, ut oris ventriculi, renum iocinoris. &c. Testium vitio fit, quum peculiari eorum calore semen vritur, vel ita in testibus concretum est, quod ineptum prorsus generationi redditur. Testium item abscessus, vel simile quippiam sterilitatem gignit, vlcus etiam factum in calculi renum aut vesicæ extra-



Etione, colis item longitudo, aut bre-  
uitas, foraminis obliquitas, penis  
molliet, cōuulsiōve aut vlcus. &c.

Venarum post aures incisio, Aetas  
etiam sterilitatis est causa: nam (au-  
thore Aristotele lib. 4. de partibus  
animalium) viri post. 7. annos nul-  
lum genitale semen generationi ap-  
tum emittunt. Mulieres post quin-  
quagesimum annum steriles omni-  
no sunt, quanquam & viris & mu-  
lieribus (vt vidimus) aliquando con-  
trarium accadat. Hermaphroditæ  
non vtero gerentes efficiuntur.

Causæ externæ viris mulieribús-  
que communes sunt. Aër plusquam  
par sit aut calidus aut frigidus, exer-  
citium, quies, somnus, vigilia, animi  
accidentia, mœror, gaudium, coitus  
superfluus, innanitio, repletio, aquæ  
frigida potus non consuetus, frigi-



dorum aut calidorum vsus nimius,  
ebrietas.

Quædam peculiari temperatura  
sterilitatem causant, aut gestata, aut  
ore sumpta, verbi causa, Caphura,  
squama ferri, vermes noctu lucen-  
tes. Testium item illinitiones ex  
validè refrigerantibus, vti hyoscy-  
amo, opio. &c. Alicuius etiam a-  
nus aut præstigiatrix forte. A-  
more coniugum vehementissimo sæ-  
penumero impeditur conceptio.

## NOTAE.

Signa quibus diuersitas causarū  
discernitur, hæc sunt.

Fuchs,

Calidius siquidem tēperamentum  
viri facile deprehēditur ex pilorum  
copia, potissimum verò nigrorū in  
partibus genitalibus, & omnibus  
quæ circūstāt, suprà quidem vsque



ad media fœmora . Petulca etiam  
est hæc temperatura , & ad libidinē  
prona: statinverò satiatur. Vteri cali-  
ditas ex reliqui corporis caliditate  
cognoscitur, quódque pauca men-  
strua, & cum dolore deferuntur, vt  
genitalia interdum mulieris exulce-  
rentur, sed & quæ educuntur, nigrio-  
ra sunt. Hanc etiam temperaturam  
in signis salacitas, & totius corporis  
siccitas sequitur. Tactu calor de-  
prehēditur, & in seminis emissionē,  
calidū sentit mulier. Testium tem-  
peratura calida coitum summē desi-  
derat, futuere incipit ab adolescētia,  
vel saltem venere stimulatur.

Fuchsius  
Ex Aegi.

Frigidius tēperamētū mōstrāt par-  
tes circūpositæ testibus glabræ. Ne-  
que etiam hoc temperamēto prædi-  
ti ad libidinem proni sunt. Viri fri-



Arab. Frigiditatem arguunt, semen genitale frigidum sentitur, tardéque exit pauca cum voluptate, nulla futuitionis appetentia, in mulierum cætu robore suffunditur, arteriarum motus tardus, lotium colore remissum, coles vix tumet aut erigitur.

Aegineta Frigidiores igitur uteros propriè arguit mensium retentio, victus ratio gelidioris potentia, & crassi succi, quoniam stuporem inducit cum circa fumen seu pectinem, tū lumbos, tum etiam crura. At quædam sunt ad summum perfrigeratæ, neque in venerem admodum proclives feruntur, neque appetunt.

Fach. Humiditatis verò vitio fœcunditatē frustrari indicat, si in coitu humore admodū perfundatur, & si iis fuerint tenuia copiosaque menstrua,

Arab.



pili molles, venus sopita, quæ si conceperint in incremento fetus abortum patiuntur.

Siccitas uteri cōtrariis planè deprehenditur notis, paucus etenim mēsum fluxus, os siccum, labra scissa, coitum appetunt uti sicca terra rore, facile irascitur, corpore tenuis est in actu venereo ferè nihil seminis emittit.

Fœminis fatiffacere non possunt viri, qui natura timidi actus exercēt muliebres, vocēque fœminas referunt, pudenda pilis nudata sunt, barba exiles paucissimósque alit pilos, huiusmodi quum gelidam testium habeant temperaturam nūquam generationi inseruient. Is etiā sterilis censendus est qui futuit cum pluribus mulieribus aut puellis,



Nullus tamen ex eorum futuitione  
ortus est foetus, Mulier item sterilis  
dicenda est, cuius crassa vox est, pi-  
lique multi, & duri rigidique pubē  
obsepiunt, mystacem mentumque  
barba circūdat, quæ etiam plurimo-  
rum virorum amplexus experta est,  
nec vtero gessit.

Locellorum vitio sobole priua-  
tur, si callus, aut carnis excreſcētia,  
aut tuberculum, aut acrochordon,  
aut pinguitudo nimia, aut resolutio,  
aut cōuulsio, aut vlcus, aut aliquid  
id genus vtero insideat.

Quibus os vteri hiat, aut claudi-  
tur plus quàm par sit, aut meatus fe-  
minarii in obliquum tendunt (nam  
talia visu tactūve deprehendes) steri-  
les aut difficulter gignentes efficiū-  
tu. Suppressione mensiū si id mali  
acciderit, mulieris quærimoniā nos



ces. Si sortilegio contigerit, cacodæmonū famulis has remitte, vel quod sanctius iustiūſque eſt chriſtum inuoca ac precare nodum hunc vt ſoluat. Plato inquit hoc eſſe maximū opus obſtetricum ſcire coniungere inuicē corpora apta ad cōceptionē, & ſimul poſſe diſcernere, qui viri ſint inſœcūdi, & quæ mulieres ſteriles, immodicæ nā intēperaturæ horū ſunt cauſæ. Modicæ verò ſi ſunt, & cōtrariis cōiūgūtur, tūc cōcipiēt mulieres: ſi verò ſimilibus, non concipient. Neque enim fieri poteſt, vt frigidum ſemen in vtero frigidiore ſit fertile, neque ſuccum in ſiccio- re, & aliorum vtrūque eodem modo, ſed indiget ſemē quidem frigidius, vtero tanto calidiore, quanto deficit ab optima tēperatura, & humidius ſiccio- re, & in aliis eodē modo. Co-

Gal. in  
gloſſema  
te. 5. aph.  
62.  
Pronuba  
barū of-  
ficium.



gnitio autem omnium immodica-  
 rû vteri intemperaturarum est, quā  
 paulò atea dixit Hippocrates in suf-  
 fitu, qui per aromata fit, frigiditas e-  
 nim spissitudinis raione nō permit-  
 tit vsque ad os & nares ferri aroma-  
 tum exhalationem: eodem modo &  
 siccitas. Humiditas verò sicuti ab ip-  
 so dicta est extinguere geniturā, sic  
 & aromatū qualitātē: reliqua est ve-  
 hemens caliditas, siquidē ea ratione  
 quod vincit aromatum facultatem,  
 alterat atque corrumpit, ac propte-  
 rea nō permittit ipsa seruātia sui na-  
 turam sincerā circa os & nares re-  
 ferri. De hisce autem naturis ex suf-  
 fitu aromatū sufficiens cognitio præ-  
 stabitur si verò non potest hæc suffi-  
 ciēter haberi, ex aliis indiciis nobis  
 erit talis natura inuestigāda, hoc ip-  
 sū cognoscētibus, quòd rara admo-



dum est huiusmodi temperatu-  
ra in mulieribus. Siquidem foemina  
est mare frigidior, unde ob hoc ea  
quam facit Hippocrates ex aroma-  
tū suffitu dignotio in sterilibus mu-  
lieribus vtilissima est, vel quia om-  
nis immodica intemperatura isti  
subiicitur, vel quia rarissimè vna ip-  
sam subterfugit in mulieribus illis  
quæ tenues apparēt, & nigræ & hir-  
tæ, ita quod ex his signis percipitur  
earum immodica intemperatura si-  
ne suffitu aromatum.

## PRAEDICATIONES.

Neque crassi pinguēsque prog-  
nendis pueris satis sunt idonei, tū  
quod inepti sunt pudendis, tū quod  
eiusmodi pauculū genitalis seminis  
emittunt. Neque sanè admodū ma-  
cilentī supràque modum extenuati,  
procreādis liberis prouinciæ suffi-



5.aph. 46 ciūt. Quaecumque præter naturam  
crassæ non concipiunt vtero, his o-  
mentū os vteri comprimit, & prius  
quàm extenuentur, non concipiūt.

5.aph. 59 Si mulier non cōcipit, scire autem  
velis, an conceptura sit, pannis cir-  
cum tectam desubter suffias, & si o-  
dor videatur per corpus ire ad na-  
res & os, scito quòd ipsa nō ex se ip-  
sa sterilis est. Verbū, suffias, materiā  
indicat quæ naturam habet, vt suffi-  
ri possit, thus videlicet & myrrham,  
& quaecumque alia talia que calidā  
habent temperaturā, & sunt satis o-  
dorata. Quæcūque frigidos & spif-  
5.aph. 62 fos vteros habent non concipiunt,  
& quaecumque præhumidos vteros  
habent, non concipiūt, extinguuntur  
enim in eis geniura. Et quæcūque  
siccos & magis adurentes, nā ex de-  
fectu alimēti corrūpitur semē. Quæ

Gallē in  
gloss.



cūque verò ex vtrisque mediocrem  
habent tēperaturā, hæ foccūde sunt.

Similiter autē & in maribus. Aut s.aph, 63  
enim propter corporis raritatē spi-  
ritus extrā fertur, vt semen nō trās-  
mittatur ad os, vel propter spissitu-  
dinē humor nō exit foras, vel prop-  
ter frigiditatem nō cōcalefcit, ita vt  
ad hunc colligatur locū, vel propter  
caliditatem hoc idem accidit. Gale-  
nus in cōmētario dānat hūc apho-  
rismū, asseritque nō esse Hip. Qui-  
bus secundū aures secantur venæ,  
coēūt quidē ac emittūt: sed paulum  
quid & minimē frēcūdū. Semē ge-  
nerationi aptū sit albū, splēdidū, glo-  
bosum, florū sambuci modo odorū,  
quod in aquā iniectū, fundū petat.

Ari. 3. li:

&amp; 7. de

partibus]

animaliū

&amp; 7. de

genera-

tione ani-

mal.

Et Auic.

21. tertii.

Coti flocco in pelsū excipe melle  
friamentū aristolochiæ, & ad cubile  
immitte in locellis, si oris sputū dul



cescat foecunda iudicatur, aliàs steri-  
lis est. Mulieris lotio aspergatur  
malua viridis, aut lactuca: pari modo  
fiat ex viri lotio, & cuius malua ari-  
da fuerit, hūc vel hāc sterilē dicito.  
Vel, Vterque habeat vas fursure  
plenū in quo nouē diebus ipsum fur-  
fur vtriusque lotio diluatur, & in cu-  
ius vase vermes affuerint, sterilem  
putato. Simile fit ex fabis aut hor-  
deo.

Auic.

Mulier quæ vtero gerēs saepe  
fit, minus ægrotat quā sterilis, cor-  
pus tamen valen ius habet sterilis  
vtero gerente, nec ita citò senio cō-  
ficitur, quanquam innumeris obno-  
xia vt plurimum, fit morbis.

Si à mensium fluore madeant lo-  
celli, semen iniectum tanquam per  
lubricum iter à locellis labitur.

VICTVS.



Sine itaque discrimine vtrique  
sexui tam mari quàm foeminæ con-  
gruit, corpus vniuersum in media  
& inculcata temperie conseruare, &  
sine omni excessu in symmetria la-  
borum, ciborum, lauacrorum, atque  
reliquorum omnium. Hoc quippe  
maximum neutiquam despicere, vt  
præpinguem sibi compareret habitu-  
dinem. Conferunt opis plurimum  
ita affectis cuncta quæ calefaciendi  
paululumque inflandi vim obtinēt.

Vinum itaque calidæ naturæ cum  
modo, & ne quid nimis accipito. Et  
ex oleribus erucam & nasturtium  
syluestre, quod Erysimon græcè no-  
minant, & herbam geminalem, &  
id genus alia. Ruta verò & nepita  
manibus pedibúsq; quouis alio  
sunt fugienda. Quum autem pro-  
pter malos humores & cacochymiā

f

Aegineta



quandam impeditur conceptio, eosdem expurgare, aut vtili victus ratione temperare expedit, priuatim vero mulieribus cōpetit, vuluam magna industria consultoque aggredi, & absque vlllo impedimento moliri euacuationem. Pro foribus igitur iā existente purgatione, nō tam esculentorum, quantacumque fieri potest mediocritate curato, & quippiā eorum, quæ ad purgationem stimulant ac prouocant steriles, sumere neutiquam detrectent: cuius farinæ sunt cum holera odorata, tum quæ acrimoniam præferunt, puta, scandix, batis, fœniculum, apium, smyrnium. Cæterum prauam vuluæ temperaturam emendato, & in viam, vt ita dicam, reducito.

Calidioribus mulierum locellis succurrito rebus mediocriter hume



stantibus, & perfrigerantibus: cuius generis sunt holera, lactucæ, maluæ, blitum, cucurbita satiua, cucumis & pepon, atripléxque portulaca, atque id genus esculenta.

Si propter humiditatē muliebriū locellorū infœcūdæ partū nō cōcipiāt, victus ratio accommodata est aridior, pariter & labores frictionésque infernarū partiū, simul & vomitiones, ariditasque, & frugalitas cibi.

Hysteram aridiorem curato hordeaceo nutritu, vino præterea mediocri, neque admodum perueteri.

Si quis cum crassioribus humoribus mordax humor infestet, amicū præsidium est, victus rationem exquisitiore & cōmodiorem dispicere.

Pituitosos humores laboribus euacuare expedit.

Quando autem emendatio, men



sibus commodè & suauiter progredientibus, perspicua conspicitur, tū cessante purgatione in venerē congređi expedit.

Medendum flatui ac peditui vteri, primū quidem prætenuem, necessitatique vix sufficientem præscribendo dietam.

Coitus postremò qui fit à tergo, plurimum vtilitatis ad partus conceptionem conferre videtur.

Plinius  
lib. 28. c. 8. Sterilitatem mulierum emendari hyenæ oculo cum glycyrhiza & anetho sumpto in cibo, promisso in triduum conceptu.

Plinius  
lib. 28. c. 19.

Conceptus adiuuari vaccini lactis potu aiunt: Sterilitatem ob partus vexationem fieri, certum est.

Hanc emendari Olympias thebana affirmat felle taurino, & adipe serpentum, & arugine, addito mel-



le, medicatis locis ante coitus.

## POTVS.

Thelygoni potu fœminam concipi narrant, Arsenogonon ab ea semine oleæ, nec alio distat: huius potu mares generari perhibentur, si credimus. Sunt qui florem cratæogoni bibentes mulieres, intra quadragesimum diem cōcipere tradāt.

Plinius

lib. 28. c.

15.

Plini. lib.

27. c. 8.

Plini. lib.

20. c. 15.

Tradunt enim facilius concipere eas, quæ odorentur ammi, quod & cuminum Aethiopicum & regium dicitur, per coitum.

Si uterus frigidior, huius rei gratia potare expedit castorium & fragrantia semina, & cyminum, & anisum & pulegii comam, & viniperorum baccas seu fructum, vnicuique interim pipere commisto.

Aegineta

Oportet præterea in pharmaco,

f iii



si humor mordax cum pituita infestet, epithymum, euphorbium, piperis semen, dauci semen & petroselinum, omnia inquam contrita & macerata pond. 2. drachmarum potui dare. Hoc per ventrem etiam pulcherrime deducit, vuluamque calefacit, quemadmodum saepe iam numero menses dissoluit & rupit his quae non erant purgatae.

Vbi flatus ac peditus in vtero mulieris contenta, conceptioni obstaculo sunt, conducunt cuminum, anethum, & apii semen, rutaeque & anisi, & esculenta multa potui exhibita.

SI PITUITA sterilitatis parens est, R. Rubiae passivae . 3. 2. rad. rusci, asparagi, graminis, cyperi. an. 3. 1. artemisiae, fabinae, apiastri, mentae, callitrichi, adi-



anti, scolopendrii, sampfuchi, origa-  
ni, calamenti, rad. fu. an. m. f. semi-  
nis seseleos. 3. 6. anisi, carei foeniculi,  
āmeos, spicæ nardi. an. 3. 2. xylobat-  
sami, carpobalsami. an. 3. 1. glycyrhi-  
zæ, vuarum passarum. an. 3. 1. florum  
rosmarini, & stæchad. arab. an. 3. 6. ra-  
menti eboris, calami odorati, san-  
tal. rub. an. 3. 6. terantur parum & co-  
quantur, ex decocto confice serapiū  
cum sacchāri candidi lib. 3. & aceti.  
3. 3. quod odorū reddatur cinnamo-  
mo probo, & casia, moschique gra-  
uis. 4. Sume dicti serapii sesquiun-  
ciam, decocti cicerum arietinorum,  
aut liquoris stillatitii artemisiæ, bi-  
pinnellæ, & florum sambuci. an. 3. 1.  
misceto, exhibeto quotidie à cubili  
ieiunæ quoad pituita attenuata sit.

Serapia officinis communia sunt,  
hyemis præsertim tēpore, Oxyme-

f. iiii



li scilliticum & diureticum, Serapia  
ex absinthio, S. ex radicibus aceto-  
sum, S. ex artemisia.

Rx Oxymellitis scillitici, serapii ex  
radicibus acetosi, serapii ex artemi-  
sia. an. 3. i. f. decocti bipinnellæ, radi-  
cis fœniculi & artemisiæ. 3. 3. imisce  
sunto. 3. portiones à cubili potui dā-  
dæ, quælibet portio esto. 3. 4. f.

#### SI BILIS FLAVA.

Rx. Serapii acetosi simplicis, aut oxy-  
sacchari simplicis. 3. 2. serapii ex la-  
ctuca sylvestri (quam endiuia vocant)  
3. 1. decocti vtriusque cichorii,  
lupi salutaris, & buglossi satini. an. 3.  
2. misce, bina esto portio.

Serapia quibus profligatur bilis, po-  
tui dato: verbi causa, zulapiū rosace-  
um, violaceūve, Serapium ace-  
tosum simplex, Oxyfaccharum sim-  
plex. Serapium ex lactuca sylvestri.



℞. Florum vtriūſque bugloſſi, roſa-  
rum rub. an. m. ꝑ. violarum, lactuca-  
rum, foliorū papaueris candidi, vtri-  
uſque intybi. an. m. i. ſeminum lactu-  
cæ ſatiuæ & ſylueſtris. an. ꝓ. ꝑ. 4. ſemi-  
num communium refrigerantiū ma-  
iorum. an. ꝓ. ꝑ. fiat decoctio, quæ colo-  
traiecta, vt palato arrideat dulcis ef-  
ficiatur ſacchari lib. 2. aceti albi. ꝓ. 4.  
vini granat. lib. i. ꝑ. cum citrinis ſan-  
talis aromatizando, ſicque confice  
ſerapium, quo vtere cum decocto bi-  
lem proſligante.

SI ATRABILIS CON-  
ceptionem impediat.

℞. Serapii ex radicibus acetofi. ꝓ. 2.  
ſerapii ex fumaria. ꝓ. i. decocti bugloſ-  
ſi vtriuſque aſplenii & artemiſiæ. an.  
ꝓ. 2. bina eſto portio, quibus addere  
poteris nonnihil cinnamomi.



Vel, vt volūt arabes. ℞. Liqueoris stilletitii buglossi vtriusque, bipinnellæ, fumariæ, scolopendrii, & artemisiæ. an. ʒ. ʒ. sacchari albi. ʒ. 4. aceti. ʒ. 1. addito cinnamomo confice zulapiū pro bina portione. Vel,

℞. Calamenti, origani, stœchadis, eupatorii, florum vtriusque buglossi, querculæ, artemisiæ. an. m. ʒ. scolopendrii. m. 1. Corticum genestæ & fraxini mediani. an. m. ʒ. vuarum passarū. ʒ. 1. fiat deco. in fine decoctionis adde epithymi. ʒ. 1. & cū sacchari lib. 1. & mellis lib. ʒ. ʒ. & aceti passulati. ʒ. 2. confice serapium cinnamomo conditum, cuius quælibet portio esto sesquiūcia cum decocto eorum quæ bilem arcent atram.

## POTIONES PUR-

gantes.



**SI PITUITA**, Medullæ cassiæ fistularis. ʒ. 1. quæ secerniculo traiecta sit decocto chamædryos, cassuthæ, hyssopi, stæchadis, artemisiæ, anisi, glycyrrhizæ, & vuarum passerarum, cui addatur diaphœnicon. ʒ. 3. serapii ex radicibus sine aceto. ʒ. 1. fiat potio, addere prædictis potes eclegmatis indi. ʒ. 1. Agarici electi. ʒ. 2. zingiberis. ʒ. 1. salis gemmæ, grana sex, macera agaricum, zingiber & salem in sero caprillo addita vncia vna mellis rosacei horis duodecim, deinde fortis fiat expressio, cui adde cassiam fistularem & eclegma.

### SI BILIS FLAVA.

**Rx.** Medullæ cassiæ fistularis, seu mannæ. ʒ. 1. excipiatur decocto adiuncti, Florum buglosæ. Viol. prunorum & thamarindorum, adde eclegma.



DE MORE. MVL.

tis ex rosarum succo, vel confectio-  
nis ex rore syriaco. ʒ. 2. ꝑ. syrapi, viol.  
ʒ. ꝑ. cōfice potionem. Loco eclegma-  
tis ros. potes addere rhabarbari im-  
mersi in sero caprillo cum vini albi  
momēto. ʒ. 2. spicæ nardi grana sex,  
immersio esto sex horarum.

AB ATRABILE.

Rx. Adianti, florum vtriusque bu-  
glossi & viol. chamedryos, scolopē-  
drii. an. m. ꝑ. vuarū passarum. ʒ. ꝑ. co-  
quantur in fine decoctionis, adde e-  
pithymi. ʒ. ꝑ. colamento solue medul-  
læ cassiæ fistularis aut mānæ. ʒ. ꝑ. cō-  
fectionis hamech. ʒ. 2. serapii viola-  
cei. ʒ. 1.

CATAPOTIA.

SIPITVITA.

Aegineta Si crassus humor mordaxque sobo-  
lem arceat, familiare atque amicum



præsidium est, maximè ex aloë contexta picra.

Si viribus valeat mulier. R̄. globulorum foetidorum ʒ. i. scammonii grana. ʒ. ii. excipe in globulos qui erui magnitudinem æquant serapiis pituitam destruentibus. Vel R̄. Hieræpicræ. Gal. ʒ. i. f. benedictæ. ʒ. ii. scammonii, interioris farcti colocynthidis. an. ʒ. f. digere in globulos excipiendo serapiis pituitam attenuantibus, detur incoenata ad cubile.

### SI BILIS FLAVA.

Catapotia aggregatiua, Globuli ex rhabarbaro.

### SI BILIS ATRA.

Pilulæ ex lapide cyaneo, quem lazulum vocant.

CATHARCTICVS BV-  
cellatus, & eclegmata aluum



## subducentia.

Si pituita, diaphœnicon, Eclegma indicum, Eclegma diacnici hoc est cartami, Hiera logodion, Hiera rufini. ℞. diaphœnicon, vel eclegmatis indicī. ʒ. ꝑ. sacchari electi quantum sit satis, confice bucellatū quod auri bracteis tegatur. ℞. Rosarum, cinnamomi. zingiberis. an. ʒ. i. santalorum alborū & rub. an. ʒ. ꝑ. hermodactylorum. ʒ. i. ꝑ. scammonii, rad. tripolii elect. an. ʒ. 2. mastiches. ʒ. i. sacchari candidi, lib. ꝑ. liquetur saccharum artemisiæ limpidiore succo, & bucellatos purgantes. ʒ. ꝑ. ponderantes confice, exhibeto aliquando vnū à cubili. Ex dictis pharmacis friatis nonnihil cum cicerum arietinorum decocto, aut vino calido potui dare potes. Delphinii friati, quod puluerem senæ vocāt. ʒ. 2. ꝑ. cum vi-



no, aut cicerum decocto dato.

### SI BILIS FLAVA.

Rx. eclegmatis ex ros. succo, aut cōfectionis de māna. ʒ. ʒ. ꝑ. sacchari quantum sit satis, bucellatum confice catharticum auro bracteato velatum.

Si vitellina bilis, confectio ex palmulis, quam *διαφενικῶν* vocant, Eclegma indicum.

Si atra bilis, Rx. confectionis hammech. ʒ. ʒ. ꝑ. sacch. q. s. confice bucellam purgantem.

### VENAE SECTIO.

Si sanguis redundans sterilitatem inducat, ex duabus saphenis ad pedis maleolos multus detrahendus est sanguis, at si bilis flava paucus: nam bilis flavae frenū sanguis est.

BALNEA, INSESSVS  
& fetus.



Aegineta

Expedit perfrigeratis cum alia quædam faciendo, tum pyriis omnibus, tum iis quæ è vaporibus fiut calefactionibus reuocare calorem. Ipsarum verò vuluarum fatus, partim quidem vapores sedentibus in sede constituunt, partim verò calida aqua alluendo fiunt, in qua elixa sunt saluia, artemisia, ruta, cyperrum, pulegium, acorum, & quæ bonum emittunt odoris fluxum semina.

Aegineta

SI PROPTER HUMIDITATEM muliebrium locellorū, ex re vsūque haud mediocriter sanè fuerit, ipsam quoque vuluam medicaminibus acerbis tueri, è quorū numero habetur lentisci elixatio, & myrtorum & rosarum, & rhu, præterea mali punici floris, & rubi tennellorum, atque gallæ. Histerā con-



trā aridiorem, lauacris curato. Si ex crassiori humore mordacique post purgationē ex picra, serō lactis vuluam eluere amicum præsidium est.

Si pituita. Purgata pituita si præstet viribus mulier, lauacris naturalibus lauetur, à cuius egressu mithridatidis confectionis. 3. 1. potui detur, talibus balneis lauetur diebus decē aut quindecim. Balneorum naturalium loco, tale lauacrum confice, quod R<sup>x</sup>. Artemisīæ, betonicæ, chamædryos, chamæpithyos, chelidonii, callitrichi, foliorum lauri, maluæ, maioranæ, apiastrī, origani, ocyni, pulegii, rorismarini, zingiberis, sabinæ, vtriusque stæchadis, vitis albæ, hyperici, hyssopi, chamæmeli, fertulæ campanæ. an. m. 2. carei, cymini, fileris montani, anisi, seminis anethi. an. 3. 3. semini-



nis lini, fœnigræci. an. ʒ. ʒ. rad. sym-  
phyti, rad. valerianæ, rad. petroseli-  
ni. an. lib. ʒ. ex his confectis fiat de-  
coctio, & ex pharmacis decoctis sac-  
culus impleatur, cui in balneo mu-  
lier infideat, lauetur mulier bis in  
die à cubili scilicet & ad cubile, die-  
bus decem saltem, renouando phar-  
maca & decoctionem.

## SI BILIS FLAVA.

Rx. Maluæ vtriusque cum radici-  
bus. an. m. ʒ. foliorum violarum, sali-  
cis, vitis vuas albas portantis, rosa-  
rum, nymphææ. an. m. ʒ. foliorum  
malorum cotoneorum. m. ʒ. foliorū  
vlmi. m. ʒ. fœnigræci. lib. ʒ. coquen-  
da curato: decocto tepido infideat  
mulier ieiuna, & ad cubile, discoo-  
perto folio cauendo sudorē. Ex de-  
cocti herbis sacculus repleatur, cui



insideat mulier. Ex dictis herbis  
euaporatorium constitui potest.

### SI A T R A B I L I S.

Chamæmeli, fertulæ campanæ, cha-  
mædryos, chamæpithyos, hyssopi,  
foliorum lauri lauendulæ. an. m. 2.  
artemisiæ. m. 4. althææ cum rad. m.  
f. seminis lini, fœnigræci. an. lib. 1.  
rad. valerianæ. lib. 1. f. conterantur,  
& in sacculum indantur, coquan-  
tur, decocto lauetur, & sacculo infi-  
deat mulier.

### SI E X S O L A S I C -

itate.

Arietum plura capita in vase æ-  
neo quoadusque caro ab ossibus spō-  
te separetur decoquenda curato,  
quibus decoctis adde, vt coquatur,  
foliorum vitis, salicis, violarum,  
chamæmeli, meliloti. an. m. 2. althææ

t ii



DE MORB. MVL.

cum rad. m. f. fœnigræci, seminis lini. an. lib. 2. rad. valerianæ. lib. 1. f. In tali decocto sæpissimè mulier balneetur.

ECLEGMA TA.

Si pituita. A balneo mithridatis. 3. 1. ex vino detur. R. Triphæræ magnæ sine opio, pliris cum mosco, diambaris, diasatyrion. an. 3. f. ramenti eboris, seminis mercurialis. an. 3. 2. coaguli leporini & matricis eiusdem. an. 3. f. feseleos. 3. f. sacchari albi. lib. f. saccharum solue liquore stillatitio apiastri, quūque saccharum probè coctum fuerit, adde conseruæ corticum mali citrii. 3. 1. conseruæ florum rorismarini. 3. f. & id in quadras digere pond. 3. 2. f. dato à balneo vnam.

SIBILIS FLAVA.

Purgato humore noxio hora ante ci-



bi sumptionem exhibeatur mulieri  
quadrarum sequentium vna. R̄.

Friamenti trium santalorum. 3. 2 ra-  
menti eboris, visci querni, friamen-  
ti pudendi tauri, vuluæ leporis. an.  
3. 2. sacchari candidissimi lib. 6. sac-  
charum rosacea liquetur, & inde  
quadræ conficiantur pond. 3. 3.

Vel, R̄. Conseruæ rosarum. 3. 1.  
conseruæ florum nymphææ, & florū  
vtriusque buglossi. an. 3. 3. diarhodon  
ex abbate, conf. triū santalorum, cō-  
fectionis manus christi cum perlis.  
an. 3. 1. 6. fragmentorum lapillorum  
communium qui in pretio ab offi-  
cinis habentur. 3. 2. seminis mercu-  
rialis. 3. 1. 6. ramēti eboris, visci quer-  
ni, friamenti pudendorum tauri, ma-  
tricis leporis. an. 3. 2. confice confe-  
ctionem, quam serapio adianti ex-  
ceptam auro tege, dato cochlear

c iii



ante prandium & tantumdem ante  
cœnam, & etiam à balneo.

## SI EX SANGVINE.

Postquam lota fuerit mulier in  
aqua in qua coriarii coria parant,  
quæ huic negotio accommodatissi-  
ma est, sumat quadram aut orbicu-  
lum eclegmatis, quod      ℞.

Cinnamomi, seminis mercurial.  
rosarum rub.ramenti eboris, mar-  
garitarum. an. 3. 1. coralli rub. frag-  
mentorum lapillorum præciosorum  
cōmuniū. an. 3. 2. omniū santalorū. 3.  
℥. sacchari. lib. 6. liquetur saccharum  
aqua in qua extinctum sit aurū aut  
chalybs. cum. 3. 1. conseruæ ros. con-  
fice quadras aut orbiculos pond. 3. 3.  
Vel ante cibum quemlibet sumat  
eclegmatis sequentis cochlear.  
℞. Conseruæ ros. antiquæ. 3. 1. con-



seruæ florum vtriusque buglossi. an.  
3. 2. trium santalorum, diarhodon ab-  
batis. an. 3. 2. prædictorum puluerū.  
3. 3. pannos auri. 12. misceantur cum  
serapio viol.

## SI ATRABILIS.

A balneo exhibeto mulieri melan-  
cholicæ orbiculum, aut quadram  
vnam eclegmatis sequentis.

℞ Eclegmatis ex gemmis. 3. 2. fe-  
minis mercurial. ramenti eboris. an.  
3. 1. pudendi tauri, coaguli leporini  
& eiusdem matricis. an. 3. 2. sacchari  
lib. 6. saccharum liquore stillatitio  
liquetur, adde conseruæ buglossi. 3.  
2. misce. adde etiam cinnamomi fri-  
ati. 3. 1. digere in quadras aut orbicu-  
los.

SI EX SOLA SICCI-  
tate.

t iiii



A balneo quadram eclegmatis sequentis dato.

Rx. Specierum diarhod.abbatis.3.  
2.feminis mercurial. rasuræ eboris.  
an.3.2.matricis leporis.3.2.feminis  
coti, tragacantes, commi. an.3. f.  
sacchari in liquore stillatio, buglos  
si soluti lib. f. conseruæ florum vtri-  
usque buglossi. an.3.2. digere arte &  
igne in quadras pond.3.3.

## PESSI.

## SI PITUITA

Rx. Artemisiæ, sabinae, maioranæ,  
dictanni, absinthii. an.3. f. anisi, am-  
meos, rutæ, corticis thuris. an.3. 1.  
interioris farcti colocinthidis.3.2. in  
tenuissimum pollinem redacta suc-  
co mercuriali aut chamædryos exci-  
pe, & in raro panno indatur noctu-  
que in locellos immitte, quotidie



recentem pessum indere potes, quo-  
ad redundantes succi exhausti fue-  
rint, quibus siccatis talem intromit-  
te pessum, ne rursus ad vterum de-  
fluat pituita.

Rx.

Acaciæ, balaustiorum, calycum  
glandium, scorix ferri, lycii, men-  
tæ, corticis arboris ex qua defumi-  
tur mastiche, corticis libani, semi-  
nis ros. rhus coriariæ, fructus spicæ.  
an. 3. f. friato, & labri veneris aut  
oxallidis, aut millefolii succo exci-  
pe, & in pessos redige, qui continuè  
aliquot diebus sunt deferendi: præ-  
dictis tartari friamentum addere  
potes, cui vis mira doctorum testi-  
monio inest, etiam si ore sumatur.

### SI EX BILE FLAVA.

Rx. Medullæ, cruris vituli, cerebri  
cerui, butyri vaccini, adipis capra-



DE MORB. MVL.

rum, feminis mercurialis. an. ʒ. ʒ. f. a-  
cacia, hypocystidis, santal. rub. sta-  
ctes, cornu cerui vsti. an. ʒ. 2. oleo ro-  
laceo & lanæ floccis in pessos exci-  
pe.

SI EX SANGVINE.

Rx. moschi grana sex, santal. mos-  
chell. rosarum rub. an. ʒ. ʒ. olei. rosa-  
rum. ʒ. 1. f. diu in mortario pistillo  
ducantur, & cotum teretis modo  
formatum his illinatur & indatur.

SI EX ATRABILE.

Pessi fiant ex costo friato, oleo rosa-  
ceo, foenigræco, anatis adipe, semi-  
ne asparagi, anseris adipe, oleo vio-  
laceo, moscho. &c.

SI EX ARIDITATE

SOLA.

Rx. Medullæ crucis vaccini, adipis



gallinæ.an.3.℥.stactes.3.2. cum lana  
confice pessos, quibus potes addere  
olei amygdal.dulciū.3.4.&.immit-  
tere aut iniicere.

## INIICIENDA PER ME- tranchytum.

### SI EX BILI FLAVA.

℞. Rerū in pello pro<sup>o</sup>choleris de-  
scriptorum .3.1. aquæ rosarum, &  
olei rosacei.an.3.3.misceatur & inii-  
ciantur.

### SVFFITVS.

### SI EX PITVITA.

℞. Pilulorū cypressi, mastiches, thu-  
ris, ladani, myrrhæ, chalbanes, bac-  
carum lauri, bdellii, styracis, stactes.  
an.3.2.ambaris.3.℥.frangatur, & his  
mistis ad cubile per infundibulum  
mulier suffiatur. Vel, ℞. Ladani



puri. 3. 1. styrac. 3. f. caryophyllorum,  
 agallochi, sabinæ siccae. an. 3. 1. f. am-  
 baris. 3. f. moschi, grana. 4. cū pistel-  
 lo calido fiat pastilli ex quibus vnus  
 in prunas ardentes iniectus, per in-  
 fundibulum suffiatur mulier.

Si diues sit. R̄. styrac. gabalites.  
 3. f. agallochi, ambaris. an. 3. 1. balsa-  
 mi. 3. 1. moschi. 3. 1. digere in pastil-  
 los, & suffiatur mulier, orbiculo vno  
 in carbones candentes iniecto.

Vel, R̄. rosarum rub. thuris, masti-  
 ches, myrrhæ, sanguinis drac. glebæ  
 armeniacæ, fructuum myrti. an. 3. 1.  
 styracis. 3. 1. ladani. 3. f. ambaris, mos-  
 chi, agallochi, caryophyllorum, bal-  
 sami, spicæ nardi. an. 3. f. terentur in  
 pollinem tenuissimum terenda, &  
 cum pistello calido digere in pastil-  
 los, quorum vno in carbones inie-  
 cto suffiatur sterilis, post suffitum



rosaceâ (in qua maceratum sit mos-  
chum) os vteri illine, subinde fu-  
tuat. Vel, R̄. agallochi. cinna-  
momi. an. 3. 1. f. caryophyllorum, cy-  
peri zingiberis, nucis moschatae.  
an. 3. 1. rad. bistortae, gallarum, alu-  
minis rochae. an. 3. 2. moschi. 3. f. con-  
fringantur, & inde fiat suffitus.

Sagzeneâ sine opio Auicennae, aut  
serapionis accommodatur, si ex ea  
fiat suffitus. Aipta item moscha-  
ta. Gallia moschata.

## S I E X B I L E.

R̄. omnium fantalorum. an. 3. 1. ro-  
sarum rub. florum nymphae & vio-  
larum. an. 3. 1. styrae. 3. 2. Ambaris.  
3. 1. terantur, & rosaceâ excepta in  
pastillos digerantur pro suffitu.



EMPLASTRA ET  
cataplasinata.

Extra balneum assidue deferat  
hoc emplastrum pubi admotum.  
quod R. Emplastri ceronei. ʒ. 2. lada-  
ni puri. ʒ. 1. f. galliæ moschatae, aliptæ  
moschatae. an. ʒ. f. excipiantur om-  
nia oleo nardino, & inde concin-  
netur emplastrum rotundum.  
Vel, R. Ladani puri. ʒ. 1. thuris,  
mastiches. an. ʒ. 2. spicæ nardi, caryo-  
phyllorum, ambaris. an. grana. 15.  
cera excipiantur sufficienti & oleo  
nardino in emplastrum, quod exte-  
sum in parino serico rub. epigastrio  
imponatur, locellos enim confor-  
tat, & eos conceptui parat.

Cataplasmate mederi expedit ha-  
rum rerum quæ bonum emittunt  
odoris fluxum, vnicuique pectinen



Conducit non minus Polyarchium  
epithema.

Frictio porrò pectinis atque co-  
xendicum nulli quouis alii medi-  
camento bonitatis honore & utili-  
tate cedit.

### CONCEPTIO, FOETUS

tus generatio, impregnatio.

Conceptio est attracti à locellis  
seminis cōmistio, in sanguinis mé-  
strui puriori parte, in quam locello-  
rū calor nativus ita agit, quòd viui-  
ficato seminis genitalis calore, de-  
mū foetus generatio sequitur.

Foetus generatio, est virilis seminis  
cum menstruo sanguine tam diutur-  
na actio, quo ad materia illa formā  
recipiat humanam.

Ita auidē iniectum semen vterus  
retinet, vt os ipsius internum ita ad-



stringitur, quod nec minimū quidē  
seminis aut sanguinis menstrui exi-  
re potest.

Sex primis diebus lactis similitu-  
dinem semen utero detentum re-  
fert, nouem diebus sequentibus in  
sanguinem vertitur.

Duodecim aliis diebus caro effici-  
tur. Decem tandem & octo die-  
bus reliquis membra omnia for-  
mantur.

Sex in lacte dies, tres sunt in sangui-  
ne terni.

Aegidii versus.

Bissenī carnem, ter feni mem-  
bra figurant. Vel, Inie-  
ctum semē sex primis certē diebus.  
Quasi lac, reliquis nouē fit sanguis,  
ac inde Solidat duodenus dies;  
bis nonāque demum Effugiat, tē-  
pūque sequens producit ad ortum:



Formato foetu (inquit Auicenna) duplicato tempore mouetur, & subinde duplicato tempore motus, foetus ad ortum venit.

Auicenna libro nono de Animalibus, imprægnationis tēpus in septem æquales partes diuidit: Prima quarum formationi, duæ motui, & quatuor aliæ partui correspondent, Tempus enim motus contra tempus informationis prorsus cōdistinctum ei duplū fit, verbi gratia: Si in 30. die foetus formatus sit, eo duplicato. 60. continuē, cui si triginta addideris. 90. habebis, quibus. 90. diebus tres perficiuntur menses, & tūc foetus moueri incipit, deinde duplicato motus tempore, quod. 60. constat diebus, seorsum à formationis tempore si sumas, dies. 120. erūt, qui menses quatuor constituunt, & his



præcedentibus additis, foetus ad ortum veniet. Ex quibus sequitur in 30. die formatus in. 7. mense nasci, pari modo de aliis dicendum. Ex dictis sequitur naturalem partum decimo aut vndecimo mense sæpe fieri posse.

Astrologi moram foetus in vtero aliter scrutati sūt authore Ptoletheo in centiloquii propositione. 51. Locus (inquit) lunæ in natiuitate ipsius gradus ascēdētis est hora casus spermatidis, & locus lunæ in hora in qua cecidit semē est gradus ascendentis in hora natiuitatis: & quia tempus inclusum inter ascendentem natiuitatis, & lunæ, casus seminis, horam & locum lunæ, hora natiuitatis variationem quandā recipit. 3. in vtero moras foetus distinctas inuenerūt



prædictis temporibus mensuratas,  
maiores scilicet, mediam & mino-  
rem. Maior siquidem dierum. 288.  
existit, qui menses nouem, & dies  
18. constituunt. Media dierum. 173.  
existit, quibus perficiuntur menses  
nouem, & dies. 3. Minor dierum est.  
258. menses. 2. & dies. 18. perficien-  
tium. Cognita hora infusionis se-  
minis genitalis in vtero, natiuitatis  
hora cognoscitur.

Astrologorū somniis ne sis plus-  
quàm par sit intentus, nam eo-  
rum sententia sequeretur septimi,  
octauī & vndecimi mensis partum  
præter naturam existere sicque na-  
tum non viuere, quoniam talis par-  
tus sit influxa super cælesti obuian-  
te, qui (vt notum est) tanquam vni-  
uersale agens plus in causatū, quàm



in particularia agentia influit.

Octauo mense natus aliquando  
vixit autore Aristotele lib. historia-  
rū animalium. 2. Foetus formationes  
peculiares ita partiuntur Astrologi.

Quanquam Saturno totum tri-  
buant imperium secūdum materiæ  
diuersam dispositionem, planetas ta-  
men ad talem actionem concurrere  
affirmant, nam (ut dictum est) in cō-  
ceptione materia simul adimatur,  
cōstānsque fiat oportet, talis opera-  
tio Saturno tribuitur, cuius est sicci-  
tate & frigiditate materiam cogere,  
coactāque cōstātē facere, hōcque ita  
protēditur, quoadusq; à locellorū ca-  
lore, seminis genitalis calor valēs in  
generationis agat materiā. 2. opera-  
tio Ioui attribuitur, cuius est mediā  
te spiritu hominē viuificare. 3. Marti,  
cuius caliditate & siccitate mem-



brorum vires roborantur, præsertim materiam illam firmat, qua tria mēbra principalia gignuntur in secunda, & hæc operatio. 7. diedus definit. Subinde sol instat in illam materiam, vt foetus ad locum conceptionis materiam illam talem ac tantam attrahat, quantum satis sit ad principum membrorum augmentationem, & inde animam recipere valeat, quod in triduo perficitur.

Veneri operationem quintam adscribunt, cuius est, externa membra formare, quæ lunæ influxu variè disponuntur, & hæc operatio diebus nouem perficitur. 6. Mercurius proinde oculos, aures, nares, & vocis instrumenta procreandi facultatem ministrat, tuncque caput & in ipso capite contenta finguntur, & sensus instrumenta recto situantur



ordine, caput ab humeris separatur,  
 & hæc omnia dies expetunt duode-  
 cim. 7. Luna que humidis præest,  
 talem infuit facultatem, vt ad con-  
 ceptionis locum humiditas tanta  
 trahi possit, quòd mēbra omnia for-  
 mam debitam recipiant, huius ope-  
 ratione foetus completur. Hæc  
 diffusius scripta offendes in astrolo-  
 gorum libris.

A casu feminis in vterum, vsque  
 ad foetus ortum, planetæ in hunc ab  
 astrologis aliter influere dicuntur,  
 quum quilibet peculiari domine-  
 tur mensi, quemadmodum & plan-  
 tis. Primum mensem Saturno tri-  
 buunt, & seriatim reliquis planetis  
 menses sequentes dicant. Saturnus  
 enim frigore & humore peculiari  
 materiam cogendo constantem fa-  
 cit, naturâque tribuit vegetatiuam.



Concreta coactaque materia, à loue, cuius est viuificare omnes spiritus, formandi membra vigorem recipit, & hoc secundo mense. Tertius Marti, qui tria principalia membra suo calore formando, caput à cæteris separat membris, brachia quoque & crura formando, ab inuicem diuidit quum in ipsis adhuc nullus (vt volunt phyci) existat vitalis spiritus.

Spiritus vitalis à Sole in cor defluit, cor autem aliis membris vitæ spiritum ministrat, sicque foetus mouetur sentitque. In quinto mense veneris virtute membrorum exteriorum lineamenta quædam perficiuntur ac formantur, puta, nares, os virorum mulierumve pudenda, pedum manuumque & digitorum secretio. Sextus mensis Mercurio dicatus est, qui facultatem habet fa-

v iiii



bricandi vocis instrumenta, super-  
 cilia & oculos, augendique capillos  
 & ungues. 7. Luna præest, quæ in  
 nata humiditate, corporis foetus va-  
 cua replet loca, tuncque perfectus  
 est foetus. 8. Mensi dominatur Sa-  
 turnus, qui hoc mense natos inter-  
 mit fetus: nam quidam planetæ se-  
 cundum ambas qualitates vitam  
 amicabiliter largiuntur, vti Venus  
 & Iuppiter. Quidam secundum  
 vnam tantum, vt luna, Mars. Et qui-  
 dam vtrique qualitate vitæ contra-  
 dicunt, vt Saturnus. Si tamen foetus  
 natura fortis valentisque virtutis  
 fuerit, matre etiam viribus valente  
 (autore Arist. histor. animalium lib.  
 8.) in octauo natus viuet. Nono  
 mensi Iuppiter præest iterum, qui  
 vtrique qualitate vitæ amicus, fœ-  
 tum viuificat, ipsiusque vitæ princi-



pia fouendo, vitalem auget spiritum, quamobrem partus ille laudatissimus censetur. Mars decimo dominatur vna qualitate amicus vitæ, natus igitur in hoc mēse puer iterdū viuit. Sol vndecimo præest, vitā nato influit, sicque in ipso natus viuit.

Si ad duodecimum mensem pueri natiuitas protendatur (quanquam rara sit avis, nec vnquam vidi, neque legi) viuet puer, cum tūc venus vitæ amica dominium resumpferit.

Docere cupio, quid Pythagoras de numero dierum ad partus pertinentium senserit. Primum generaliter esse partus omnino duos dixit: Alterum minorem, quē vocant septimestrem, qui ducentesimo & decimo die post conceptionem exeat ab utero. Alterum maiorem deci-

Césori-  
nus de  
dientali  
c. 12. ex  
Pythago.



mestrem, qui edatur die. 274. Quo-  
 rum prior ac minor senario maxi-  
 me continetur numero. Nam quod  
 ex semine cōceptum est, sex (vt ait)  
 primis diebus humor est lacteus:  
 deinde proximis octo sanguineus.  
 Qui octo quū ad primos sex acces-  
 serunt, faciunt primā symphoniam,  
 Diatessaron. Tertio gradu nouem  
 dies accedunt, iam carnem facien-  
 tes. Hi cum sex illis primis collati,  
 sescuplam faciunt rationem, & se-  
 cundam symphoniam diapēte tum  
 deinceps sequētibus duodecim die  
 bus fit corpus iam formatum. Ho-  
 rum quoque ad eosdem sex collatio  
 tertiam diapason reddit symphoni-  
 am duplici ratione subiectā. Ii qua-  
 tuor numeri. 6. 8. 9. 12. coniuncti fa-  
 ciunt dies. 35. Nec immerito sena-  
 rius fundamentum gignendi est.



Nam eum τέλειον græci, nos autem perfectum vocamus: quod eius partes.3, sexta & tertia & dimidia, id est vnus, duo, & .3. eundem ipsum perficiunt: Sed vt initia feminis & lacteum illud conceptionis fundamentum, quod est quinque & triginta dierum, sexies ductum, cum ad diem.210. peruenerint, maturum pro creatur. Alter autem ille partus qui maior est, maiore numero continetur, septenario scilicet, quo rota humana finitur:& vt Solon scribit, & Iudæi in dierum omnium numeris sequuntur, & Hetruscorum libri Rituales videntur indicare. Hippocrates quoque alique medici in corporum valetudinibus non aliud ostendunt, nam septimum quemque diem crisimon obseruant. Itaque vt alterius partus origo in sex est diebus,



post quos semen in sanguinem ver-  
 titur, ita huius in septem: & ut ibi  
 quinque & triginta diebus infans  
 membratur, ita hic proportio est die-  
 bus ferè. 40. Quare in Græcia dies  
 habent quadragesimos insignes: nã-  
 que prægnans ante diem. 40. non  
 procedit infanum, & post partum  
 40. diebus pleræque foetæ grauiores  
 sunt, nec sanguinē interdum con-  
 tinent, & paruuli ferme per hos fere  
 morbidi sine risu nec sine periculo  
 sunt, ob quam causam cum is dies  
 præterit, diem festum solent agita-  
 re, quod tempus appellāt *τεσσαρά-  
 κισον*. li igitur dies. 40. per. 7. illos  
 initiales multiplicati fiunt dies. 280.  
 id est, hebdomades. 40. Sed quoniã  
 vltimæ illius hebdomadis primo  
 die æditur partus, sex dies decedūt,  
 & 274. obseruantur. Qui numerus



dierum ad tetragonum illum Chal-  
dæorum conspectum subtiliter con-  
gruit . Nam quū signiferum orbem  
diebus.365.& aliquot horis sol cir-  
cumeat , quarta necesse est parte  
dempta, id est diebus . 72 . aliquot-  
que horis.3. quadras reliquis diebus  
.274. non plenis percurrat , vsque  
dum perueniat ad id loci, vnde con-  
ceptionis initium quadratus aspi-  
ciat . Vnde autem mens humana  
dies istos commutationis speculari,  
& arcana naturæ rimari potuerit,  
nemo miretur. Hæc enim frequens  
medicorum experientia peruenit:  
Qui quū multos animaduenterent  
semen non retineré conceptum, cō-  
pertum habuerunt, id quod intra sex  
dies septē mve eiiciebatur esse la-  
cteum , & vocari *ἄκρυν* , quod  
postea autem , sanguineum , idque



ἑξήκοντα appellatur. Qui verò ambo partus videntur paribus dierum numeris contineri, Pythagoras imparem laudat, tamen à secta non discrepat. Duos enim impares. 209. dicit expleri, ad quorum consummationem aliquid ex sequentibus accedere, quod tamen diem solidum nō afferat, cuius exemplum videmus tam in anni quàm mensis spatio, seruasse numerum, quū & anni imparem dierum. 365. numerum aliquanto cumulauerit, & mensi lunari addies vndetriginta aliquid addiderit. Nec verò incredibile est ad nostros natales musicam pertinere.

Gal. lib. 1.  
de fi.

Non est pars parentis fœtus ipse. Nam hoc pereunte necesse esset illum quoque emori, vel edito, functionum offensam capere tanquam deficiente aliquando parte, suo cor-



pore priuata.

Nutritur foetus in locis comprehensus & inuolutus, atque coactus, Nutrimentum numquam per os, sed per vmbilicum capit. Quidam autem animal, alii autem minime dixerunt. Qui animal esse dixerunt, ex motu ipso ita esse coniectarunt: nam mouetur foetus, & delectari videtur, quum mater gaudio afficitur, eademque affecta, contrahitur tristitia, & cogitur vt animal sensibile. Hæc enim sensibilitas cui alteri est quam animali. Alii autem non animal esse dixerunt: nutriri verò & augeri volunt vt stirpes, aut arbores, neque aut motum voluntarium, aut inuoluntarium habere, quemadmodum animalia. Non enim suapte voluntate mouetur, sed vt arbores & plantæ. His autem motus causa



sanguinis expers est, foetibus autem  
ibi contenta humiditas, & lapsus,  
atque figura vuluæ. Quum enim ple-  
na est, rotundæ instar pilæ aggloba-  
tur, rotunda quidem ad omnē mo-  
tum nata & idonea, stare nesciens.  
Asclepiades autem neque animal,  
neque non animal esse, factum in  
vtero matris declarat, sed dormien-  
tibus ac sopitis simile. Quemadmo-  
dum hi sensus habent, sed non utū-  
tur, sic qui in vtero sunt. Gigni-  
tur quidem masculus secundum a-  
liquos, quū id quod ex dextra qui-  
dem parte auulsum semen est des-  
cendit in vuluā aut locos: foemina  
verò quum id quod à sinistra. Alii  
autem dixerunt propter propriam  
feminis commissionē, vel propter  
caliditatem, aut frigiditatem gigni.  
Calidius enim semen marē progi-



gnit, frigidius verò fœminam. Gemelli, & tergemini secundū aliquos propter calidū semen in locos contractum, atque ibidem decisum, sic enim gemellos & tergeminos fieri aiunt. Alii autem comprehensiones causatur, nos verò dicimus, quòd si decisum sperma defluerit in locos binos, tūc gemellos, si in. 3. tunc tergeminos. Sed qui septimo mense nati sunt foetus, viuunt, octauo nequaquam. Octo, numerus recens est coniunctus, non autē iudicatorius, Septem, numerus superfluus, & non coniunctus, sed iudicatorius.

## CAVSAE CONCEP-

tionis.

Causæ conceptionis est, modera- Gal. lib.  
ta locorum caliditas, necnō recens defi.  
menstruorū purgatio, & appetitus

X



libidinis : quum enim hæc concurrunt, semen continetur.

g.apho.

40.

Gal. in  
comenta-  
rio præ-  
dictæ sen-  
tentie.

Fœtus, mares quidē in dextris, fœ-  
minæ verò in sinistris magis, Quod  
propter temperaturā, quæ statim ab  
initio calidior existit, fœtus mascu-  
lus generatur, in cōmentariis de se-  
mine est demonstratū: calidior verò  
tēperatura fœtibus aduenit nō mi-  
nimè ob locum qui est dextra vteri  
pars. Hic autem ipse calidior existit,  
propter hepatis vicinitatē : confert  
autem aliquid ad conceptus calidi-  
tatem & muliebre semen, profusum  
quidem ex propriis testiculis per  
vtrumque corniculum, pars vna in-  
dextrum vteri sinum, pars altera in  
sinistrū, dissimiles autem ambæ, ut  
& hoc ipsum ostendimus. Siquidem  
ferosior est atque frigidior quæ in  
sinistro testiculo continetur, & iux-



ta hoc cōceptus in læua partæ vteri  
constitutus, non absque ratione es-  
set frigidior

## NOTAE.

Si mulieri cessent purgationes, s. Aph. 61  
neque febris, neque rigor superue-  
nient & fastidia incidant, iudica ip-  
sam in vtero habere.

A conceptu decimo die, dolores Pli libro  
capitis, oculorum vertigines tene- 7.c.6.  
bræque, fastidium in cibis, redunda-  
tio stomachi indices sunt hominis  
inchoati. Melior color marem feren-  
ti, & facilior partus, motus in vtero  
40. die. Contraria omnia in altero  
sexu, Ingestabile onus, crurum & in-  
guinum levis tumor. Primus autem  
90. die motus, sed plurimū languo-  
ris in utroque sexu, capillū germi-  
nante par u, & in plenilunio, quod  
tēpus ædi os quoque infantes præ-



Cipue infestat, adeoque incessus, atque omne quicquid dici potest ingrauida, refert: ut falsioribus cibis usæ, carentem vnguiculis partum ædant.

**Aeginera** Fœminas vtero gentes eiusmodi magma ex parte casus affligunt corporis ferè totius redundantiarum moles, iugis vomitus, sputatio, erosiones stomachi, & horror denique cibi.

Si in futuitione vterus suggendo, glandem valenter traxerit, vir mulierque simul semen emiserint, nec mulier quomodo viri semen abiecerit, sed intra locellorum aliquem sinum detinuerit, indica hæc vtero gerere, proinde si pigra semisopitaque sit mulier, dolorè item si sciat inter umbilicū & fœmur, paruoque horrore afficiatur, hæc vtero



gerit. Procedente tempore futue-  
re renuit, vel non ita libenter rem-  
colit veneream, à futuitione pau-  
cum sentit in epigastrio dolorem,  
neque semen emittit, menses sta-  
tuto tempore non defluunt, adest  
vertigo, & visus hæbetudo, palpita-  
tio ac tremor cordis, pica, vomitio,  
nonnunquam color mutatur, pan-  
ni & lentigines in vultu, & aliæ cu-  
tis defœdationes sequuntur, palpe-  
bræ mollescent, oculi cōcaui, pupil-  
læ attenuantur, coniunctiua oculi  
augetur, quamobrem atrocibus ocu-  
lis cernere dicuntur, dorsum quan-  
doque & ilia dolore afficiuntur, præ-  
dicta symptomata mulieres ad quar-  
tum vsque mensem torquent, sub-  
inde sensim minuuntur. Si velis nos- 5. aph. 41.  
cere an conceperit mulier, quā dor-  
mitura est, ei aquam mulsam potan



Gal. in  
commen-  
tario.

dam da, & si alui tormina patie-  
tur, concepit, si minus, non cōcepit.  
Tormina fiunt quidem & propter  
mordacitatem, fiunt autem & prop-  
ter spiritum flatuosum, qui facilem  
nō habet exitum, quæ etiam tormi-  
na fieri nūc est arbitrandum in mu-  
lieribus quæ conceperunt, propter  
eam quæ fit ex vtero āgustationem,  
Dat autem aquam mulsam mulieri  
dormituræ, crudam videlicet, quo-  
niam qualitas flatuosa si noscere vo-  
lumus, est necessaria, volēs & quies-  
cere simul & plenam esse cibis mu-  
lierem. Hec enim ambo conferent  
ad torminum generationem.

Auic.

Misc. igitur. 3. 2. mellis æquæ por-  
tioni aquæ celestis, & potui daro,  
tunc enim si matrix foetu plena, in-  
testina compressa tener, dolore pun-  
gente mulieris aluus afficitur.



Vt certò scias an vtero gerat, an masculū aut fœminā cōceperit, Sumito vrinā mulieris collectā in vase mundo obturato, ne aër subintret triduum, deinde pāno lineo mundo hāc traice, siquidē in panno insecta quædā pediculorū quantitate appareāt, cōcepit, si insecta rubescāt masculū peperit, si albescant fœminam. Acus polita madeat noctu in mulieris lotio in æneo vase, si maculis variisq̃ue coloribus tingatur acus, peperit mulier, masculū si maculæ rubescēt, quòd si non vtero gerat, acus nigra æruginosaq̃ue est.

Mola & fœtus gestatio talibus discernuntur notis. Mensibus ordinatè fluentibus conceptio fit, mola non ita. Mola ante mensem tertium mouetur, in conceptione nunquam. In mola statim alius tu-

x iiii



mescit, contrà in vtero gerentibus. Foetus sæpissime à loco in locum mouetur, at mola sine cōpressionē, aut mulieris motu non mouetur, aut rarò. Manus cōpressionē violenta mouetur mola, deinde ad propriam tendit sedem: sed foetus ex tali cōpressionē aliquando mouetur & aliquando non. Alius durior est in mola, quàm in foetus gestatione. Velocior est vtero gerens quàm molâ vexata. Et si alius in mola tumescat, māmæ tamen gracilescunt mollescuntque, contrà in prægnante.

Mola aliquando in vtero manet vsque ad annum quartum, at vtero gerens parit, saltem in vndecimo. Sunt qui dicant nihil de vteri gestatione ex lotio cognosci posse.



NOTAE CONCEPTIO-  
nis ex lotio.

Auicenna tradit urinam in im-  
prægnationis principio citrinam ef-  
se ac subalbescentem, in cuius me-  
dico stoci cotti quasi residere viden-  
tur. Urinam puram limpidamque  
ac subtilem, in cuius summo nubes  
persistit, cum athomis ascendentibus  
& descendantibus, vtero gerere  
mulierem scrib. Auicenna significa-  
re. Refert item quòd moto vase si  
turbetur vrina, imprægnationis fi-  
nem notat, contrà principium. In  
fine conceptionis rubor ibi appa-  
ret, vbi primùm albedo inerat.

Alii asserunt urinam vtero gerē-  
tium tribus primis mensibus san-  
guinis colorem referre, & in se qua-  
si quasdam nebulas, & sedimentū  
album habere. Cæterum in quarto



mēses & deinceps viridis ac cereæ  
esse coloris cum liuenti sedimento.

## NOTAE EX PULS V.

Prægnātis pulsus arteriæ in princi-  
pio validus ac magnus erit, authore  
Cōstantino, sed circa finem pariens  
ac spissus tactu percipitur.

## NOTAE SEX V S.

Si mulier masculum gerat colora-  
tior est, ac moderati vultus, læta quo-  
que, agilis, velox, sine ciborū, vt plu-  
rimum, fastidio, & reliqua vtero ge-  
rentium minima adsunt, si stans am-  
bulare velit primo dextrum pedem  
mouet, oculus quoque eius dex er  
latus magis, ac motus est velocioris  
sinistro, alius rotunda est, mamma  
dextra tumidior, cuius papilla boni  
est coloris à qua lac defluit. Si in so-  
le lac dictæ papillæ speculo aut rei  
bene politæ imponatur, rotundum



cernitur margaritarū aut argēti vi-  
ui modo, quod iniiciatur lac ipsum  
in aquam, aut in ipsius mulieris vri-  
nam fundum petet, grauedo pōdūf-  
que sentitur à muliere in latere dex-  
tro, in quo & sepiissime mouetur.

Contraria accidunt, si mulier fœ-  
minam vtero gerat.

Nati venam vmbilicalē inspice, Aui. 2 r.  
3. 2. c. de  
causis ge-  
minorū.  
quot enim rugæ seu nodi in ea fue-  
rint, tot iterum fœtus mulier cōci-  
piet, & si nulla nullū. Quod si ruga-  
rū vna ab alia distās multū fuerit, in  
ter illos fœtus nascituros longa erit  
tēporis intercapedo, si vicinæ sit, citò  
vtero geret. Rugæ item nigræ aut ru-  
bræ masculos, albæ fœminas arguūt.

#### PREDICTIONES.

4. aph. 1.

Vtero gerentes sunt medicandæ,  
si materia turget, quarto mense, &  
vsque ad septimum, sed has minus.



Gal. in  
commen-  
tario.

Inuiores autem & seniores vereri oportet. Ad vteros foetuum connexus eandem habent proportionem, quam fructus ad plantas. Hi siquidem in prima generatione debiliores capitulis continentur, & ideo facile decidunt, quando vehementior ventus ipsos concusserit, post hac aucti difficilem habent à placentis dissolutionem, sicuti rursus quum perfecti sunt, sponte sua sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo & conceptus, in primo quidem tempore seminis iniectionis, si aliquando saltare contigerit mulierem, aut in lubrico cadere, siue quouis alio modo, vel secundum animam, vel secundum corpus moueri vehementius, facillime disrumpuntur: sic quando & iam perfecti sunt. Tempore verò in termedio firmiore habent coalitum,



quare mulier vtero gerēs potest fortiores motus sustinere, sine foetus offensione. Quæ omnia Hippocrates noscens, rectè inquit: Vtero gerētes sunt medicandæ, si materia turget quarto mense vsque ad septimum, quod est in medio tempore foetationis, quum foetus vtero firmiter alligatur. Non tamen omnes quæ hoc tempore indigēt purgatione, permittit purgari: sed si materia turget, inquit, hoc est cogat accellerare, tractum enim vocabulum ab animalibus ad coitum concitatis, quum superabundantes humores mouētur, & per totū corpus deferuntur, nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manum porrigēte, & hunc humorum motum ad alium deducente. &c.



Seranus.  
Hipp. lib.  
de foetu,

Certo tempore mulier concipit,  
aut incipiente sanguine, aut deficiē  
te. Saltus in primis, 7. diebus peri-  
mit semem in locellis & eiicit. In-  
fans nisi latū locum habeat, quo nu-  
triat, agitur, crescat, macilentū  
fieri necesse est, ut pote qui satis am-  
plum locum ad incrementum non  
habeat. Eadem ratio est, cur mo-  
do parui modo magni nascantur in-  
fantes. Semper fere sani & integri  
ex mutilis generantur. Quemad-  
modum cucumeres & arbores, &  
alia quaedam germina, si compri-  
mantur, & in augustis creuerint lo-  
cis, partim mutilæ, partim tortuosæ  
proueniūt. Ita & foetus in vtero, iux-  
ta ea quæ matri cōtingūt, vel mutila-  
tur, vel nō recte crescit. Mulier quū  
concepit, semen extra locellos non  
exilit. Fœmina quum conceperit,

Hipp. lib.  
de natu-  
ra pueri.



menscs non defluunt, siquidem fœtus sanus futurus est, præter quod pusillum quibusdam primo mense.

Mulierem vtero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, letale est. 5. ash. 30.  
Galenus.

In hoc enim duplex est periculū: Vnum quidem propter febrem ipsam fœtum occidentem: Alterum verò quòd ex longo interuallo cibum dantes ex alimenti defectu fœtum destruemus, si verò ut seruemus hunc non verebimur crebro cibum exhibere, febres cōtinuas victu intempestiuo augentes, mulierē grauidā occidemus, sic & si absque febre aliquis alius morbus acutus fiat veluti morbus comitialis, morbus attonitus, conuulsio, distentio, propter magnitudinem morbi & acutiem impossibile est laborantem euadere.



5.aph.3.1  
Gal.

Mulier vtero gerens sanguine misso é vena abortit, & magis si foetus sit maior. Ex defectu alimentis foetus destruitur, non modò misso sanguine é vena, sed etiam ex longiori inadia. Non absque ratione autem & maior foetus magis destruitur misso sanguine ex vena mulieris, quia plurimo indiget alimento. Mulieri vtero gerenti si alius plurimum profluat, periculum est ne abortiat.

5.aph.37  
Gal.

Mulieri vtero gerenti si mammae graciles repente fiant, abortit. Hic pariter aphorismus ex illorum numero est, quos diximus defectum alimentis foetui significare. Còmunes enim quaedam venae sunt māmīs ac vteris, quae ubi parum habuerint sanguinis, graciles quidem mammae ostēdunt, inadia verò nonnū-



quam foetum perimunt, nonnumquam  
verò ad excretionem excitant, illam  
ob causam quam ipse in libro de na-  
tura foetus per hæc verba explicat.

Alimentum atque auctio à matre ve-  
niens, non adhuc est sufficiens infan-  
ti, quando decem menses præterie-  
rint, & foetus auctus fuerit: trahit  
enim à sanguine ad se id quod dul-  
cissimum, simul autem & lactis par-  
te aliqua fruitur. Vbi verò hæc il-  
li rariora fuerint, & iam infans mo-  
lem corporis habet, plus cibi requi-  
rens quam illud quod adest, calcitrat  
& membranas disrumpit. Liquet  
igitur, quod & ante decem menses  
foetus est indigens alimento, & cal-  
citrans, & membranas disrumpans,  
initium partus matri affert.

Mulierem utero gerenti si altera s. aph. 38.  
mamilla gracilis fiat, geminos habere

y



ti alterum abortit, & siquidem mā-  
ma dextra gracilis fiat, marē: si ve-  
rò sinistra, fœminam.

5.aph. 43  
Gal.

Mulier si marem concepit, bene  
colorata est: si verò fœminam, malè  
colorata. Vt ad seipsam muliere  
collata videlz, non autem ad alterā,  
dictum est ab Hipp. indicium, quod  
ex bono colore ac malo sumitur.

Nam quæ fœminā concepit, minus  
seipsa colorata apparet, quoniam fri-  
gidior est fœmina mare: nunquam  
verò talem concepisset, nisi viri se-  
men, vel uterus mulieris frigidior  
eo tempore fuisset, in quo concepit:  
quare quod dicitur, ex eorum nu-  
mero est quæ sæpius eueniunt.

Contingit enim ita omnia rectè age-  
re mulierem post tempus conceptio-  
nis, quòd bene colorata fiet. Liquet  
autem, & quòd alia signa sunt marē



esse cōceptū, sicut ipsius conceptus plurimæ ac validæ motiones quæ nequæ ipsæ signa perpetua sunt. Cōtingit enim aliquādo licet sit rarum, quod cōcepta fœmina sit mare robustior, & multis ac validis motibus moueatur, & aliquādo mas sit debiliior fœmina, ac paucioribus debilibusque motibus cieatur. Si mulieri grauidæ invtero sit erisipelas, letale. *s. aph. 43*

Quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerunt, abortiunt priusquam crassescant. *s. aph. 44*

Quæcunque mediocriter corpora habentes abortiunt secundo aut *s. aph. 45* 3. mense sine occasione manifesta, his acerabula vteri plena muccoris sunt, & non possunt ex pondere fecrum continere, sed disrumpuntur.

Sine manifesta occasione aut si brevehemente, & alii fluxu, vel proflu- *Gal*



uio sanguinis, vel orysselate in ipso utero constituto, vel saltu grauidæ mulieris vehementiore, vel clamore, vel ira, vel timore, vel victu parciori, vel tali aliquo actu, seu passione. Fit enim verisimile in his esse plena mucore ora vasorum venientium ad uterum, ex quibus secundæ patent: quæ ora acetabula nominauit, non sicuti quidam arbitrantur adnatas ipsis carnes adenosas.

Nam uti ipse inquit in primo lib. de passionibus muliebribus: Si acetabula plena fuerint pituita, menstrua fiunt pauciora. & Praxagoras in primo de naturalibus: Acetabula autem sunt ora venarum & arteriarum, quæ ferunt ad uterum.

Quæ utero gerunt, his uteri os comprimitur. Maximum hoc est mulieris quæ concepit indicium, si obste-



trix potuerit immisso digito os vterorum tangere. Statim enim quum semen intra seiplos acceperint, totū sui interius contrahunt spacium & claudunt os. Videtur autem & propter durum tumorem & inflammationem os vteri comprimi. Distinguitur autem ab eo qui in grauidis ex duritie vteri.

Mulieri vtero gerenti, si lac multum ē mammis effluat, foetum imbecillem significat: si verò māmæ solidæ fuerint, foetum significant saniores. Quæ corrupturæ sunt foetus, his māmæ extenuantur. 5. a. h. 52

Si verò rursus duræ fiant, dolor aut māmās, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpent.

Vide commentarios Gale.

Quæcumque vtero gerentes à febribus corripuntur & fortiter cale- 5. aph. 55.



sunt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur.

Gal.

Accidit quibusdam grandis in quibus vitiosi humores priusquam conceperint sunt acervati, nonnumquam à febris vehementibus corripiti, ita quòd ex necessitate abortiunt nonnumquam verò mediocribus. *f* Sed quum non purgentur sufficienter, aliquid superest reliquiarum humorum in corpore vitiorum, ex quibus febres sunt constitutæ, ut potè non potentibus medicis mulieri gravidæ aliquod forte auxiliū adhibere, neque exquisita victus ratione in ipsis uti. Ob hanc igitur causam febris in ipsis frequenter reuertitur, & magna temporis pare graviter se habent. Non sine ratione igitur fœtus aliquando nequit obsistere, sed



ex febre, & vitio humorum corrum-  
pitur, nonnūquā verò perdurat qui-  
dem vsque ad tempus partus. Sed  
quum & ipse valetudinarius sit, vt  
qui longo tempore laborauerit, &  
quum matrem habeat imbecillem,  
non sine periculo paritur. Nam ad  
bonum partum, duorum corporum  
vigore est opus, & grauidæ mulie-  
& infantis. Si mulieri vtero gerē-  
ti purgationes eant, impossibile est  
foetum esse sanum. 5.aph, 6.

Mulieri vtero gerenti, si tentio 7.aph.  
superuenerit, facit abortum. Circa 27.  
Gal.  
intestinū quod rectum nominatur  
tentio fit, eandem habens causam  
ac dispositionem, quam in difficul-  
tatibus intestinorū suscipit aliquod  
ex his quæ superius iacet intestina.

Hæc autem passio nomen accepit,  
vt inquiunt, ab illa quæ fit in ea ten

y iiii



tionē, ob quam quum cacare vehementer appetant, continuē exurgūt. Ob talem igitur tentionē atque molestiam, & totum aliud corpus laborat, sed præ cæteris vterus qui cognatus est recto intestino. Nihil autem mirum, si propter vehementes atque frequētes exurrectiones ac tentiones conceptus abortitur, quando & ex aliis omnibus fortibus motibus atque doloribus mulieres gravidæ solent abortire.

Infans in vtero sic continetur. Summa pars clunibus continuatur, genua oculis sunt apposita: vnde & concaui exeunt, & genæ dicuntur.

## ABORTVM FAC-

cientia.

Si hyemis australis & pluuiosa &

3. aph. 13.



serena fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus ad ver inest, ex quacunque occasione abortiunt. Quæ verò parient, imbecilles & morbidos infantes pariunt: quare vel statim intereunt, vel tenues & valetudinarii viuunt. Gal.

Corpora siquidē humida, ac mollia & laxa facta, hyeme serena ad intimas sui partes aëris ambientis frigiditatem facile admittūt. Ita quod quicumque infantes longo tempore calori sunt assueti, percussī vehemēter à frigore, non absque causa, hi quidem iam mortui in ipso vtero sunt, hi verò in ipso partu moriuntur. Qui verò viui in lucem eduntur, non ferentes subitam ad contrarium transmutationem, vel breui post tempore moriuntur, vel exiles, atque insalubres creati, vix in



vita perdurant.

Gal. lib. 3 de natu-  
ralibus 2.  
facultati  
bus. Aborsus triplex est causa, aut moles  
nimia, aut pondus aliquod, aut mor-  
sus. Moles, vbi amplius disten-  
di vterus non tolerat, pondus, quā  
supra vires eius sit quod continet.

Morsus, vbi vel humores qui prius  
in membranis continebantur, his  
ruptis in ipsum vterum sunt effusi,  
vel etiam totus partus corruptus &  
putris, ac in noxiam saniem dissolu-  
tus, vteri tunicam eius occasione  
irritat, ac mordet.

## SIMPLICIA ABOR-

tum facienti a Ex plinio.

Elaterium grauidis abortum facit,  
Plinius. lib. 20. c. 2. Olympias the-  
bana, maluas abortiuas esse cum a-  
dipe anseris, Plinius. lib. 20. c. 21.

Cypero foetas foeminas, quidem



abortus facere nō dubitat Apollodorus. lib. 21. c. 13. Polio abortum fieri poto. lib. 21. c. 20. Portentum est quod tradunt cedri succo abortiuū fieri in venere ante perfusa virilitate. lib. 24. c. 5. Tantum inest semini dracunculi virus, vt olfactum grauidis abortum inferat. lib. 24. c. 16. Prægnans si edat onosma, aut supergrediatur, abortum facere dicitur. lib. 27. c. 12. Viperam mulier prægnans si transcenderit, abortum faciet. lib. 30. c. 13. Si castoreum fibrumve supergrediatur grauida, abortum facere dicitur & periclitari partus si superferatur. lib. 32. c. 10.

Si prægnans radicem cyclamini transgrediatur, abortū fieri tradunt. lib. 15. c. 9. Neutra filicum danda foeminis, quoniam grauidis abortū, cæteris sterilitatem facit. Plinius



# NUTRICATVS QVO alendæ sunt grauidæ.

Paulus. Utantur itaque præfenti commo-  
lib. 1. C. 1. ditate, in ambulationibus, alimen-  
tisque haud magnam partem suavi-  
bus, rufi coloris falerno, quod pari-  
ter & ab odore cōmendetur, in pri-  
mis autem lustrico: cæterum pota-  
tioni perpetuó non nisi mediocri  
indulgeant. Quippe hæc omnia tum  
superfluitatum saburram, tum cre-  
bram quoque vomitionem non di-  
co compescere, sed arcere etiam cō-  
sueuerunt. At qui medicamentorū  
in eadem affectione prouinciā pul-  
chrè subeūt, sanguinalis herba, quæ  
πολύγανον græcè vocatur, aqua  
elixa & epota: pariter & anethum,



radixque pontica, vernaculo ab indigenis gentis suæ vocabulo Rha appellata, hæc indiscriminatim tam antè, quàm à cibo, cum prima tum secunda mensa, sumi vtiliter possūt.

Aërem vtero gerens colat temperatum, pauco tribus primis mensibus vtatur exercitio, somno indulgeat modesto, aluus sit probè cita.

### CLYSTER.

Si oletula non exeant, iniice clysterem pulli iure medullâ cassiarum saccharo & oleo concinnatum.

### PURGATIO.

A quarto mēse vsque ad septimū si materia turgeat, authore Hippocrate, medicamento non violento purgetur, verbi causa, cassiæ fistularis medulla, pulli decocto macerata, aut manna. Vel ex his addito sac-



charo & auro bucellatum cathartici-  
cum conficere potes.

## VENAE SECTIO.

Quamquam Hippocrates Gale-  
nūque dixerint abortum pati mulie-  
res utero gerentes, si sanguinem ē  
vena miserint, passim tamen video  
medicos, quarto, quinto & sexto  
mense axillarem venam, interdum  
medianam, & quam saluatellam vo-  
cant audacissime incidētes his qui-  
bus opus est, nec propterea perit  
foetus.

## CATAPLASMATA

& emplastra.

**Aegineta** Forinfecus autem prae cordiis  
ænanthen, sylvestris punice florem,  
balaustium, trifolii (quod cytisori  
vocant) ac smyrnii coman, foenicu-  
lique semen, cataplasmatibus modo



applicare expedit. Neque vel tantillum interest vtrumque misceas, cū palmulīve, an vino veteri, modo loco prædicto imponas. Hostioli præterea ventriculi lāncinationibus (quos *καρδίαμους* græci nuncupant) aquæ calidæ potio, deambulationes tranquillæ, præcordiorūque quod è molliori lana conficitur, sceparnon, sæpe numero succurrunt. Si ex debilitate renū & ligaminū abortum metuas, post inunctiones ceratum istud deferat, quod. R̄. Mastiches ʒ. f. ladani. ʒ. ʒ. core citrinæ. ʒ. 2. bistortæ, galbulorum cypressi, hypocystidis, acaciæ, sanguinis drac. terræ lemnia, rosarum rub. glebæ armeniacæ. an. ʒ. 1. f. concinna ceratum oleo myrthino & terebinthina exceptum, corio imponatur.



Cæterum si renes viribus ex frigore destituantur, loco prædicti cerati sequens admoue, ℞. Mastiches. ʒ. 6. ladani. ʒ. 3. f. ceræ citrinæ, colophonix, picis naualis, styracis. an. ʒ. 1. f. galbulorum cypressi, menthæ, galagæ, galliæ moschatæ, thuris chalbanes, commi, myrrhæ, an. ʒ. 1. f. fiat ceratum, addendo ubi opus est terebinthinæ quantum sit satis.

# PICAE SEU MALA-

tiæ & fastidii cura.

Fastidiosas & ab eduliis appetitus auersione laborantes, diuersi generis dapibus vesci, amilo arido, hoc est placentis, aut aliis nonnullis ex tritico esculentis, genioque liberiùs indulgere hortando, restitues. Peculiariter verò & magnificè hæc grauidis conferunt, quæ tellu-



ris glebam deglutire gestiūt, quem-  
 admodum in malatia, quam græci  
 κίτλη id est pican indigitant, quæ  
 circa tertium à conceptu mensem Aegineta  
 ideo plærumque ingruit, quod ne-  
 queat tum partus ob imbecillitatē,  
 omne quod à locellis nutrimenti  
 causa recipitur, neque conficere, ne-  
 que consumere superuacanea, ob  
 eam causam, ac varia in stomacho  
 retrimenta (quibus περιττώματα  
 græcè nomen est inditū) veluti stru-  
 es congeruntur: vnde tam diuersa-  
 rum, tanquam portentosarum rerū  
 nascitur prægnantibus appetitus:  
 Verbi gratia, carbonum extincto-  
 rum, cretæ cymoleæ, & id genus in-  
 numero forum ferme: ex qua ratio-  
 ne nomenclaturam hanc id malum  
 inuenit, ob picturatam illam scilicet  
 eius avis varietatem, vel quod isti-



usmodi affectus illam subinde auē  
 impetat. Aescæ porro desiderium,  
 exercitationes, & longiusculæ pere-  
 grè profectioes restituunt. Quòd si  
 qua prægnaus mulier genialiter vi-  
 ctitare, lautiúsque cuticulam curare  
 assueuerit, hæc subitas nulla com-  
 moditate subibit motiones. Datur  
 præterea cibum abhorrentibus non  
 nunquã potus acrimonia quadã im-  
 butos, præsertim sinapi degustare.

Gal. lib. I.  
 de sympr.  
 causis.

Prauas qualitates appetūt. 2. qui-  
 bus ventriculi tunicæ prauo aliquo  
 excremento sunt imbutæ. Atque cō-  
 sueuit huiusmodi affectus mulieres  
 vitiosis humoribus refertas infesta-  
 re, idque quum vtero gestant, vo-  
 catur pathos ipsum Citta (id est pi-  
 ca, siue Malatia) appetunt autem  
 maximè per hunc affectum & acida  
 & acerba, nonnunquam acria quo-



que. Interdū vel cimoliā terram, vel  
testas, vel extinctos carbones, aut ali  
os huiusmodi cibos absurdos. Atque  
cōplures earū huiusmodi vitio labo  
rant vsque ad secūdū ac tertiū mē  
sem. In quarto verò quiescunt, par  
tim quòd vomitione vitiiati humo  
res expurgantur, partim quòd con  
coquūtur, vt pote exiguum cibi, tum  
sumente muliere ob fastidium, par  
tim etiam quòd multitudo vacua  
tione sit immunita. Quippe primis  
duobus mensibus foetus paucum ad  
se sanguinem attrahit, eo quòd pa  
rum adhuc auctus sit adeo vt ne fœ  
tus quidem nominari tum debeat,  
sed cyema potius (id est conceptus)  
Vbi verò iam increuit, tum pluri  
mo indiget alimento, atque tum nō  
id quod optimum est è venis, allicit:  
verumetiam quia maiorem alimē



ti copiam requirit, aliquid vitiosi simul attrahit. Ita fit, ut vniuersū corpus & plethoricon (id est plenum) esse desinat, & minori humorū vitio crucietur. At foetus ipse excrementa quæ ab attracto redundant alimento, ad duas reponit mēbranas. Quò fit ut ipse quoque & maiori humorū vitio, & maiori intemperie infestetur, quandoquidē à vitioso sanguine alimentū sumit, nisi grauida mulier residuo, quo vterum gerit tempore, optimis utatur cibis. Malacia viri etiā nōnunquā accidit, quando ipsis quoque vitiiati humores ad ventriculi osculū defluunt. Huiusmodi symptomata circa alimenti appetentiā euenire solent. Fit fastidiū eadē, qua pica, ratione, læso ore ventriculi in mulieribus grauidis. Cōtingit autē propter vitiosos humores totū cor



pus occupātes tale aliqui d'accidere:  
verūm hoc cū horrore & febre pati-  
untur, & his distingūtur à grauidis.  
Hæc Gal.in commētario. 61. sentē-  
tiæ quintæ sectionis. Si mulieri ces-  
sent purgationes, neque febris.&c.

## VNGVENTA.

Ventriculi os in malatia ante pran-  
dium hoc inungito vngvine, pannū  
calidum superponendo. R̄. Olei  
spicati. ʒ. ʒ. mastichini, olei ex coto-  
neis. an. ʒ. ʒ. friamētorū corallii rub.  
caryophyllorū, mentæ ficcæ, calami  
odorati, galliæ moschata. an. ʒ. ʒ. ce-  
ra excipiantur in vng. ʒ. Si discu-  
tere cupis flatus, ilia & aluum inun-  
ge oleo lilino composito. Si renes ex  
calore debiles fuerint, R̄. Olei myr-  
thini. ʒ. ʒ. ʒ. olei. rosacei, olei ma-  
stich. succi plantag. aut sedi. an. ʒ. ʒ. ʒ.  
friamenti glebæ armeniacæ, terræ

z iii



lénia, hordei vsti, santalorū rub. acā  
cia, fructuum myrti, hypocystidis,  
fructus oxyacanthæ. an. 3. f. cera ex-  
cipiantur in vnguētum, addito pau-  
co aceto.

## ECLEGMATA ET pulueres.

Diamargariton vtraque cōfectio.  
℞. Conseruæ ros. cōseruæ vtriusque  
buglossi. an. 3. f. diamargariton. 3. 4.  
margaritarum. 3. 2. fragmentorū la-  
pillorū preciosorū cōmuniū. 3. 1. co-  
rallii rub. 3. 2. trita subtilissimè misc.  
& cum serapio rosaceo addito auro  
fiat confectio, dato cochlear.

Si adsunt flatus. ℞. Cinnamo-  
mi electi. 3. 1. caryophyll, nucis mos-  
chata, cardamomi. an. 3. 2. zingibe-  
ris. 3. f. piperis. 3. 1. croci. 3. f. friato, &  
friamento saccharo misto vtitor cū  
cochleare.



## VICTVS.

Arnaldus nouauillanus hanc  
vini confectionem pro foetu reti-  
nendo in vtero descripsit. R. Zin-  
giber. caryophyll. an. 3. 1. spiced. pipe-  
ris albi. an. 3. f. galangæ, anisi, carei.  
an. 3. 2. fiat vinū aromaticum addito  
saccharo, quod diluatur aqua deco-  
ctionis vuarū passarū aut glicyrhizæ.

Caueat vtero gerens à labore, ex-  
ercitio vehementi, saltu, tussi, coitu,  
balneo, frigore externo, ira, tristitia,  
timore, vomitione forti, rebus acu-  
tis & amaris, vt sunt cappares & oli-  
uæ acerbæ, ab his quæ menses cient,  
& abortum faciunt.

Si aliquid tamen ardentè desi-  
deret, id non est prorsus denegan-  
dum, & si non conueniat.

Cibi boni succi exhibeantur,  
Vinum propinetur odoratum, ma-

z iiii



turum, non album, sed parum tendens ad fuscum.

Vtatur fructibus maturis abstrinentibus, cuiusmodi sunt cotonea, & pira, mala punica, nuces ponticæ tostæ, castaneæ, limonium pomum, malum aureum quod arangiam vocant Galli.

Vitet porrum, allium, cepas, sinapi, cicera arietina, petroselinum.

Deforat preciosos lapillos.

Verbi gratia, sapphyrum, hyacinthum, corallium, corneliam, adamantem, tursciam.&c.

## CONTRA PEDVM

tumores prægnantium.

*Aegineta* Aduersus pedum tumores, præsentissima cum vtilitate, solastrum, quam authyllidem vocant, in aceto maceratū, & brassicæ latioris folia,



nec non & creta cymolea ex aceto  
illita, alumen pariter ex aceto, adhi-  
bentur. Profunt item mala medica  
siue citrea, in aqua lauandis pedibus  
elixa. Brassicas in æquali vini &  
aceti quātitate coquito, & eo pedes  
tumentes foueto, aut emplastri mo-  
do imposito, vel cymoleam fabro-  
rum ferrariorum aqua macerato,  
addito pauco aceto, & illinito.

Arabes.

Vel rosaceo, aceto & cymolea si-  
mul confusis pedes illine.

Papyrus aceto soluta imponatur.

Dracuntii folia etiam admota uti-  
lia sunt. Vel foueantur pedes de-  
cocto ramenti cornu cerui aceto &  
vino macerat.

## DIFFICULTAS

partus, *Ausonia.*

CAUSAE.



Gal. lib.  
defi.  
medi.

Partuum difficultates tribus modis eueniunt, in prægnante, in foetu, & in exterioribus. In prægnante, quum irascitur, zelotypia laborat, vel molestiis, vel alio affectu. Si meatum plus iusto angustiores habet, aut pinguiorem, tum primū parit, aut minimè amplam habet vuluam cōparatione partus. In pariēte, quādo abortū parit, aut gemellos, aut mēstruosū quippiā, extrinsecus hystericæ aut æstatis supra modum vehementi, torrentive pariendi difficultas nascitur, vel culpa parentis, vel culpa foetus, vel chorii vitio. (Est autem chorion inuolucrum, quo partus in vulua parentis inuoluitur) vel per ea quæ foris accidunt. Gignentis quidem culpa, aut propter crassitiem & pinguedinem, aut ob arctam & exiguam matricē vni-



uerſam, aut dolorem immenſum,  
aut dilam vlcus, aut ob animum  
puſillum, aut inflammationem ma-  
tricem occupantem, aut aliud mem-  
brum, aut quocumque alio morbo  
affectam, aut ſuapte natura valetu-  
dinariam, vel viribus deſtitutā, ex-  
trudere foetum non valentem, aut  
ante legitimum parturitionis pun-  
ctū parientē. Itē ſi os ceruicis vteri  
obliquū fuerit, aut eidē caro aliqua  
ob vlcus quod præceſſit adnata ſit. Arab.  
Vel quia puella citius quā par ſit  
parit, aut non cōſuevit vtero gerere,  
vel quia annosa annūſve eſt: nā an-  
nis conſectæ difficillimē pariunt.

Culpa verò foetus, vel quum ſu-  
pra modum ingens eſt, aut nimium  
puſillus, & nec magnopere ponde-  
roſus, aut ampliſſimi capitis, aut mō-  
ſtrum: verbi cauſa, biceps, aut mor-

Aegineta



tuus, aut viuens quidem, sed imbecillis, neque potens in lucem progredi, aut quòd complures partus sortita sit: quinque namque simul in vtero haberi posse asserit Herophilus, & repente omnes simul collo vteri impingantur, aut quòd non naturaliter dispositus sit, neque ad exitum quadrans corporis figura, seu habitus. Est enim uero naturale foetus in lucem edendi schema. Primū quidē & præcipuū ebrii schema in caput manibus in foemora dispositis, porrectis & extēsis, & ne paulū quidē perperā declinās, rectā os versum caput porrigens.

Secunda verò foetus forma, rectā in pedes, ne tantillum quidem ab eo tramite declinans probatur.

Præter hæc duo, omnia cætera in lucem edendi partus præter na-



turam, ne monstrosa dicam, existūt schemata, vt si caput in dextram aut sinistram vteri partem inclinat, vel si altera, aut vtraque manus exeritur, cruráque interius à se inuicem diducuntur, aut si foetus altero pede prodit, altero interius retento: aut si duplicatus alicui vteri parti innittitur.

Vitio autem membranæ chorii puerperii difficultas fit, vel quum non auellitur propter crassitiem, vel quum antequam conueniat auellitur, ob tenuitatem & macilentiam: humore siquidem qui in vtero collectus fuit, vacuato, ægerrimè delabetur embryon propter ariditatem.

Si quæ extrinsecus occurrant, in causa ægræ parturitionis sunt, siue frigore condensante, siue calore immodico disiciente potentiā, aut alio



quoque euentu incurfante.

Cauſæ externæ ex parientis & aſſiſtentium ſermonibus cognoscuntur.

## NOTAE:

Fuchſ. ex  
philonio.

Debilitas quoque parientis, veluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus facile in imbecillitatis cognitionem veniemus. Foetus imbecillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur, qui si mortuus fuerit, à motu prorsus cessat, ventris frigiditas adest, atque dolor iuxta vmbilicum grauis, spiritus exhalatur foetidus, faciei color prauus.

Magnitudo foetus ex parentum corporis constitutione, ac ventris parietis mole coniicitur. Craſſities ſecundæ inde colligi poteſt, quod prædictorum ſignorum nullū adſit, & par-



turiens robusta, facilisque foetus motus sit.

## PRAESAGIA.

4 Vide prædictiones in capite de conceptione foetus præscriptas.

Mulier post annū quintū & vigesimum primò cōcipiēs, difficulter pariet. Pinguis mulier sicut difficile concipit, ita & agerrimè parit.

Si dolor vētris imas partes tētat, cū pariētis virium robore, & nulla adsit anhelandi difficultas, in muliere tēperaturæ & ætatis mediocris, bono est. Si dolor ad ilia & os sacrū tendit, difficillimè pariet.

Mulieri quæ vterinis molestatur, aut difficulter parit, superueniens sternutatio, bonum.

Quæcūque vtero gerentes à febris 5. aph. 35. bus corripuntur. &c.

Vide in. c. de conceptione.



Mulieres quæ in nauibus pariunt, mutos edunt. Primiparæ, & quæ rarius pariunt, plurimū in partu & puerperio laborāt, quæ verò cræbrius pariunt, minus. Oscitatio in enixu letalis est. Plinius lib. 7. c. 6.

## PARIENDI RATIO.

Aegineta Obasam mulierē in lectulo pronā, hoc est in caput propendētē, & vultu in terrā deiecto figurare oportet, flectentē inclinātēve genua ad fœmora, quo vterus ad abdomen tendēs, ē directo oris sit. Digitis verò pinguedinibus, verbi gratia, butyro, oleo, axūgia anatis, gallinæ & similiū, delinire os oportet, & sensim dilatare. Quod si igitur astrictioni aut densitati quasque cuneationi difficultatis pariendi culpa imputatur, laxatione primitus succurrito,



Infundens iugiter oleum dulce, & calidum, & elixationem fœnigræci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiã oua, laboris mitigandi gratia.

Deinde pubem cum epigastrio & lumbis cataplasmatibus modo illinito cum semine lini, aut melicrato, aut hydræleo, encathismatis præterea cõsimilibus : Insuper calamos id est laxationes balneis aquarum dulcium moliri oportet, præterquã si febris, aut alia quæpiam prohibeat occasio. Mouetõque parietem leætica sellæve, in aëre temperatè calido. Nonnulli verò concussionibus vehementibus ac violētis vtuntur, Sternutamenta adhibent, atque animo pauido existentem, quasique detrectantem, concitant quidem & exhortantur. Sed inexpertem dolores partus admonere expedit, vt cõ-

&



stanter ceu operæ precium spiritum  
 contineat, & validiore nisu concep-  
 tionem ad os vteri protrudat. Atqui  
 Syncope. sensum non tentatibus odoramen-  
 tis animo deficiens recuperanda &  
 recreanda est, refocillata verò me-  
 diocriter nutrienda est alimento  
 haud multo.

Quod si Inflammatio, aut alius  
 quispiam morbus vterum infestare,  
 huic etiā ex propriis capitibus suc-  
 currendum, ac prospiciendum erit.  
 Vbi infans præmagnus fuerit, ea ad-  
 hibenda quæ dilatare & laxare os  
 vteri possunt. Vbi autē præter na-  
 turam conformatum embryon est,  
 schematismum naturalem reddito:  
 nunc quidem impellendo, nunc ve-  
 rò adducendo, nunc flectendo, nunc  
 verò dirigendo, Et si quidem manū  
 prætendit, aut pedem, nulli membro



apprehensum arripere: magis nāque obstruitur, aut debilitatis artubus impotens euadit, aut etiam frangitur interdum. Sed digitos ad humorum aut coxendicum foetus trahendo, denuo prominētem infantulum in iocum suum reducito.

Porro si cum oris vteri compressione, totius infantis indecora fuerit figura, rursus ab ore vteri in superiora quamprimum eundem attolito: deinde comprehensum denuo in os ipsum dirigito.

Si autem gemini aut terni, pluresve fuerint, ac ceruicem vteri obsederint, reliquos propellere ad fundum vteri oportet, & eum qui magis paratus videbitur, prius educere, verum cuncta paulatim, & absque partus ruptura facito, oleo perfundens locos. Opportunum porro tem  
& ii



pus in sedis lecticam est, ubi matricis ostium apertum subcidit digito, inclinátque pro ruptura.

**Fuchsius** Porro si foetus tunica, seu secunda crassior fuerit, ac solidior quàm ut rumpi possit, dissecanda erit. Quibus autem humor in tunicis contentus, ante congruum tempus effluxerit, ita aut loca exaruerint, ouorum albuminibus cum maluae aut foenigræci decocto excolato, aut ptisanæ cre more tepido perfundemus.

**Aeg. lib.**

6.

**Actius**  
**lib. 16.**

Verùm si non procedat, quòd infans mortuus sit, aut caput nimis magnū, vel etiā aliā ob causā ad foetus extractionē seu sectionē, quam græci ἐμβρυοέλκισμὸν appellant, veniendam est.

## PARTVS IV VAN-

tia ex Plinio



Partus putant semine cucumeris syluestris iuuari, si in arietis lana alligatum inscientis lumbis fuerit, ita vt protinus ab ea eximatur & rapiatur extra domum ipsam. lib. 20. c. 1.

Bulbi hortensii partum accelerant cum sapa, aut passo sumpti, lib. 20. c. 9.

Secundos partus ciet apii semen, lib. 20. c. 11. Seseleos folia vtilia sunt, vt quæ partus adiuuent etiam

quadrupedum. lib. 24. c. 5. Suffitu alii secundos partus euocari existima-

uit Hippocrates, lib. 20. c. 6. Cunilago mollis montana serpillio similis purgat à partu mulieres, lib. 20. c. 16.

Dalion herbarius parturientibus ex aniso cataplasmata iposuit cū opio, lib. 20. c. 17.

Parere quoque facilius anisum olfactantes, & statim à partu dandum potui polenta asper-

sa, ibidem. Constat parturientes fo-

& iii

& iii



DE MORB: MVL.

his maluarū substratis celerius solui, protinus à partu reuocanda, ne vulua sequatur. Dāt & succum malnae bibendum, parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina, lib. 20. c. 21. Caulis & folia ænanthes herbæ cum melle ac vino nigro pota, facilitatem pariēdi præstant, secundasque purgant, lib. 21. c. 24. Sonchī succus trium cyathorum mēsurā, in vino albo & oleo calefactus, adiuuat partus, ita vt à partu ambulent grauidæ, lib. 22. c. 22. Palma suffitu partus extrahit, lib. 23. c. 5. Sunt qui celeritati partus multū conferre putent, radice lauri acetabuli mēsurā pota in aqua, efficacius recen-tem quàm aridam, lib. 23. c. 8.

Laurus Alexandrina siue Idæa, partus celeres facit, radice pota triū denariorum pondere, in vini dulcis



cyathis tribus, secundas etiam pel-  
lit, ibidem. Galbanum bibitur & in  
difficili partu fabæ magnitudine in  
vini cyatho, vuluâsque cōuersas cor-  
rigit, lib. 24. c. 5. Chamædaphne par-  
tus difficiles cit in lana apposita,  
lib. 24. c. 15. Lingua herba quæ nas-  
citur circa fontes, cribro in limite  
abiecto herbæ intus extantes de-  
cerptæ adalligatæque grauidis, par-  
tus accelerant, lib. 24. c. 19. Diocles  
difficile parientibus semen fœnigræ  
ci debet acetabuli mensura tritum  
in nouem cyathis sapæ, ad tertias  
partes bibere, vt qui biberint in ca-  
lida lauarentur. Et in balneo sudan-  
tibus dimidium ex relicto iterum  
dedit, mox à balneo reliquum, pro  
summo auxilio, lib. 24. c. 19. Beto-  
nica drachma bibitur in vini cya-  
this tribus contra omnia vuluarum

& iiii



vitia, aut quæ à partu fiunt, secundas  
 morantes, vel partus emortuos, ra-  
 dices panacis appositæ extrahunt,  
 Polemonia pota ex vino secundas  
 pellit. Centaurii maioris radix dera-  
 sa & apposita extrahit partus emor-  
 tuos. Præcipua dictamo vis est, par-  
 tus emortuos vel transuersos eiicit,  
 Bibitur ex aqua foliorum obolo, a-  
 deo ad hæc efficax, vt ne in cubicu-  
 lum quidem prægnantium inferatur:  
 nec potu tantum, sed & illitu & fuf-  
 fitu valet, pluribus autem modis &  
 aristolochia prodest: nam & menses  
 & secundas cit, & emortuos partus  
 extrahit, myrrha & pipere additis,  
 pota vel subdita, Secundas pota cis-  
 santhemus pellit, Mandragoræ suc-  
 cus appositus menses cit, & emor-  
 tuos partus. Daucum & menses &  
 secundas, potū facillimè pellit, Emor-



tua scammonium pellit, potum vel  
appositum. Radix è geranio, peculia-  
riter secūdis inflammationibúsque  
vuluarum conueniens, Artemisiæ  
radix pota intantum purgat, vt par-  
tus euectos extrahat, Menses & se-  
cundas cit ramorum artemisiæ de-  
coctum insidentibus, Item folia po-  
ta dragma. Ad eadem omnia pro-  
sunt vel imposita ventri imo cum  
farina hordeacca. Anthyllides duæ  
vuluis vtilissimæ, torminibúsque &  
secundarum moræ, in vino potæ.  
Radix verbenacæ pota ex aqua, ad  
omnia in partu, aut ex partu maia,  
præstantissima est, partus accelerat  
scordotis pota, drachma succi in a-  
qua mulsa cyathis quatuor. Dictami  
folia præclare dantur ex aqua, con-  
stat vnius oboli pondere, vel si mor-  
tui sint in vtero infantes, protinus



reddi sine vexatione puerperæ, Si  
 militer prodest pseudodictamū, sed  
 tardius, cyclaminos adalligata, cis-  
 santhemios pota. Item betonica fa-  
 rina ex aqua mulsa Plinius, lib. 26. c.  
 25. Anagyri, quam aliqui acopon  
 vocant, folia difficulter parientibus  
 adalligantur, ita ut à partu statim au-  
 ferantur quòd si emortuus hæreat,  
 & secundæ mensesque morentur,  
 drachmæ pondere bibantur in pas-  
 so folia, lib. 27. c. 4. Postilli ex pe-  
 riclymeno resoluti dati in vini albi  
 cyathis tribus, partum iuuant, se-  
 cundāsque pellunt, lib. 27. c. 12.  
 Smyrniæ radix partus adiuuat, & se-  
 cundas pellit, lib. 27. c. 13. Axū-  
 gia è Sue quæ non peperit, sincera  
 partus in abortum vergētes nutrit,  
 collyrii modo sublita, lib. 28. c. 9.  
 Tradunt ceruas cū senserint se gra-



uidas lapillum deuorare: quem in  
excrementis repertum, aut in vulua  
(nam & ibi inuenitur) custodire par-  
tus adalligatum: Inueniuntur & of-  
ficula in corde & vulua perquam  
utilia grauidis parturientibusque,  
lib. 28. c. 19. Tota oua adiuuant par-  
tum, cum ruta & anetho & cymio  
pota ex vino, lib. 29. c. 3. Partus euo-  
cat membrana e canum secundis, si  
terram non attigerit, cinis herina-  
ceorum cum oleo perunctarum cu-  
stodit partus, contra abortus. Facilius  
euitantur, quæ finum anserinum  
cum aquæ cyathis duobus sorbuere,  
aut ex vtriculo mustelino per geni-  
tale effluentes aquas. Vermes ter-  
reni grauidis secundas pellunt in  
passo poti. Inueniuntur & in grami-  
ne vermiculi, qui adalligati collo,  
continent partum, Detrahuntur au-



tem sub partu, aliâs enitti non patiuntur. Cauendum etiam ne in terram ponantur. Cochleæ in cibo sumptæ accelerant partum, Amphibæna viua in pixide, etiam si mortua sit, atque asseruata, partus faciles præstat, Anguium senectus adalligata lumbis, faciliores partus facit, proptinus à puerperio remouenda. Dant & in vino bibendam cum thure, aliter sumpta, abortum facit, Baculus quo angui rana excussa sit, parturientes adiuuat. Lapis ætites in aquilæ repertus nido, custodit partus contra omnes partuum insidias. Penna vulturina subiecta pedibus adiuuat parturientes, Ouum cerui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperos facit, lib. 30. c. 13. Cancræ fluuiatiles si partus stranguletur, poti ex aqua auxilian-



tur. Eosdem recentes vel aridos bibunt ad partus cōtinendos. Hippocrates ad purgationes mortuósque partus vtitur illis cum quinis lapa-  
thi radicibus, cum ruta & fuligine tritis, & in mulso datis potui. Ad secundas vti castoreo prodest, cum panace in quatuor cyathis vini. Mirū & quod de torpedine inuenio: Si capiatur cum luna in libra fuerit, triduóque asseruetur sub diuo, faciles partus facere, postea quoties inferatur adiuuare. Et pastinacæ radius adalligatus vmbilico existimatur idem facere. A viuenti ablatu sit ipsaque denuo in mare dimissa, Plinius lib. 32. c. 10. Crudus brassicæ caulis si edatur, partus quoque emortuos pelli. lib. 20. c. 9. Cicorium mulierum purgationibus quidem decoctum in aqua adeo pro



dest, vt emortuos partus trahat, lib.  
 20. c. 8. Ruta syluestris foemina-  
 rum etiam purgationes, secundasque  
 etiam emortuos partus, vt Hippo-  
 crati videtur, ex vino dulci nigro po-  
 ta, lib. 20. c. 13. Mentastrum potum  
 foeminas purgat à partu, sed partus  
 necat, lib. 20. c. 14. Pulegium secun-  
 das & defunctos partus eiicit, lib. 20.  
 c. 12. Si symbrium non edendū  
 grauidis, nisi mortuo conceptu, lib.  
 20. c. 22. quippe impositum etiam ei-  
 cit. Si emortui sint in utero par-  
 tus, thymi decoctum in aqua ad ter-  
 tias, lib. 21. c. 21. Anthemis pellit  
 mortuos partus, lib. 22. c. 21. Silphii  
 folia ad expurgandas vuluas pollen-  
 dosque emortuos partus decoquun-  
 tur in vino albo odorato vt biba-  
 tur mensura acetabuli à balneis, lib.  
 22. c. 23. Nostri herbarii partus



emortuos saluia apposita extrahunt,  
lib. 22. c. 25. Vino cognata res fa-  
pa est, musto decocto donec tertia  
pars supersit, Ex albo hoc melius,  
secundas, partusque emortuos tra-  
hit cū bulbis potum, lib. 32. c. 2. Gal-  
banum abortus non exeuntes tra-  
hit appositu vel suffitu, lib. 24. c. 5.

Chamæpitys mortuos partus, ex ace-  
to cocta potaque eiicere protinus di-  
citur, lib. 24. c. 6. Herba sabina par-  
tus emortuos apposita extrahit &  
suffitu, lib. 24. c. 11. Aron partus om-  
nium animalium extrahit, lib. 24. c.  
16 Leporis iecur illitum cum croco  
& porri succo, vellere appositū, abor-  
tus mortuos expellit, lib. 28. c. 19.

Si mortuus partus sentiatur, equiliē  
ex aqua dulci potus eiicit, lib. 28. c.  
19. Succida lana composita subdi-  
taque mortuos partus euocat, libro



EX MONUMENTIS  
Arabum.

Eligatur obstetrix habens digitos  
protenso gracilesque, quibus oleo  
lilino illitis in debitum schema fœ-  
tus exitui paratus reponatur. Vtero  
gerens aliquot diebus ante partum  
crebriori exercitio vtatur, aliquan-  
do gradus descendat ascendatque,  
saltationes ante cœnā colat, dein-  
de ieiuna tali luatur encathyfmate.

## INSESSVS.

℞. Althææ cum rad. m. 6. maluæ,  
chamæmeli, fertulæ campanæ, apii.  
ā. m. 4. foliorum lauri, lauēdulæ. an.  
m. 2. seminis lini, fœnigræci, an, lib.  
2. coquatur, decocto quotidie dimi-



dia hora huic decocto infideat mulier.

## VNGVENTVM.

A balneo aut infessu epigastrium & os sacrum tali inungito vnguento. R. Olei amygdal. dulc. ʒ. i. pinguedinis gallinæ, olei lilini, mucroni althææ. an. ʒ. f. cera alba excipiatur in vnguentum.

## POTVS.

Ab inunctione duo ouorum lutea speciebus aromaticis sequentibus conspersa calidè potui dentur. Sunt item qui vinum aromaticum partui proximis propinant.

## SPECIES AROMATICA.

R. Cinnamomi. ʒ. f. casia, aut  
aa



DE MORB. MVL.

croci, cortic. cassiæ, fistularis. an. 3. i.  
fabinæ, betonicæ, adianti, dictami,  
fœnigræci, baccarum lauri, mentæ  
an. 3. f. ossis ex corde cerui. 3. f. sac-  
chari. 3. i. f. in pollinem omnia re-  
ducito.

ECLEGMA.

Rx. Pharmacorum in speciebus  
descriptorum & friatorum. 3. i. sac-  
chari lib. f. saccharum artemisiæ,  
apiastri succo, aut liquore stillatio  
liquetur, & inde quadras pond. 3.  
f. confice, dato quotidie quadram  
ieiunæ, subinde decocti præscri-  
pti, aut vini aromatici cyathum di-  
midiatum propinato.

IN HORA PARTU-  
tionis quid facien-  
dum.



Aër parientis esto calidus & humidus, pira domo (si quæ fuerint) abiiciantur. Lapillos preciosos portet, quibus vis inest iuuandi parientes, puta Aëtites sinistro lateri adalligatus, Magnes in sinistra manu detentus.

Sortilegæ cacoclæmonibus deuotæ ablegantur.

Partum accelerant dolorémque mitigant, lapsis, Smaragdus, Corallium, Styrax tritus & lana subactus, & pessi modo immissus, cor gallinæ adhuc ipsa palpitante positum, radix ocymi simul cum penna hyrundinis, radix cyclamini, artemisia, Dracuntium genibus alligatum, penna sinistra aquilæ seu tota ala, aut penna vulturis parituræ pedibus imposita, vnguis milui sub laborantis interula portata.

aa ii



Ex roſtro porcino ſertum capiti im-  
ponitur. Quum dolores vehemētif-  
ſimos cum graui pubis pondere pa-  
ritura crudeliter ſenſerit, retentum  
ſpiritum ſæpe inferiùs deprimat.

## CATAPLASMATA & emplaſtra.

Auic.

Pedes cum contrito polypodio  
emplaſtrandi ſunt, venter totus ar-  
temiſia emplaſtrandus. Farctum in-  
ternum colocynthidis ſucco rutæ, &  
momêto myrrihæ exceptum toti al-  
uo emplaſtri modo imponatur.

## PER METRANCHY- tum iniicienda.

Chorio rupto ſæpe humores qui  
partum ad exitum iuuant, deſluunt,



partu in locellis siccis remanente, tunc iniice decoctum sequens.  
℞. Althææ cum rad. m. 2. artemisiæ.  
m. 1. fœnigræci, seminis lini. an. ʒ. 3.  
decem ficus siccas, coquantur.  
decocti. ʒ. 4. adde, olei lilini. ʒ. 2.  
moschi granum vnum.

## POTVS.

Potui dato colamentum aquæ in  
qua hirundinis nidus maceratus sit,  
Berbenacam cum aqua frigida,  
Adiantum cum vino, aut syrupo ro-  
faceo, Mentam betonicam, cha-  
mæmelum cum aqua & melle,  
Ramentum nucleorum dactylorū,  
Fimum anseris, falconis, aut acci-  
pitris cum dulci vino. Vel ℞. Cor-  
tic. cassiæ fistularum. ʒ. 1. aut. 2. pul-  
ueris dictami, cū seminis lini deco-  
cto, quibus nonnihil cinnamomi

aa iiii



semper adde. Medicamentum vero quod in vniuersum omnes difficulter parientes iuuat, est hoc. R<sup>x</sup>. cinnamomi electi. 3. 2. myrrhæ, casia an. 3. 1. succini albi. 3. 1 f. vnà friato, de quo friamento in potu cum vino aromatico potui dato. 3. 1.

## CATAPOTIA, ET orbiculi.

Globulos sequentes ex eorū quæ partus accellerāt decocto potui dabis. 3. 2. R<sup>x</sup>. Sabinæ. 3. 2. rutæ. 3. 4. rutæ syluestris. 3. 1. laserpicii, ammoniaci, rubiæ passiue. an 3. 2. rutæ succo excepta digere in catapotia. Vel R<sup>x</sup>. Aristolochiæ longæ, piperis, myrrhæ, æquas partes rutæ succo excipe in orbiculos.

## ECLEGMATA.



Rx. Myrrhæ, castorii, styracis. an. ʒ.  
 ꝑ. cinnamomi & sabina. an. ʒ. ʒ. mel  
 le despumato excipiantur, & coch-  
 lear vnum cum feminis lini & iu-  
 niperi decocto ex vino calidè dato.

Sternutamenta profunt.

## SECUNDAE RE- tentio.

Secunda siue chorion est mem- Gal. lib.  
 brana totum foetum inuoluens, ve- de semine  
 nis & arteriis contexta, duas habēs genitali.  
 tunicas, vel, vt alii volunt, tres, ma-  
 tricis venis arteriisque cohærens,  
 per venas etenim illas sanguinem  
 quo foetus alitur, attrahit, per venā  
 vmbilicalem ipsum administrando,  
 per arterias item vmbilicales ad cor  
 foetus refrigerandum aërem trans-  
 mittit. Mediante enim radice, & qui

aa iiii



Ara5es.

ab ea oriuntur villis capillaribus, plā  
 ta solo connectitur, à quo alimentū  
 per ipsos villos sibi trahit, pari ratio  
 ne foetus per venulas in secūda spar  
 sas & arterias, quibus locellis hæ  
 ret, suctu sibi alimentum foetus ca  
 pit. Est & secunda membranula à  
 filio Aboali Arabe biley dictus. Itē  
 ab vmbilicali vena ac vase quodā,  
 per quod sibi foetus vrinam mādat,  
 ortum trahit, quod plicas ( rugatæ  
 vestis figura) plurimas habēs, ac an  
 fractus, in quibus vrina foetus ad ip  
 sum missa reconditur, ab vmbilico  
 infra, foetum ipsum totum inuoluit.  
 Est & membrana tertia tenuissima,  
 quæ foetui proximior prorsus ipsum  
 circūdat, & intra se vniuersum fœ  
 tus sudorē receptū seruat. Prima igi  
 tur mēbrana & extima humores in  
 locellis collectos à conceptione, qui



neque auctioni, neque nutritioni fœtus, ne fœtui noceant, arcet, sed inter locellos & hanc membranā ad partum vsque seruantur, & hæc secunda, siue chorion dicitur, quæ natura aut obstetricis digitis horâ partus dirumpitur. Secunda mēbrana biles dicitur, quā ab vmbilico partes fœtus inferiores teguntur, rugosa est, cauitates receptaculāque habens, quibus detinetur humor erodens & asper: verbi causa, lotium, sudor, quādiu enim fœtus in matris vtero est, vrinam emittit per venam ab vmbilico, pertingentem dictam membranā, & nō per vrinæ meatus assuetos siue naturales. Tertia membrana vniuersum fœtum tegit, & vrinam in bile mēbrana contentā, ne pusioni noceat, arcet, mollior quā secūda mēbrana est, ne detri-

Eucharius.  
us. rodio.



mentum foetui inferat : hanc obstetrices pueri armaturam , Auicenna abgas vocant.

SECUNDAM EXTRA-  
hendi modus.

Fuchf.

Porro foetu excussio frequēter accidit, vt secūda in vtero firmiter adhærescat, quod vbi euenit, tum interdum os vteri apertum, interdum clausum reperitur, secundināque ipsa nonnumquam vteri fundo adhuc coniuncta, nonnūquam seiuncta est. Si itaque os vteri diductum fuerit, & secunda quæ inibi relicta est, alicui parti vteri orbiculatim ac pilæ modo conuoluta inhæserit, facile educitur, manu siquidem sinistra calida pinguique illita in fundū demissa, secundam sublabentem extrahere oportet. Si autem fundo vteri sit cōnexa, demissa simili modo manu ca



lida, & pingui inuncta apprehensam secundam trahemus, non tamen in rectum, ne vterus procidat, neque violenter admodum, sed leniter ac placidè primum in obliquum diducemus, huc atque illuc circumagentes: deinde paulò validius attrahe-  
mus, hoc enim pacto obsequuntur, & à connexu soluuntur. Quòd si vul-  
uæ os clausum fuerit, perfusionibus vtemur, & sinistrae manus digitis le-  
niter aperire & paulatim dilatare conabimur. Quod si non successerit, mulieris pubi fomenta, perfusio-  
nes, vnguentaque emollientia & relaxantia adhibere conuenit. Si ro-  
busta fuerit, eo tempore etiam ster-  
nutamenta ex castorio, pippere & si-  
milibus confecta naribus admouē-  
da sunt. Hinc est quod Hippocra-  
tes. s. aph. 49. sic scriptum reliquerit.



Vt secunda procidat, sternutatoria  
apponito, & nares & os apprehen-  
dito.

ECLEGMATA QVAE  
cerebrum & cor confortant exhi-  
beto: verbi causa, diamargariton.  
Dianthu, Pliris cum moscho, po-  
tio moschata.

ENCHATISMATA.  
Infessus sunt ex foliis & surculis  
allii. Aut ex chamæmelo & chamæ-  
acte.

LINIMENTA, INVN-  
ctiones, & portanda vide in capite  
difficultatis partus..

Os vteri illinitur croco & lepo-  
ris coagulo. Inungatur vterus oleo  
lilino, aut sambucino calido. Aegra  
cingatur senecta anguium, Coxæ  
adalligabis artemisiam aut absin-  
thium tritum.



## POTIONES.

Potiones denique aliquæ earum quæ menses prouocant propinanda. Quæ quidem omnia primo, aut altero die peragenda sunt. Vide potiones scriptas in capite de difficili partu, & de suppressis mensibus.

Bibendæ item decoctiones rosarum recentium, allii, artemisiæ, fascolorum rub. prassii, abrotoni, althææ, pulegii, dauci, mentastri, petroselinii, polytrichi, mercurialis, rubiæ qua tingitur, potui dētur dictami, artemisiæ, polytrichi, petroselini, marubii mercurialis, absinthii, pulegii, verbenæ, porri, rutæ, hyperici.

Ad secundas, & partus emortuos extrahendum. Ex Haly. abbate. R. Sabinæ, aristolochiæ, perpenſæ, acoſti partes æquas, friata melle exci-



pito, portio esto. 1. 3. 2. ex lupinorum.  
mentastri & sabinae decocto.

haly. Vel, R<sup>x</sup>. opopanacis, galbani, fel-  
lis bouis. an. 3. 2. castorii. 3. 1. detur  
potui cum maratri & sabinae deco-  
cto: Vir colem iuniperi lachry-  
ma inungat & futuat, exhibet enim  
statim foetus & secunda. R<sup>x</sup>. Sabin-  
ae, lupinorum. an. 3. 1. myrrhae, opo-  
panacis. an. 3. 6. castorii. 3. 6. in tenu-  
issimum pollinem redacta potui da-  
to cum brassicae & pulegii decocto.

## SUFFITVS.

Fuchf.

Præterea suffitu vtendum, deco-  
ctis in olla artemisia, iride, sabina,  
pulegio, calamintha & similibus,  
olla sellæ supposita, cui mulier vesti-  
mentis vndiquaque circumsepta in-  
sideat. Quia veró grauitate odoris



& caput replet, & stomachum euer-  
tit, odoramenta iugiter suffienda  
sunt, quæ possint his malis aduersa-  
ri, & secundam subducere. Ad quos  
usus excellunt cardamomum, bdel-  
lium cum sabina, thus, styrax, lada-  
num, agallochum & huiusmodi.

Vel suffiatur ægra vngulis equi,  
asinæ, capræ, stercore bouis, equi,  
columbarum fimo & aquilæ, porri  
semine, allio, picea, veratro candi-  
do, nigella, aristolochia longa.

Vel Rutam, prassium & abroto-  
num, trita parum dilue oleo lilino,  
ferueat paululum, & mulier pannis Auic.  
tecta vaporetur.

### PESSI:

Pessos concinato ex allio, asphal-  
to, lasere, balsamo, stercore accipi-  
tris, galbano, gentiana, sagapeno,



DE MORB. MVL.

scammonio, bryonia, iride, nitro, di-  
stanno, excipiendo succo artemisiæ.  
℞. Aristolochiæ vtriusque, sabinae,  
nasturtii partes æquas trita in polli-  
nem bouis felle excipe in pessos.

At si secunda non obediat, dila-  
ceranda non est, haud multis enim  
postea diebus putrefacta, & in sani-  
em soluta excidet.

PVERPERAE CVRA:

Si peperit masculum, triginta die  
bus lecto iacet: Si foeminam. 40.

Nonnullæ tamen statim à partu  
resurgūt. Cuius enim crudelis partus  
est, & cubilis exitus tardus, in pri-  
mis tenuem victum huic exhibere  
oportet. Symptomata à partu mulie-  
rem torquent, quæ proueniunt ex  
sanguinis suppressione, aut ipsius flu-



xu nimio, aut adsunt vlcera<sup>r</sup> ex ligamentis ruptis. Ex sanguine retento sequuntur vertigines, animi deliquia, febres, & tandem omnes morbi, qui supressos comitantur mēses. Si prædicta puerperam torquent, tūc statim à partu saphena vena secāda est, modò vires adsint minimè ficulneæ. Sanguinis fluor sistendus vti dictum est, in mēsium nimio fluxu, febres profligādæ his quæ de febribus libro peculiari dicētur. Dolores sedandi sunt à copis, anodinis, cataplasmatibus, inunctionibus.

Danda etiam potui triphara magna cum opio ex vino. Si crudelissimo tentetur affectu, sequentis eclegmatis. 3. f. aut. 3. i. potui dato cum artemisiæ decocto ex vino calido, nam statim dolorem sedat. R. Piperis longi, seminis herbæ apollinaris cā-

bb



DE MORB. MVL.

didæ. an. 3. 5. opii thebaici, croci. an.  
3. 2. f. pyrethri, castorii. an. 3. f. am-  
meos, baccarum lauri, cymini, fol.  
rutæ sic. calamenti. an. 3. 1. f. marga-  
rit. hyacinthi. an. 3. f. moschi electi. 3  
f. excipiantur melle despumato in  
eclegma, & seruetur sex mensibus  
antequam quicquam detur.

MONSTRA.

Gal. lib.  
de finitio-  
num.

Monstra, vt aliquibus placet, fiunt  
propter inclinationem vuluæ, semē  
enim effusum inequaliter, monstra  
facit: sic & plumbum calefactum,  
posteaquam inæqualiter fusum est,  
inæqualia facit simulacea. Monstra  
autem defecta fiunt quædam magni-  
tudine, vt quæ magno sunt capite  
prædita: Alia paruitate, vt quæ par-  
ua habent capita: Nonnulla abun-  
dantia, vt quæ sex digitos in altera  
manu habent.



Vidimus aliquando (inquit Mar-  
 cellus) ex gallia in italiam aduectū  
 hominis in natura monstrum, quod  
 per vrbes ad spectaculum quæstus  
 causa à plerisque circumferebatur.  
 Id puer nondum plenæ pubertatis  
 erat, cui ab anteriore parte inter imū  
 pectus & vmbilicum eiusdem sexus  
 paulominus quàm integer alius per  
 debat homo alterius illius & inte-  
 gri, ex quo pēdebat tertia fere pars,  
 Caput illi tantum & superiores hu-  
 merorum partes deerant, quæ velu-  
 ti insitione quadam in integro illo  
 latentes, tam apta quo diximus lo-  
 co coaluerant, vt sine labore vitæ-  
 que tedio duo simul paulominus  
 quàm tota corpora in vno homine  
 viuerent. Brachia incepta illi tan-  
 tum videbantur, reliquum vndique  
 integrum corpus erat, quod ad al-

bb iii

Marcel.  
 Virgili.  
 in diofc.]  
 lib. 4. c.  
 142. 10  
 lauro A-  
 lexadri.



terius sensus necessitatésque omnes  
etiam moueretur. haftenus Marcel  
lus: Hoc etiam vidi in pandocheo  
quodam in opido castauariensi pi-  
ctonum, quum tertiũ decimũ æta-  
tis annum agerem, anno à christo  
nato, aut passio. 1516.

Octauo die februarii anni do-  
mini. 1541. in castro diui Amãdi al-  
liferi in solo borbonico ex iuuecula  
quadam nihi notissima natum est  
monstrum hominis effigiem à ca-  
pite ad vmbilicum vsque referens,  
ab vmbilico infra, crurum pedũ-  
que ac digitorum pedis loco substi-  
tuta erat cauda syrenum modo, py-  
ramidali figura, in latum tamen pe-  
dis magnitudine desinebat. Tin-  
ctum fuit hoc monstrum christia-  
norum lauacro, horanque à partu  
duntaxat vixit.



Vidimus(inquit Alexander) mu- Alex. be.  
in anato.  
mc.  
lierem sine brachiis natam, pedes  
pro manibus, adnendi suendique  
artem habuisse. Eādem vidimus in  
castro Amādino allifero anno chri-  
sti.1540. nentem, suentem, pedibus  
manuum vice cyathum vini appre-  
hendentem, & cultello panem scin-  
dentem, & bellantium more pe-  
dibus arreptis baculis tympanum  
bellicum pulsantem.

Ferunt ab orientis parte intima Pli.lib.  
6.c.30  
gentes esse sine naribus, æquali to-  
tius oris planicie, Alias superiore  
labro orbas, Alias sine linguis, pars  
etiam ore concreto & naribus ca-  
rens, viuo tantum foramine spirat,  
pouitque calamis hauenæ & grana  
eiusdem hauenæ sponte prouenien-  
tis ad vescendum, Quibusdam pro  
sermone nutus motusque membro-

bb iii



rum esse, Quibusdam ante Ptolema-  
um lathyrum regem Aegypti igno-  
tus fuit vsus igniū. Quidam & Pig-  
maeorum gentes prodiderunt ante  
paludes, ex quibus Nilus oritur,  
Nomades cynocephalorū lacte vi-  
uentes, Olabi, Styrbota, qui octonū  
cubitorum esse dicuntur, Cinamol-  
gi caninis capitibus.

Pli. lib.  
7 c.1.

Iam in facie vultūque nostro,  
cum sint decem, aut paulò plura mē-  
bra, nullas duas in tot millibus ho-  
minum indiscretas effigies existere  
quod ars nulla in paucis numero  
præstet affectando.

Iuxta eos, qui sunt ad septentrio-  
nē versi, haud procul ab ipso Aequi-  
lonis exortu, specūque eius dicto,  
quem locum Gesglitron appellant,  
produntur Arimaspi, vno oculo in  
fronte media insignes, quibus assi-




duè bellum esse circa metalla cum gryphis, ferarum uolucris genere, quale vulgò traditur, eruente ex cuniculis aurū mira cupiditate, & feris custodientibus, & Arimaspiis rapiantibus, multi, sed maxime illustres Herodotus & Aristæas Proconensius scribunt, vide cætera apud Plinium. lib. 7. c. 2. Perlege librum cui titulus in est, Omnium gentium mores. &c.

FINIS.



*Patere aut abſtine.*



*Nul ne ſy frotte.*



